Revista Bibliográfica

(Análisis, Indices i Estractos).

FLORA CHILENA.

2. Nuevo jénero de Onagrariáceas.—(De los *Anales de la Universidad*, año 55°, Octubre 1897, paj. 474.)—El Dr Reiche, en sus interesantes *Estudios críticos sobre la Flora de Chile*, ha fundado a espensas de la *Godetia sulphurea* - Ph., un nuevo jénero con el nombre de *Oenotheridium*, que caracteriza así:

«Tubo calicinal en forma de embudo i desprovisto de un anillo barbudo. Sépalos doblados abajo. Pétalos trasaovados, denticulados, Estambres 8; los opuestos a los pétalos son los mas cortos. Anteras sujetadas cerca de su base (basifijas). Granitos de polen solitarios, pero unidos por hilos de viscina. Estigma cortamente cuadrilobulado. Cápsula prismática con muchas semillas poliédricas i papilosas en las aristas. Yerba anual. Corola amarilla.»

Contiene, como ya se ha visto, una sola especie: *Oenotheridium sulfureum* - R. *(Godetia sulphurea* - Ph.) Araucania, Provincia de Valdivia.

C. E. P.

NOVEDADES BOTÁNICAS.

2. Conservacion de los hongos.—(Del *Boletino del Naturalista*, Agosto 1897, paj. 100). En una sesion de la «Sociedad Helvética de Ciencias Naturales», el profesor Eschirch ha propuesto el siguiente método:

Se comienza por echar los hongos en alcohol que contenga un poco de ácido sulfúrico con el fin de esterilizarlo; se coagula la albúminia i el agua cede su lugar al alcohol. Se secan despues los hongos colocándolos al aire i, cuando están bien secos, se ponen en una solucion de parafina líquida que contenga un 5% de fenol. En tal solucion se conservan largo tiempo sin perder ni la forma ni el color.

Tratándose de callampas de color delicado, aconseja el señor Eschirch, no ponerlas en alcohol sino el someterlas solamente a la accion de los vapores de este líquido. Así, para el color *rosado* es absolutamente necesaria esta precaucion por descomponerse fácilmente si el hongo es colocado en contacto del dicho líquido.

C. E. P.