

# Estudios sobre la Ornitología Chilena.

(Continuacion).

## Familia Pteroptochidae

(Vulgarmente: CHUCAOS, TURCAS, TAPACULOS i CHURRINES.)

Tenemos tres jéneros con ocho especies, que se pueden clasificar por la clave siguiente.

- A). Tarso del mismo largo que el dedo mediano. (Scytalopus).  
a). Cabeza superior negra.  
1). Medio del vientre blanquizco. ... *Scytalopus magellanicus*.  
2). Medio del vientre negro. ... .. *Scytalopus obscurus*.  
b). Cabeza superior con plumas blancas. ... *Scytalopus ablifrons*.
- B). Tarso mas largo que el dedo mediano. (PTEROPTOCHUS).  
a). Cuello i pecho rojos. . . . . PTEROPTOCHUS RUBECULA.  
b). Cuello i pecho blancos. . . . . PTEROPTOCHUS ALBICOLLIS.
- C). Tarso mas corto que el dedo mediano. (HYLACTES)  
a). Garganta i pecho pardo negruzco. ... .. *Hylactes tarnii*.  
b). Garganta i pecho castaño. ... *Hylactes castaneus*. Landebeck.  
c). Garganta blanca. ... .. *Hylactes megapodiu*.

Especie 1. *Scytalopus magellanicus*. Gmelin.

Nombre vulgar: CHERCAN NEGRO.

### SINÓNIMOS:

Motacilla magellanica, Gmelin.	<i>Scytalopus fuscus</i> . Gould.
Syloia magellanica. Latham.	" niger. Bonaparte.
Platyurus niger: Swainson.	<i>Pteroptochus megellanicus</i> . Gray.
Merulaxis aethiops. de Lafresnaye.	<i>Troglodytes paradoxas</i> . v. Kittlitz.
Leptonyx paradoxas. d'Orbigny.	<i>Malacorhymhus chilensis</i> . Menetr.
Merulaxis paradoxus de Lafresnaye.	<i>Platyurus lepturus</i> . Swainson.
<i>Pteroptochus paradoxus</i> . Gay.	

Habita la Patagonia, Chile, Perú, Ecuador i Colombia. El Echeran negro ha sido dividido hasta aquí en dos jéneros *Scytalopus* i *Triptorhinus* cuya única diferencia la fundaban en la falta o la existencia de una elevacion del dorso en la base del pico. Yo he estudiado mas de 20 ejemplares de distintas rejiones i he encontrado que no hai ningun ejemplar que no tenga una pequeña elevacion en la base del dorso del pico, solamente esta es mui insignificante en algunas aves, i en otras es bastante notable pero todavia tapada por las plumas frontales, i en otras está mui bien desarrollada. No

solamente los ejemplares de la isla de Mocha sino tambien los del continente tienen esta elevacion, siendo en todos el color i las proporciones de las medidas exactamente iguales.

Doi en seguida un cuadro de las medidas de los ejemplares de la isla de Mocha i de los del continente.

	CONTINENTE.	ISLA MOCHA.
1.) largo total . . . . .	13,2 a 14,6 cm.	13,8 a 14,7 cm.
1 <sup>a</sup> ). largo de la cabeza . . . . .	1,9 a 2,4 cm.	1,8 a 2,2 cm.
2.) largo del pico . . . . .	1,45 a 1,8 cm.	1,6 a 1,8 cm.
3.) alto del pico en la base . . . . .	0,7 a 0,8 cm.	0,7 a 0,9 cm.
4.) ancho del pico en la base . . . . .	0,6 a 0,65 cm.	0,5 a 0,65 cm.
5.) largo de las alas . . . . .	5,7 a 5,8 cm.	5,6 a 6 cm.
6.) largo de la cola . . . . .	4,9 a 5,7 cm.	5 a 5,2 cm.
7.) largo del tarso . . . . .	2,5 a 2,6 cm.	2,5 a 2,6 cm.
8.) largo del dedo posterior . . . . .	2,1 a 2,2 cm.	2 a 2,2 cm.
8 <sup>a</sup> ). largo de la uña del dedo posterior	0,9 a 1 cm.	0,9 a 1 cm.
9.) largo del dedo exterior . . . . .	1,9 a 2,1 cm.	1,8 a 2,1 cm.
10.) largo del dedo mediano . . . . .	2,3 a 2,5 cm.	2,3 a 2,5 cm.
10). largo de la uña del dedo mediano	0,7 a 0,75 cm.	0,7 a 0,75 cm.
11.) largo del dedo interior. . . . .	1,8 a 1,9 cm.	1,85 a 2 cm.

Es esto la mayor prueba que no hai lugar de dividir esta especie en dos, i mucho menos en dos jéneres.

**Especie 2. Scytalopus obscurus. Geuld.**

Nombre vulgar: CHURRIN.

Habita las provincias del Centro i Sur de Chile hasta Magallanes.

**Especie 3. Scytalopus albifrons, Landbeck.**

Nombre vulgar CHURRIN de cabeza blanca.

**SINÓNIMOS.**

*Ptotochus albifrons* Landbeck. | *Scytalopus magellanicus*. Sclater.

Habita desde la provincia de Colchagua hasta Chiloé.

Sclater i el Museo de Lóndres no ha querido aceptar esta especie hoi dia, creyendo que debiera ser una ave nueva del *Scyt. magellanicus*, i yo tengo el gusto de poder restablecer esta especie, que formó mi digno antecesor i ornitólogo señor Luis Landbeck, yá con pocas e incombustibles pruebas. Primeramente es el ave nueva de *Scyt. magell.* en tamaño mayor que el ave mas grande: adulta de *Scyt. albifrons*, como lo demuestra el cuadro siguiente

**SCYTALOPUS ALBIFRONS.**

*Sc. magellanicus juvenis.*

1.) largo total . . . . .	10,2 a 11,7 cm.	12,5 cm.
1 <sup>a</sup> ). „ de la cabeza . . . . .	1,7 a 1,8 cm.	1,9 cm.
2.) „ del pico . . . . .	1,5 a 1,6 cm.	1,4 cm.
3.) alto del pico en la base . . . . .	0,45 a 0,5 cm.	0,65 cm.
4.) ancho del pico en la base . . . . .	0,5 a 0,5 cm.	0,5 cm.
5.) largo de las alas . . . . .	5 a 5,4 cm.	5,6 cm.
6.) largo de la cola . . . . .	3,5 a 3,6 cm.	4,8 cm.
7.) largo del tarso . . . . .	2 a 2,1 cm.	2,3 cm.
8.) largo del dedo posterior . . . . .	1,6 a 1,65 cm.	2 cm.

8ª.) ,, de la uña del dedo posterior	0,8 cm.	0,9 cm.
9.) largo del dedo exterior ... ..	1,4 a 1,45 cm.	1,8 cm.
10.) largo del dedo mediano ... ..	1,8 a 2 cm.	2,2 cm.
10ª.) ,, de la uña del dedo mediano	0,4 a 0,45 cm.	0,65 cm.
11.) largo del dedo interior ... ..	1,3 a 1,35 cm.	1,7 cm.

Segundamente el color del Scyt. mag. joven es mui distinto e incomparable con él del ave adulto de Scyt. albifrons adulto (véase anales de la Univ. de Abril 98). Terceramente con el Scyt. obscuros tampoco se puede confundir por la diversidad inmensa de los colores i por último haré recordar que en ninguna parte del mundo existe un ave albina cuyas plumas blancas sean lustrosas i relumbrantes como las del Scyt. albifrons, así es que queda probado que se debe conservar esa especie descrita por el laborioso orni-tólogo Landbeck.

**Especie 4. Pteroptochus rubecula, von Kittlitz.**

Nombre vulgar: TRICAU.

Habita desde la provincia de Colchagua hasta el sur de Chile.

**Especie 5. Pteroptochus albicollis, von Kittlitz.**

Nombre vulgar: TAPACULO.

Habita el Centro y Norte de Coile, i el Este de la Argentina, se le encuentra desde la costa hasta la cordillera.

**Especie 6, Hylactes Tarnii. King.**

Nombre vulgar: Huez-Huez.

Habita el Sur de Chile i el Este de la Patagonia.

**Especie 7. Hylactes castaneus, Philippi i Landbeck-**

Nombre vulgar: HUEZ-HUEZ castaño.

**SINÓNIMOS.**

*Pteroptochus castaneus Philippi.* | *Pteroptochus tarnii var. Sclater.*

Habita solamente la cordillera de la provincia Colchagua.

Muchos habian tomado esta especie por una simple variedad de *Hyl-tarnii*, pero habiendo estudiado mas de 30 ejemplares de las dos especies, pertenecientes a los dos sexos, i adultos i nuevos no he podido encontrar ninguno que indicara un intermedio entre los colores de una i otra especie.

**Especie 8, Hylactes megapodius, von Kittlitz.**

Nombre vulgar: TURCO.

Habita las provincias del Centro i Norte de Chile.

**Federico Albert.**

(Continuará)