ESTUDIOS SOBRE LA ORNITOLOJIA CHILENA

— POR —

FEDERICO ALBERT

(Continuacion)

Familia: Caprimulgidae.

Esta familia comprende los pájaros llamados vulgarmente *Plastillas o Gallinus ciegas;* que se distinguen por su pico grande triangular, aplastado i hendido hasta debajo de los ojos; el tarso corto; los dedos unidos en la base; i el plumaje sedoso i velludo. Habitan todo el mundo con escepcion de las rejiones árticas; se conocen 83 especies de las cuales en Chile tenemos solo una que es:

Caprimulgus bifasciatus.—*Gould.*

Nombre vulgar: *Plastilla, Gallina ciega o Bocon.*

Syn.

———

Caprimulgus andinus.—*Philippi.*
„ gularis.—*Philippi.*
„ obsurus.—*Philippi.*
„ decussatus.—*T'schudi.*
„ parvulus.—*Gould.*
„ aequicaudatus.—*Peale.*
„ conterminus.—*Peale.*
Stenopsis longirostris.—*Cassin.*
„ reticulatus.—*Gray.*
„ bifasciata.—*Sclater.*
„ macrorhyncha.—*Salvador.*
„ ruficervix.—*Sclater.*
Antrostomus bifasciatus.—*Bonaparte.*
„ decussatus.—*Bonaparte.*
„ longirostris.—*Bonaparte.*
„ parvulus.—*Sclater.*

La cara superior del ave compuesta de puntitos i manchitas negras pardas, brúneas, rojizas i cenicientas; collar blanco; todo lo demas de la cara inferior venado finamente negro, pardo, brúneo, rojizo, ceniciento i blanco; las alas venadas i la punta de las rectrices esteriores blancas.

La hembra (Capr. obscurus,—*Philippi*), en jeneral mas oscura i rojiza; las vendas rojizas como tambien las puntas de las rectrices esteriores bordadas rojizas.

El ave nueva. (Capr. andinus—*Philippi*), mas pálida i cenicienta, pero mas parecida a la hembra i carece de las puntas blancas de las rectrices.

Habitan el campo i la cordillera de Chile, la Patagonia, Arjentina, Peru, Bolivia i Ecuador.



Observaciones—La Plastilla nuestra pertenece al jénero *Cuprimulanus* i no al *Stenopsis* porque la cola es redondeada o cortada derecha, las alas agudas, i el pico es del mismo largo que el de la Plastilla europea.

Familia: Hirundinidae

Vulgarmente: *Golondrinas.*

Pico chico, mui deprimido i triangular; las alas largas puntiagudas; la cola es cortada u hondamente ahorquillada; viven de insectos que cazan al vuelo. Habitan todo el mundo con escepcion de las rejiones árticas, se conoce como 90 especies de que en nuestro pais tenemos cuatro habitantes i una visitante, que se dejan distinguir por la clave siguiente:

I. Cola poco ahorquillada, o escotada que no llega hasta las últimas puntas de las alas.

A. Rabadilla blanca: *Tachycineta meyeni.*

B. Rabadilla negra azulada: *Atticora.*

1) Cara inferior blanca.

Atticora cyanolueca.

2) Cara inferior cenicienta.

Atticora cinerea.

II. Cola hondamente ahorquillada, escede las últimas plumas de las alas.

1) Rectrices con una mancha blanca:

Hirundo rustica.

2) Rectrices sin mancha:

Progne furcata.

Especie 1. **Tachycineta meyeni.** *Bonaparte.*

Nombre vulgar: *Golondrina blanca.*

Syn:

Hirundo meyeni.—*Giebel.*

" melanoleuca.—*Prinz Wied.*

" leucopyga.—*Meyen.*

" leuoceptera.—*Gmelin.*

" albiventer—*Boddin.*

" leucopygia.—*Gould.*

" leucorrhoa.—*Vieillot.*

" frontalis.—*Gould.*

" gouldi.—*Cassin.*

Herse leucorrhoa.—*Bonaparte.*

Petrochelidon leucorrhoa.—*Cabanis.*

" meyeni.—*Cabanis.*

Chelidon frontata—*Boie.*

Cotyle leucorrhoa.—*Burmeister.*

Cypselus leucopygius.—*Gay*

Tachycineta leucorrhous.—*Sharpe.*

" leucorrhoa.—*Sclater.*

Cara superior negra con un bello viso metálico azul marino; rabadilla i cara inferior blanca.

Habita los campos de la Tierra del Fuego, la Patagonia, Arjentina, Perú, Brasil, i Paraguai.

Especie: 2. **Atticora cyanoleuca.** *Vieillot.*

Nombre vulgar: *Golondrina negra.*

Syn.

Hirundo cyanoleuca.— *Vieillot.*

" melampyga.—*Lichtenstein.*

" patagonica. - *de Lafresnaye.*

" minuta.—*Prinz Wied,*

Chelidon cyanoleuca.—*Boie.*
„ minuta.—*Boie.*
Herse cyanoleuca.—*Bonaparte.*
Petrochelidon cyanoleuca.—*Sclater.*
Pygochelidon cyanoleuca.—*Gray.*

Cara superior negra azul marina; cara inferior blanca. Habita los campos de la Patagonia central, Arjentina, Chile, Perú, Bolivia, Brasil i Ecuador.

Especie: **3. Atticora cinerea.** *Gmelin.*

Syn: Vulgarmente: *Golondrina cenicienta.*
Hirundo cinerea.—*Gmelin.*
Atticora murina.—*Baird.*
„ cyanophaea.—*Cabanis.*
Collocalia vanikorensis.—*Gray.*
„ spodiopygia.—*Cassin.*
Pygochelidon murina.—*Gray.*
Petrochelidon cinerea.—*Sclater.*
Macropteryx leucophoeus.—*Peale.*

Cara superior negra pardusca; cara inferior cenicienta. Habita Tarapacá i las repúblicas ecuatoriales.

Especie: **4. Hirundo rustica.**—*Linné.*

Vulgarmente *Golondrina europea.*

Syn: Hirundo americana.—*Wilson.*
„ rufa.—*Bonaparte.*

Cara superior i pechuga negra azul marina; frente y garganta castaña; cara inferior blanca. Habita los campos de Europa, Asia, Africa, Norte América, i hace poco invadió tambien a Chile habiendose colonizado en la cercania de la laguna de Aculeo, donde anida i se estableció de firme; hai que desear que se estienda sobre toda la república esta ave tan útil.

Especie: **5. Progne furcata.** *Baird.*

Nombre vulgar: *Golondrina arjentina*
Syn.

Progne purpurea —*Gould.*
Hirundo purpurea.—*Linné.*

Negra azulada de acero, algo purpurea. Habita la Patagonia, Arjentina, Paraguai, Méjico, Estados Unidos i suele visitar nuestro pais, pero no anida en él.

(Continuará)