

ESTADO DE CHILE Y BIBLIOTECA

# CATÁLOGO — DE LOS — PECES DE CHILE POR EL DOCTOR FEDERICO T. DELFIN

NATURALISTA ADJUNTO DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAISO  
(ENCARGADO DE LA SECCION DE PECES)

(Continuacion)

31. MENODSOMA CÖRULESCENS.

Gay. Hist. de Chile, II. p. 215; Dr. Günther, Cat. of the Fish. II. p. 85.

Los pescadores lo llaman *Cabinzr*. El M. V. posee un ejemplar de Valparaiso.

32. MENDOSOMA FERNANDEZIANUS. (¶)

Gay, Hist. de Chile, I. p. 216; Günther, Cat. of the Fish, II. p. 85.

Los pescadores lo llaman *Cabinza de Juan de Fernandez* por su oríjen i por su semejanza con la de la costa.

## FAM. TRIGLIDÆ.

Cataphracti pt., Cuv. Règne Anim.; Müller. Bert. Abhandl, 1844. p. 201.

Sclerogenidœ, pt., Owen. Lect. Comp. Anat. Vert. I. p. 49.

Triglidœ, pt., Kaup in Wieg. Archiv, 1858, p. 329.

( ) Esta especie i la anterior las tiene el Doctor Günther como dudosas.

J. SEBASTES.

Sebastes. Cuv. i Val. IV. p. 326; Dr. Günther, Cat. of the Fish, Coll. Brit. Mus; II. p. 95.

33. SEBASTES OCULATA.

Sebastes oculata, Cuv. et Val. IX. p. 466; Jenyus, Zool. Beagle, Fish. p. 37; Gay, Hist. de Chile, Zool. II. p. 178; Cuv Régne Anim. Ill. Poiss. pl. 23. f. 3.  
oculatus Dr. Günther; Cat. of the Fish, Coll. Mus. II. p. 105.

Son conocidas con el nombre de *Cabrilla española*.

El M. S. tiene un ejemplar procedente de Valparaiso i el M. V. cinco todos de Valparaiso, del año 1885.

34. SEBASTES MACROPTALNUS ( )

Dr. Philippi (sp. inédita).

M. S., ejemplar de la costa de Santiago del año 1889.

J. SCORPOENA.

Scorpœna, Artedi, Genera, p. 47; Cuv. et Val. IV. p. 286;  
Dr. Günther Cat. of the Fish. II. p. 107. Scorpœna et  
Scorpœnopsis Heck. Ann. Wils. Mus. I. 1840. p. 158.  
Scorpœna et Scorpœnichthys (no Girard.) Bleck, Boeroe  
p. 402.

35. SCORPŒNA FERNANDEZIANA.

Dr. Philippi (sp. inédita).

El M. S. posee dos ejemplares uno de 1871 i otro de 1875. Ambos de la Isla de Juan Fernandez; tiene por nombre vulgar *Cabrilla*.

---

(\*) El M.V. posée cinco ejemplares de una *Cabrilla* pescada en Valparaiso que difiere notablemente de la *oculata*. Es probable que sea esta la que el Doctor Philippi aun tiene inédita. Es mui abundante en invierno i los pescadores la distinguen de la anterior designándola solo con el nombre de *Cabrilla*.

J. AGRIOPUS

Agriopus, Cuv. et Val. IV. p. 380; Dr. Günther, Cat. of the Fish. II. p. 137.

Cephalinus. Gronor. Lyst ed Gray, p. 159.

36. AGRIOPUS PERUVIANUS.

Agriopus peruvianus, Cuv. et Val. IV. p. 389; Gay, Hist. de Chile, Zool. II. p. 181, Ictiol. lám. 2 bis, f. 1., Cuv. Règne Anim.; Ill. Poiss, pl. 25, f. 1.; Dr. Günther; Cat. of the Fish. Coll. Brit. Mus. II. p. 138.

Es conocido con el nombre de *Chancho*.

El M. S. posee un ejemplar de esta especie pescado en el Tomé i el M. V. otro tomado en Chañaral.

37. AGRIOPUS ALBO-GUTTATUS.

Kröger Naturhist. Tidsskr. 1844. I. p. 226; Dr. Günther Cat. of the Fish. II. p. 139.

38 AGRIOPUS HISPIDUS.

Jenyns. Zool. Beagle, Fishes, p. 38. pl. 7. f. 2, 2 a, 2 b.; Günther, Cat. of the Fishes. Coll. Brit. Mus. II. p. 139.

Es de la parte austral de Chile.

J. TRIGLA

Trigla, sp., Artedi; Genera, p. 42; Cuv. Règne Anim. Cuv. et Val. IV. p. 9.; Dr. Günther. Cat. of the Fishes, Coll, Brit. Mus. II. p. 198.

39. TRIGLA PICTA.

Dr. Günther, Voy. Challenger, Zool. I. p. 24. Es de la Isla Juan Fernandez.

40. TRIGLA GUTTATA,

Dr. Philippi. An. Un. de Chile, año 1896, vol. II p. 375. Es tambien de la Isla de Juan Fernandez, el ejemplar que posee el M. S.

J. AGONUS.

Agonus, Bl. Schu. p. 104.

Aspidophorus, Lacep. III. p. 221.; Cuv. et. Val. IV. p. 198.

Phalongistes, Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. III. p. 110.

41. AGONUS NIGER.

Aspidophorus niger Kröger. Naturhist. Tidsskr. 1844. I. p 238.

Agonus niger, Dr. Günther. Cat. of the Fishes. Coll. Brit. Mus. II. p. 215.

Ejemplar tomado en Valparaiso.

42. AGONUS CHILOENSIS.

Aspidophorus chiloensis, Jenys. Zool. Beagle. Fishes p. 30. pl. 7. f. 1, 1 a 1 b.; Gay. Hist. de Chile, Zool. II. p. 174.

El M. S. posee dos ejemplares uno de Coronel i el otro de Chiloé.

FAM. TRACHINIDÆ

Percoidei, pt Sciænoidei, pt., et Gobioidei, pt., Cuv. Règne. Anim.; M. ller. Bert. Abhandl. 1844.

Uranoscopidœ, pt. Sciænoidœ, pt., Gobiidœ pt. el Blenniidœ, pt., Richardson.

J. TRACHINUS

Trachinus, (Artedi); Cuv. Règne Anim; Cuv. et Val. III. p. 233.

43. TRACHINUS CORNUTUS.

Gay. Hist. de Chile. Zool. II. 162; Dr. Günther, Cat. of the Fish. Coll. Brit. Mus. II. p. 237.

J. APHRITUS

Cuv. et Val. VIII. p. 483; Dr. Güntner, Cat of the Fish. Coll. Brit. Mus. II. p. 242,

44. APERITIS UNDULATUS.

Jenyns, Zool. Beagle, Fishes, p. 160, pl. 29, f. 1; Gay. Hist. de Chile. Zool. II. p. 168, Dr. Günther, Cat. of the Fishes, Coll. Brit Mus. II. p. 243.  
Archipiélago de Chonos.

45. ARHRITIS POROSUS.

Jenyns, Zool. Reagle, Fishes, p. 162; Dr. Günther. Cat. of the Fishes; II. p. 243. Costa de la Patagonia

J. ELEGINUS

Eleginus, Cuv. et Val. V. p. 158; Dr. Günther, Cat. of the Fishes, II. p. 247.

46. ELEGINUS MACLOVINUS.

Eleginus maclovinus, Cuv. et Val. V. p. 158, pl. 115; Less. Voy. Coq. Zool. II. p. 202, pl. 17; Gay. Hist. de Chile, Zool II. p. 186. Falklandicus, Richardson, Voq. Ereb. et Terr. Fish. p. 30, pl. 20, f. 1—3.  
Son los llamados *róbalos* en Punta Arenas.

47. ELRGINUS CHILENSIS.

Cuv. et Val. IX. p. 480; Gay, Hist. de Chile, II. p. 187  
Atl. Ictiol. lam. 3, f; Dr. Günther Cat. of the Fish. Coll. Brit. Mus. II. p. 247.  
Se encuentra de Talcahuano al norte.  
Lo llaman *Rabalito*.

J. BOVICHTHYS

Bovichtus, Cuv. et Val. VIII. p. 486. Bovichthys, Dr. Günther, Cat. of the Fisher, Coll. Brit. Mus. II. p. 249.

48. BOVICHTHYS DIACANTHUS.

Callionynus diacanthus, Carmich. Trans. Linn. Soc. XII. p. 501, pl. 26.  
Bovichtus diacanthus, Cuv. et Val. VIII. p. 487, pl. 244; Gay, Hist. de Chile, Zool. II. p. 171.

Bovichihys diacantus, Dr. Günther, Cat. of the Fish.  
Coll. Brit Mus. II. p. 249.

Se le designa con el nombre de *Torito*. El M. V. posee  
un ejemplar desde 1887.

49. BOVICHTHYS OBSCURUS.

Dr. Philippi (sp. inedita)

El M. S. posee dos ejemplares uno de la isla Masafuera i el otro de la costa de Algarrobo, año 1873.  
Tiene por nombre vulgar el de *Torito*.

50. BOVICHTHYS PICTUS.

Dr. Philippi, (sp. inédita)

El M. S. posee un ejemplar que lleva este nombre  
desde 1860; procede del puerto de Algarrobo.

51. BOVICHTHYS MINUTUS.

Dr. Philippi, (sp. inédita)

Tiene por procedencia la costa de Algarrobo.

J. PINGIPES

Pinguipes. Cuv. et. Val. III. 277; Dr. Günther, Cat. of the  
Fisher. Coll. Brit. Mus. II. p. 251.

52. PINGUIPES CHILENSIS.

Esox chilensis, Molina Saggio sulla storia naturale  
del Chile.

Pinguipes chilensis, Cuv. et. Val. IX. p. 457; Jen. Zool.  
Beagle, Fish. p. 22; Gay, Hist. de Chile II. p. 165, lam.  
2, f. 2; Cuv. Règne Aninn. Ill. Poiss. pl. 16, f. 1; Dr.  
Günther, Cat. of the Fish. Coll. Brit. Mus. II. 252..

Se designa vulgarmente con el nombre de *Robalo*.

En el M. S. hai un ejemplar que es de Tomé i el M. V.  
posee dos que son de Valparaiso.

53. PINGUITES PLUMBEUS.

Dr. Philippi (sp. inédita)

Tiene el M. S. un ejemplar de Valparaiso que el Dr.  
Philippi el año 1889 designó con este nombre,

J. LATILUS

*Latilus*, Cuv. et Val. V. p. 368; Dr. Günther, Cat. of the Fish. Coll. Brit. Mus. II. p. 252.

54. LATILUS JUCULARIS.

Cuv. et Val. IX. p. 500, pl. 279; Jenyus, Zool. Beagle, Fishes. p. 50; Gay. Hist. de Chile, II. p. 203; Dr. Günther, Cat. of the Fishes, Coll. Brit. Mus. II. p. 253. En el M. V. hai cinco ejemplares de esta especie de procedencia Valparaiso i Chañaral.  
Se le conoce con el nombre de *Blanquillo*.

J. NOTOTHENIA

*Notothenia*, Richardson, Voy. Ereb. et Terr. Fish. p. 5; Dr. Günther, Cat. of the Fishes, Coll. Brit. Mus. II. p. 260

55. NOTOTHENIA CORNUCOLA.

*Notothenia cornucola*, Richardson, Voy. Ereb. et Terr. Fish p. 8. pl. 8. f. 4. 5, p. 18. pl. 11. f. 3, 4; Dr. Günther, Cat of the Fish. II. p. 261.  
Marginato Richardson Voy. Ereb. et p. 18, pl 12 f. 1, 2.

Se le encuentra en la rejion austral de la Tierra del Fuego.

56. NOTOTHENIA MAGELLANICUZ (\*)

Gadus magellanicus, (Forster) Bl. Schn. p. 10.  
*Notothenia magellanica* Richardson, Voy. Ereb. et aerr. Fishes, p. 9.  
De la Tierra del Fuego.

✓  
S  
J

57. NOTOTUENIA ELEGANS.

Günther, Voy. Challenger, Zool. I. p. 21.  
Es de la costa de Magallanes.

(\*) Para el Doctor Günther es dudosa.

J. HARPAGIFER

Harpagifer, Richardson, Voy. Ereb. et Terr. Eish. p. 11;  
Dr. Günther, Cat. of the Fish. II. p. 263.

58. HARPAGIFER BISPINIS.

*Callionymus bispinis*, Forster. *Batrachus bispinis*,  
Bl. Schn. p. 45.

Harpagifer bispinis, Richardson, Voy. Ereb. et Terr.  
Fish. p. 11. pl. 7 f. 1—3, p. 19. pl. 12; f. 8—9; Dr.  
Günther; Cat. of the Fish. Coll. Brit. Mus. II. p. 263,  
*H. palliotatus*, Richardson, Voy. Ereb. et Terr. Fish. p.  
20, pl. 12. f. 5—7.

Es del Cabo de Hornos i rejones vecinas.

FAM SCIOENIDOE

Sciœnoidei, pt.; Cuv. Rêgn Anim; Cuv. et Val. V. p. 1; Müller  
Berl. Abhandl. 1844, p. 201.

Sciœnidœ pt., Owen. Lect. Comp. Anat. Vert. I. p. 49; Ri-  
chardson, Ichthyol.

J. MICROPOGON

Micropogon. Cuv. et Val. V. p. 213; Dr. Günther. Cat. of the  
Fish. Coll. Brit. Mus. II. p. 870.

59. MICROPONGON UNDULATUS.

Catesby, Carol. II. p. 3, tab. 3, f. 1. *Perca undulata*  
L. Syst. Nat. p. 483; Bl. Schn. p. 87.

Sciœna Croker, Lacep. IV. pp. 309, 314, 316,  
Opercularis, Quay et Gaim. Voy. Uran. Zool. p. 347.

Micropogon undulatus, Cuv. et Val. V. p. 219; Dekay.  
New York, Fauna, Fishes. p. 84. Holbr. Ichth. S. Coral.  
p. 145. pl. 21, f. 1; Dr. Günther, Cat. of the Fish. II. p.  
271; *M. lineatus*, Cuv. et Val. V. p. 215, pl. 119; Gay,  
Hist. de Chile, II. p. 193, *M. argenteus*, Cuv. et Val. V.  
p. 218.

Radianus costatus, Mitch. Trans, Lit, et Phil. Soc. New York, I. p. 417.

Micropogon costatus, Dekay, New York. Fauna Fishes p. 83, pl. 72, f. 230.

El M. V. posee tres ejemplares: uno es de la isla Juan Fernandez año de 1883 i otro de Chañaral año de 1897.

Se le da vulgarmente el nombre de *Corbina*.

No se indica la procedencia del otro ejemplar.

J. UMBRINA

Umbrina, Cuv. Règne Anim; Cuv. et Val. V. p. 17; Dr. Günther, Cat of the Fish. II. p. 273.

60. UMBRINA OPHICEPHALUS.

Umbrina ophicephala Jen. Zool. Beagle. Fish p. 45; Gay, Hist. de Chile, II. p. 189, Atl. Ict, lam. 3 bis, f. 1 ophicephalus, Dr. Günther, Cat. of the Fish. Coll. Brit Mus. II. p. 277.

De Chañaral posee el M. V. dos ejemplares. Es conocido con el nombre de *Pichigüen*.

61. UMBRINA FERNANDEZIANA.

Dr Philippi, (sp. inédita.)

El ejemplar que existe en el M. S. es de la isla de Juan Fernandez.

62. UMBRINA REEDI.

Dr. Günther, Voy. Challenger, Zool. I. p. 25.

63. UMBELIA ARGENTATA.

Dr Philippi (sp. inédita).

Procede de Valparaiso, año de 1873

J. SCIOENA

Scioena; sp., (Artedi) Cuv .Régne Anim; Cuv. et Val. V. p. 28.

Johnius, Bl. Schn. p. 74; Cuv. et Val. V. p. 140, Homoprion, Holbr, Ichth. S. Carol. p. 168.

64. SCIOENA ARGENTEA.

Dr. Philippi (sp. inédita)

El M. S. posee una especie clasificada así, que tiene por procedencia Iquique.

J. CORVINA

Corvina, Cuv. Règne Anim; Cuv. et Val. V. p. 81: Dr. Günther, Cat. of the Fish. II. p. 296.

65. CORVINA STELLIFER.

Bodianus stellifer, Bloch, taf. 231 f. 1.

Corvina trispinosa, Cuv. et Val. V. p. 109.

Corvina trispinosa, Gay, Hist. de Chile, Zool II. p 184

Corvina stellifer Dr. (Günther, Cat. of the Fish, Coll. Brit. Mus. II p. 299.

Se le da el nombre de *Corvinilla*.

Se lo encuentra en el continente e isla Juan Fernández

66. CORVINA ALBIDA.

Dr. Philippi (sp. inédita.)

El M. S. posee una especie proveniente de la costa del Algarrobo que el Dr. Philippi clasificó con el nombre que se deja apuntado, será la misma que con iguales nombres, genérico i específico, aparece en el Catálogo del Dr. Günther, año 1859; como procedente de la costa de Malabar i mar de la China?

67. CORVINA CORNUA.

Dr. Philippi, (sp. inédita).

El M. S. posee un ejemplar designado con ese nombre es de costa de Algarrobo.

68. CORVINA CARINATA.

Dr. Philippi (sp. inédita)

Ejemplar así clasificado desde el año 1873.

(Continuará)