

REVISTA BIBLIOGRÁFICA.

(ANÁLISIS, INDICES I EXTRACTOS)

FAUNA CHILENA

4.—Especies nuevas de Rincóforos.—Entre los trabajos sobre Historia Natural que registra el número correspondiente al mes de Julio del presente año de los ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, aparece una importante monografía del jénero *Rhyephenes*—*Schönh* escrita por don Federico Philippi, actual Director del Museo Nacional.

Segun la monografía en cuestion, el jénero *Rhyephenes* cuenta con 10 especies (1) de las cuales tres son nuevas para la ciencia i han sido descritas por don Federico Philippi.

Trascribimos a la letra las dianogsis de dhas. especies nuevas, cuyo conocimiento interesará indudablemente a nuestros lectores dados a los estudios entomolójicos.

RHYEPHENES SULCATUS.—F. Ph. (Anales CIV, 86).

Rh. convexus, ater; prothorace gibbo, elytris vix aut paullo latiore, supra scrobiculato-rugoso; elytris costatis, costis subtiliter retrorsum serratis sulcis punctis impressis nec tuberculis notatis, quo facillime a Rh. Maillei cui similis distinguitur.

Long. 13-17 mm., lit. baseos elytrorum 6-7 mm.

Concepcion, Cañete, Cautin, Lebú.

RHYEPHENES SQUAMIGER F. PH. (ANALES CIV, 88).

Rh. convexus, parallelus niger, subtus grosse punctatus albosquamosus; rostro in ♂ tuberculato in ♀ laevi punctato; prothorace dense foveolato-punctatus, elytris haud aut paululum latiore, quandoque squamis albis ornato; elytris tuberculis crebris rotundis in strias dispositis ornatis et in quoque depressione squama alba instructis, in humero macula albosquamosa bi-aut

() El "Catálogo de los Coleópteros de Chile" publicado por don Federico Philippi, en 1887, enumera 7 especies.

tripartita ornatis, apice coarctatis; pedibus punctatis, hispidis. tibiis compressis, extus carinatis, anterioribus intermeddisque incurvatis, in ♂ longioribus.

Long. absque capite 8-13 mm.; lat., prothor. 4-6 mm. lat. elytrorum 4-5 mm.

Aconcagua, Santiago, Maule.

RH- AEQUALIS F.—PH. (Anales, CIV, 90.)

Rh. convexus, niger, subtus grosse punctatus; rostro in ♂ tuberculato in ♀ laevi et punctulato; prothorace elytris latiore, grosse punctato-rugoso; elytris parallelis apice coarctatis tuberculato-striatis INTERSTITIIS HAUD TUBERCULATIS, macula humerali alba, squamosa bi-tripartita ornatis; pedibus hispidis, tibiis compressis, extus carinatis, incurvatis, praecipue anterioribus, quae in ♂ multum longiores sunt quam in ♀

Long. absque capite 8-14 mm., lat. prothor. 3-7 mm., lat. baseos elytrorum 3-5½ mm.

Habitat prope Concepcion et Chillan.

C. E. P.

