

REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL
ORGANO DEL MUSEO DE VALPARAISO

AÑO IV.

JUNIO DE 1900.

NÚM. 6.

ANTHURIA ECUADORENSIA NOVA

SECT. MELASTOMIFOLIA

(*Limbis* coriaceis, integris vel basi cordatis, erectis, e basi v. pa-
rum supra basim, praeter nervum medium, nervos laterales utrinque
1-5 mittentibus; hisce cum centrali et inter se per nervulos secun-
darios, transversos et subparallelos coniunctis; *spadice* erecto,
cylindrico, rigido, pro longitudine, plerumque crassissimo, spatham
(per anthesim) aequante, raro superante; bacca (ubi nota) ovata,
in stylum elongatum producta.

I. DILUTE VIRIDIA

Limbis, spatha et spadice per anthesin dilute viridibus, nunc sub
flavidis vel rubellis, *petiolis* ab latere compressis, antice 1-sulcati).

1. *Limbis* basi cuneatis v. plus minusve acutis, 5-9- nervis

1. A. sube Hipticum; terrestre; *caule* brevi, erecto, crassissimo
internodiis brevissimis; *cataphyllis* subcoriaceis, ser dissolvendis
lanceolatis, acutis; *petiolis* 10-20 cm. longis, cum geniculo tumido
incurvato 1-1½ cm. longo, a latere compressis, antice 1—sulcati;
limbis coriaceis, subtus glaucescentibus, nunc subtus sparse nigro-
punctatis, oblongo ellipticis, basi acutis in geniculum productis,
apice breviter subulato-acuminatis, 20-30 cm longis, 8-12 cm latis,
pli nervis; *nervis* omnibus subtus exertis, acutis, 2 infimis tenni-
oribus circa limbi medium in marginem confluentibus, ipsumque,
sursum ambientibus, 2 interioribus crassioribus, margini parallelis,
cum centrali in limbi cuspidem apicalem productis, nervosque cos-
tae II remotos (cum III tenuibus alternantes) parallelos, erecto
patentes excipientibus nervumque collectivum late (10-12 mm.)

intra marginalem constituentibus, *pedunculo* tenui, ancipi, petiolum paulo superante, *spatha* linearis lanceolata, spadicem (adhuc invenculum) tenuem, breviter stipatum parum excedente (Descr inxta specim viva).

Grescit in silvis tropicalibus secus fl.. Toachi (800 m. s. m.)

2. A. oblongifolium; terrestre, caudice-brevi erecto (3. cm. crasso; *cataphyllis* lanceolatis, 15-18 cm. longis, mature in fibras resolutis, *petiolis* robustis, erectis rigidis, 25-35 cm. longis, 5-7 mm. crassis, basi breviter vaginatis, alatere compressis, antice (cum geniculo tumido, 3-5 cm. longo) 1-sulcatis, vivis rubellis punctisque elongatis conspersis; *limbis* dense coriaceis, dilute viridibus, subtus pallidioribus, ibidemque v. utrinque rufo-punctatis, ambitu oblongo-ellipticis, apice v. utrinque obtusis v. basim versus⁺ longe cuneato angustatis, quam petioli plerumque brevioribus, latitudine sua 2-plo- 3-plove longioribus, 7 *nerviis*; *nervo centrali* utrinque prominulo convexo, lateralibus I et II supra immersis subtus exertis; 2 lateralibus infimis tenuibus, circa limbi medium in marginem confluentibus, mediis prope apicem, intimis cum centrali in apice desinentibus, omnibus per nervulos secundarios densos, erecto-patentes, transversos, subparallelos vicissim coniunctis; *pedunculo* erecto, obtuse angulato, petiolum superante; *spatha* rubella, herbaceo—papyracea, late linearis-ligulata, apice abrupte reviterque acuminata, basi antice aperta et marginibus in petiolum longe decurrente; *stipite* brevi (4-5 mm. longo); *spadice* erecto, cylindrico, per anthesin rubello, 15-18 cm. longo, 10-12 mm. crasso, fructifero ad 20 cm-longo, 3 cm. crasso roseo-purpurascente; *tepalis* sub anthsi 2 mm. longis aequae ac latis, fructiferis 2-plo 3-plove longioribus; *filamentis* late linearibus; *bacca* ovata. maturescendo in stylum conicum e *tepalis* longe exertum producta. (D. i sp. viv.)

3. A. latifolium; caudice brevi, erecto, crasso; internodiis brevissimis; *cataphyllis* triangulari lanceolatis, 20 cm longis, mox in fibras reticulatas resolutis; *petiolis* basi breviter vaginatis erectis, robustis, 25-30 cm. longis, ab latere leviter compressis, dorso convexis, antice (cum geniculo tumido, 3 cm. longo) late 1-sulcatis. *Limbis* coriaceis, opacis, dilute viridibus, subtus pallidioribus, utrinque parce fusco punctatis; ambitu late ellipticis, basi vix acutis, apice obtusis, 35-40 cm. longis, 25-30 cm. latis, 7-9-nerviis; *nervo medio* utrinque prominente, subtus convexo, supra angulato, cum 2 basalibus intimis in apice desidente reliquis gradatim inferius in marginem confluentibus; omnibus per nervulos II transversos patentes, approximatos, subparallelos vicissim coniunctis; *pedunculo* (adhuc invenculo) gracili, quam pedunculus du-plo breviore; *spatha* linearis lanceolata, 10-12 cm. longa vix 10 mm. lata,

basi oblique inserta, apice acuminata et convoluta, ut spadix dilute flavidio-vivescente; *spadice* (nondum evoluto) breviter stipitato, 12-15 cm. longo, 6-7 mm. crasso, cylindrico, armato, obtuso.

(D. i. sp: viv).

Crescit in silv. tropicalib. andium occid. prp. "La Palma".

2. *Limbis basi cordatis, 7-pli-9-pli-nerviis.*

4. A. Engleri; *Caule* brevi, erecto crasso, *internodiis* brevissimis; *cataphyllis* triangulari-lanceolatis, 15-20 cm. longis, tenuibus, mature in fibras reticulatas resolutis; *petiolis* basi subcontiguis, intus breviter auriculatim vaginatis, robustis, erectis, rigidis, 35-40 cm. longis, ab latere parum compressis, dorso rotundatis, antice (cum geniculo crasso, $2\frac{1}{2}$ -3 cm. longo) late obtuseque 1-sulcatis; *limbis* coriaceis opacis, supra laete viridibus, subtus pallidioribus, utrinque (subtus densius) fusco-punctatis, e basi ovata⁺ profunde cordata et asymmetrica a triente inferiore versus apicem obtusum gradatim (linea curva) angustatis, latitudine sua duplo v. subtriplo longioribus, *petiolis* aequan-tibus v. iis parum brevioribus, 7-pli-nerviis; *nervo centrali* utrinque exerto et rotundato, cum binis intimis in apicem apiculatum confluente, 2 intermediis parum infra apicem 2 exterioribus ad $\frac{1}{3}$ limbi partem in margine desinentibus, omnibus per nervulos II transversos densos, patentes, parallelos, cum III tennioribus alternantes, vicissim coniunctis, *pedunculo* (in specimine ad huc invenculo) quam petiolus subduplo breviatore, gracili *spatha* herbaceo-papyracea, 6-8 cm. longa, vix 1-cm. lata, linearis, ad apicem abrupte acuminato subulata, basi antice, breviter decurrente, *Spadice* breviter stipitato, sub anthesi 10-12 cm. longo, 6-7 mm. crasso, cylindrico, apice obtuso. (D. i. sp. viva).

Crescit cum praecedente.

5. A. rhodostachyum; *caule* brevi, erecto, valde crasso; *internodiis* brevibus; *cataphyllis* triangulari-lanceolatis, 20-25 cm. longis, mox in fibras reticulatas resolvendis; *petiolis* subcontiguis, erectis robustis, 45-50 cm. longis, basi incrassatis et intus, breviter vaginatis, ab latere parum compresdorso rotundatis, antice, cum geniculo crasso, 5-6 cm. longo; late obtuseque—sulcatis; *limbis* dense coriaceis opacis, utrinque (cum petiolis pedunculisque) fusco-punctatis, supra intense viridibus, subtus pallidioribus, 40-45 cm. longis, 25-30 cm. latis, e basi cordata ovatis, apice lobisque basalibus divergentibus obtusis, 9-v. 9-plinerviis; *nervis* subtus, conspicue prominentibus convexis, supra, praeter centralem rotundatum immersis; *nervo centrali* cum 2 intimis apice limbi in glandulam desinentibus, ceteris gradatim inferius in margine terminatis; omnibus per nervos II remotos patentes subparallelos, cum III

tennioribus alternantes coniunctis; *pedunculo* erecto, robusto, quam petiolus plerumque paulo breviore; *spatha* papyraceo herbacea rubescente, stipiti oblique adfixa, antice aperta (stipitem nudante) in petiolum decurrente; *spadice* erecto, cylindrico, apice obtuso rubente sub anthesi 18-20 cm. longo 10-12 mm. crasso, fructifero 25...cm longo, 2-2½ cm crasso et longius stipitato; *tepalis* (fructiferis) elongatis, roseo-purpurecentibus; *bacca* ovato-lanceolata, dilute rosea, in stylum purpureum elongatum producta.

Crescit cum duabus praecedentibus.

Speciei postremae affinis et forte altera alterius varietas, sed haec omnibus partibus maior; *petiolis* quam limbi longioribus, limbis basi conspicue profundius cordatis, pro longitudine latioribus et evidentius 9-pli-nerviis; *pedunculo*, *spatha* et *spadice* longioribus.

II. ATROVIRIDIA

Foliis, cum spatha et spadice utrinque saturate viridibus.

1. *Petiolis ab latere + compressis, antice (geniculoque) 1-sulcatis.*

6. A. Söderströmii; *caudice* crasso, brevi, erecto; *internodiis* brevibus; *cataphyllis* 20—25 cm. longis, triangulari-lanceolatis, acutis, coriaceis, nigrescentibus, sero resolvendis; *petiolis* 35—40 cm. longis, robustis, basi breviter vaginatis, alatere parum compressis, dorso subrotundis, antice (geniculoque tumido 3—4 cm. longo) late obtuseque 1—sulcatis, cum limbis utrinque nigro-punctatis; *limbis* crasse coriaceis atro viridibus nitentibus, utrinque, cum petiolis pedunculisque, nigro-punctatis, ambitu ovatis, basim versus obliquato-inaequilateris, 30—40 cm. longis, 18—24 cm. latis, 7—nerviis; *nervo centrali* utrinque prominente, rotundato, ceteris supra impressis, subtus prominulis, 2 intimis cum centrali in apicem glanduliferum confluentibus, reliquis gradatim inferius in margine desinentibus, omnibus per nervulos transversales, patulos, subparallelos, cum tennioribus alternantes coniunctis; *pedunculo* quam petiolus breviore, subancipite, leviter striato; *spatha*, late linearilanceolata, subcoriacea, basi obiter angustata et antice breviter decurrente, apice angustato et convoluto; *spadice* breviter (3-5mm) stipitato, cylindrico, apice obtuso, subanthesi 12—14 cm. longo, 10—12 mm. crasso, atro-virente.—(fructifer ignotus,) (D. i.sp.viv.)

Crescit in silv. occid. m. *Pichincha* versus Nanegal et Gualea.
Legit. LUD. SÖDERSTRÖN, Consul brittan. Quiti.

7. **A. ellipsoideum,** *caudice* breviter scandente, erecto, robusto (5—6cm. alto, 5—6 cm. crasso); *internodiis* 1½—2cm. longis,

cataphyllis dense coriaceis, 20—25 cm. longis, sero in fibras resolvendis; *petiolis* robustis, rigidis, longiuscula (6—8 cm.) vaginatis, 35-45cm. longis, 1- $\frac{1}{2}$ cm. crassis creberrime nigro punctatis, striatis, ab tatero conspicue compressis, dorso carinatis, antice profunde et anguste sulcatis, lateribus sulci introrsum planis, extrorsum argute carinatis; geniculo crasso, 4-5 cm. longo. *Limbis* dense coriaceis, utrinque saturate viridibus, nitentibus supra impresso—subtus dense nigro—punctatis, ambitu ovali-ellipticis, ± asymmetricis, basi inaequaliter cuneatis, picea obtusis, 45-50 cm. longis, 24-28 cm. latis, 7 (v. obscure) 9-nerviis; *nervo centrali* utrinque prominente, subtus rotundata supra angulato; lateralibus subtus prominulis, supra immersis; 2 intimis, cum centrali in limbi apicem (glandula nigra exerta notatum) confluentibus, 2 intermediis parum infra apicem, 2 extimis ad $\frac{1}{2}$ inferiorem in margine evanescentibus; omnibus per nervulos II, transversos, subparallelos erecto-patentes vicissim coniunctis; *pedunculo* crasso, sub ancipite, striato, quam petiolus $\frac{1}{2}$ breviore; *spatha* subcoriacea atroviridi, 12-15cm. longa (ad $\frac{1}{4}$ inferiorem) 4 cm. lata, deorsum constricta in pedunculum decurrente, sursum angustata et in apicem cucullatum producta *spadice* breviter (4-5mm) stipitato, per anthesim (cum stipite atro-viridi, cylindrico, apice obtuso v. breviter mucronato, spatham breviter superante fructifer ignotus).

Crescit cum precedente.

Species, magnitudine et numero foliorum (in specim. 12) diu perenantum inter ceteras huius sectionis insignis.

2. *Petiolis* geniculis, pedunculisque teretibus v. antice obiter complanatis; *limbis* latitudine sua parum longioribus.

8. A. ovatum; *caudice* erecto v. ascendente, crassiusculo; *internodiis* 2-3 cm. longis aequa ac crassis; *cataphyllis* subcoriaceis, lanceolatis, acutis, petiolis arcte adpressis, 15-20 cm. longis, mature resolvendis; *petiolis* erectis, rigidis, gracilibus, limbos superantibus, cylindricis v. cum geniculis, antice obiter complanatis, basi intus breviter vaginatis; *geniculo* 3 cm. longo; *limbis* dense papyraceis v. coriaceis, opacis, atro-viridibus, subtus pallidioribus et nigropunctatis, ambitu ovatis asymmetricis, basi acutis, apice obtusis, 25-30 cm. longis, 20-25 cm. latis, 7-v. obscure 9-nerviis; *nervo centrali* utrinque prominente convexo, lateralibus et II supra immersis subtus prominulis; 2 lateralibus intimis cum centrali in apicem glandula nigra apiculatum confluentibus, externis gradatim inferioris in margine evanescentibus; utrisque per nervulos II transversos, subparallelos, approximatos, cum III alternantes coniunctis; *pedunculo* petiolum aequante, graciliore, erecto rigido; *spatha* (in specimine basi tantum superstite) basi valde oblique adfixa, antice aperta et longe in stipitem decurrente; *stipite* gracili 8-10mm. longo; *spadice* (fructifer tantum notus) erecto, cylindrico, obtuso,

20 cm. longo, 15 mm. crasso, atro-virente: *tepalis* latitudine sua plus duplo longioribus; *bacca* (nondum matura) ovali-oblonga, stylo elongato ultra petala producta.

Crescit in silv. subtropical. prope "Gualea".

Species *A. ovatifolio* Engl. (*Beitrag zur Kenntnis der Araeaceae VIII* p. 437) proxima, a quo differt limborum basi in petiolum producta (minime cordata) et nervis I lateralibus in pagina inferiore iam a basi liberis.

ALOISIO SODIRO, S. J.



CATÁLOGO DE LOS PECES DE CHILE

POR EL

Doctor FED. T. DELFIN

Naturalista adjunto del Museo de Historia Natural de Valparaíso.

(Continuacion).

FAM. NOTIDANIDAE

J. NOTIDANUS.

Notidanus, Cuvier (1817).

Hexanchus et *Heptanchus*, (Mull. et Henl. (1840).

Monopterhinus (part.) Blainville (1828).

226. N. VULGARIS, Perez C., *Est. sobr. alg. Esc. de Chile*, p. 8 (1886); *Phil. An. Mus. de Chile*, p. 22 (1887), *Lám. VI. fig. 1.*

Se le conoce con el nombre vulgar de *tiburon*, El M. V. posee los dos únicos ejemplares conocidos de esta especie.

227. N. (HEPTANCHUS) FEROX, Perez C., *Est. sobre. alg. Esc. de Chile*, p. 7 (1886); *Phil. An. Univ. de Chile*.

FAM. SCYLLIIDAE

M. & H., *Syst. Plag.* (1840); *Gthr. Cat.* (1870); Martinez i Saez, *Distr. met. Vertebr.* (1870).

J. SCYLLIUM

Acyllium sp. Cuv. *Regne Anim.* (1879).

— M. & H. p. 3 (1840); *Gthr. Cat. Fish*, VIII, p. 400 (1879); Martinez i Saez, *Distr. met. Vertebr.* p. 356 (1879).