

LISTE DES ARACHNIDES

RECUEILLIS PAR M. CH. E. PORTER EN 1899
A QUILPUÉ ET A MOLLE, ET PAR M. B. WILSON EN
AVRIL 1900 AU RIO AYSEN (PATAGONIE OCCIDENTALE)

ET DESCRIPTIONS D'ESPÈCES NOUVELLES

— PAR —

EUGÈNE SIMON

FAM. SICARIIDÆ

Sicarius terrosus (Nicolet.)

Rio Aysen (B. Wilson.)

FAM. ULOBORIDÆ

Sybota abdominalis (Nicolet.)

Sylvia abdominalis Nic., in Gay, Hist. de Chile, Zool. III, 1847,
p. 466, tab. V, fig. 2.

Quilpué, (Sept. 1899).

Cette espèce est très variable comme teinte et il paraît probable que les *Sylvia abdominalis*, *similis*, *atra*, *rubiginosa* et *vittata* Nicolet, ne sont que les diverses livrées ou âges d'une même espèce. L'individu recueilli à Quilpué est très obscur et répond à la forme *atra* Nicolet, nous avons reçu autrefois le type de Santiago.

FAM. DICTYNIDÆ

Amaurobius rorulentus (Nicolet.)

Clubiona rorulenta Nic., loc. cit., p. 437.

Rio Aysen (B. Wilson av. 1900.

Décrit de la province de Valdivia.

FAM. THERIDIIDÆ

Chrosiotes Porteri sp. nov. ♂ long. 4^{mm}. Cephalothorax subrotundus, fronte obtusa, parte thoracica late sulcata, pallide luteus, parte cephalica postice leviter rufuscata, thoracica utrinque vitta latissima simecirculari cinereo-nigra, tenuissime punctata notata, area oculorum rufuscata, oculis singulariter et sinuose nigro-cinctis. Oculi quatuor postice albi, maximi, ruter se subaequales et valde appropinquati sed medii a sese quam a lateralibus paulo remotiores. Oculi antici, antici visi, in lineam subrectam, laterales albi et ovati, medii paulo minores nigri et rotundi, a sese distantes sed a lateralibus contigui. Area quatuor mediorum plana et valde obliqua, subquadrata, medii antice posticis evidenter minores. Clypeus latus, leviter depressus, ad marginem attenuatus sed obtusus. Abdomen longe oblongum, antice rotundum et leviter prominulum, postice vix ampliatus atque obtusum, albido-testaceum, crebre albo-opaco-punctatum, parcissime flavido-setosum, supra antice fere inordinati et parce nigro-reticulatum, postice lineis transversis nigris iniquis et sinuosis ornatum, subtus macula epigasteris nigricanti notatum. Sternum fulvo-olivaceum, tenuiter nigro-marginatum. Pedes longissimi, pallide lutei, femoribus 4ⁱ paris apice sat late fusco-olivaceo annalutis, patellis cunctis tibiisque ad apicem leviter infuscatis. Pedes-maxillares pallide lutei, tarso bulboque nigricantibus; femore longo, sat robusto, cylindrato, versus basin vix attenuato; patella vix dimidio longiore quam latiore; tibia patella haud longiore, ad basin angustiore ad apicem valde ampliata et oblique secta, extus secundum tarsum late producta et truncata; tarso bulboque late et longe ovatis fere *Episini*.

Molle (Sept. 1899.)

Cette espèce intéressante fait presque le passage des *Chrosiotes* aux *Episinus*. Elle diffère surtout du *Chrosiotes silvaticus* E. Sim., (de Venezuela,) par ses yeux postérieurs en ligne plus récurvée et par son abdomen beaucoup plus long, orné en dessus de dessins noirs.

FAM. ARGIOPIDÆ

Meta patagiata sp. nov.

♀ long. 9^{mm} a *M. longipedi* et *Porteri* E. Sim. præsertim differt fronte angustiore, oculos quatuor posticis majoribus, in lineam subrectam et inter se aequidistantibus (spatiis interocularibus oculis non duplo majoribus) et area oculorum quatuor mediorum non longiore quam postice latiore. Cephalothorax laevis,

parce albido-pilosus, parte cephalica vitta latissima, antice posticeque attenuata et leviter rhomboidali, thoracica vitta marginali lata sed antice attenuata, fusco-olivaceis, notatis. Abdomen longe oblongum, antice posticeque obtusum, supra fulvo-roseum et utrinque albo-punctatum, vitta latissima integra paulo obscuriore, utrinque tenuiter et sinuose fusco alboque marginata, in parte basali lineolis binis incurvis antici convergentibus, punctisque quatuor albis munita, ornatum, subtus vitta media lata nigricanti utrinque linea lutea marginata notatum. Chelae longae, validae, fulvo-nitidae, margine superiore sulci dentibus trinis, 1.° paulo majore, 1.° et 2.° a sese subcontiguus altero remotiore, inferiore dentibus binis subaequis a sese remotis, denteque minore, prope dente 1.° sito, instructis. Parte oris sternumque laevia, fusca fere nigricantia. Pedes longi, fulvi, haud punctati, femoribus anticis subtus confuse infuscatis, tibiis metatarsisque apice fusco-annulatis. Tuberculum genitali, nigrum, semicirculare.

Molle (Sept. 1899.)

Meta aurora sp. nov.

♀ long. 6^{mm} Cephalothorax laevis et glaber, pallide luteus, vitta media confusa pallide fusco-rufula notatus. Oculi cuncti mediocres et subaequales, singulariter nigro-cincti, quatuor medii areum subquadratum (vix longiorem quam latiore et antice quam postici vix angustiore) occupantes, oculi laterales utrinque prominuli et disjuncti (spatio interoculari oculo duplo minore). Oculi quatuor postici, superne visi, in lineam leviter recurvam, medii a lateralibus quam inter se fere duplo remotiores. Oculi quatuor antici, antice visi, in lineam magis recurvam. Clypeus oculis mediis anticis haud duplo latior. Abdomen ablongum, convexum, antice posticeque obtusum, supra laete aurantiacum, vitta media lata fusca vel nigricanti albo-marginata, marginem anticum haud attingente, ornatum, subtus fusco-lividum, area media magna subquadrata paulo dilutiore, vix expressa, notatum. Chelae luteae, laeves et nitidae. Partes oris sternumque fusco-olivacea. Pedes longi, pallide lutei, parce et tenuiter aculeati, quatuor antici femoribus ad apicem patellisque leviter rufuscatis, tibiis ad apicem rubro-annulatis. Tuberculum genitale transversum, postice ad apicem crasse nigro-marginatum, antice foveolis binis transversis et subgeminatis impressum.

Molle (Spt. 1899).

Araneus flaviventris (Nicolet).

Molle (Sept. 1899).

Araneus labyrinthicus (Hentz).

Quilpué 1899).

Gnous cordiformis (Nicolet).

Arkys cordiformis Nic. loc. cit., p. 385.

Arkys variabilis id., p. 385.

Gnolus cordiformis E. Sim., Soc. ent. Belg., C. R. av. 1879.

Id. S. Sim., act. soc. sc. Chili, VI, 1896, p. 68.

Molle (Sept. 1899).

FAM. MIMETIDÆ.

Oarces reticulatus (Nicolet.)

Arkys reticulatus, piriformis, Gayi, flavescens, liliputanus, et inflatus. Nic. loc. cit. p. 387-389.

♀ Long 7mm. Cephalothorax convexus nitidus et glaber, parte cephalica fusco-castanea, maculis mediis binis triquetris subgeminatis maculisque posticis binis longis et obliquis, pallide luteis notata, thoracica pallide lutea, vitta media fusca sat angusta et utrinque vitta marginali pallide fusca profunde tridentata notata, fronte late truncata. Oculi quatuor medii, aream non longiorem quam latiore et antici quam postice angustiore occupantes, medii antici posticis minores. Oculi laterales utrinque prominuli et subcontigui, anticus postico minor. Abdomen breviter ovatum, antice rutundum et minute emarginatum, postice in tuberculum obliquum, crassum et obtusum insigniter elevatum, supra albidum, nigro et parcius roseo varigatum et subreticulatum, tuberculo postico albo nigroque segmentato, subtus testaceum, mamillae fulvae nigro-marginatae. Chelae robustae, castaneae, nitidae. Partes oris olivaceae. Sternum nigrum. Pedes 1. i paris reliquis multo longiores et robustiores, aurantiaci, coxa trochantere femoreque ad basin nigricantibus, tibia annulo basali luteo, annuloque apicali fusco notata, metatarso (valde curvato) tarsoque albido-luteis, minute et vix distincte annulatis, reliqui pedes albido-lutei (3. é exep.) rufulo fuscoque leviter annulati. Pedum 1.º paris femur antice aculeis longis binis, tibia subtus aculeis longis et erectis sed iniquis (basilaribus apiculibus minoribus) intus 7 extus 3, metatarsis aculeis similibus sed longioribus, intus duobus, extus nuico submedio atque inter aculeos principales aculeis seriatis multo minoribus et incurvis, insigniter armata. Tuberculum vulvae, obtuse triquetrum vel semicirculari, castaneum, supra coriaceum ad marginem nitidum.

Molle (Sept. 1899).

Décrit de Valdivia par Nicolet, indiqué depuis par nous-même de la Sierra de Chillan (Germain).

Nous avons cru utile de donner une nouvelle description de cette belle espèce, jusqu'ici imparfaitement connue.

FAM. THOMISIDÆ

Coenypha fuliginosa (Nicolet).

Thomisus fuliginosus Nic., loc. cit. p. 392.

Nous avons proposé le genre *Coenypha* (Hist. Nat. Ar. t. I p. 1053) pour quelques espèces chiliennes décrites par Nicolet sous le nom générique de *thomisus* (*T. Edwardsi*, *Lucasi* et *fuliginosus*).

Quilpué (1899).

Décrit de la province de Valdivia.

FAM. CLUBIONIDÆ

Polybetes Martius (Nicolet).

Olios Martius Nic. loc. cit., p. 413, tab. III fig. 5.

Quilpué (Ch. E. Porter, 1899); Rio Aysen (B. Wilson, av. 1900)

Tomopisthes immanis E. Simon.

T. immanis S. Sim. Bull. Soc. Zool. Fr. XI, 1884—id.

Mss. Sc. Cap Horn. t. VI, Zool.

Molle (Sep. 1900).

Connu jusqu'ici de la région fuégienne.

FAM. LYCOSIDÆ

Lycosa indomita Nicolet, loc. cit. p. 360.

Rio Aysen (B. Wilson av. 1900).

FAM. ATTIDÆ

Nous décrivons comme nouveaux deux attides du dernier envoi de Mr. Ch. E. Porter sans être absolument certain qu'ils ne figurent pas parmi les nombreuses espèces trop brièvement décrites par Nicolet et qu'il sera probablement toujours impossible de reconnaître avec certitude ces espèces rentrent dans le genre *Evophrys* sense stricto. (Type *G. frontalis* Walck.)

Evophrys quilpuensis sp. nov.

♀ Long 6mm. Cephalothorax laevis, nigrinus, postice versus marginem, sensim dilutior et rufescens, pilis simplicibus et longos albos crebre vestitus, parte cephalica supra, macula media alba excepta, parte thoracica utrinque pone oculos, fulvo-rufulo-pilosis.

Pili oculorum et clypei densi et longi, albi. Quadrangulus oculorum, superne visus, postice quam antice vix angustior. Oculi antici inter se subcontigui, apicibus in lineam vix recurvam. Abdomen oblongum, antice albo portice pubescens, vittis binis fuscis sat angustus subrategris et valde flexuosis supra ornatum, subtus luteo-testaceum parcius et brevius albido-pilosum. Chelae robustae fusco-rufescentes, laeves, nitidae, antice longo sed parum dense albo crinitae. Sternum fusco-olivaceum. Pedes pallide fulvi, fusco-olivaceo annulati. Area genitalis fovea magna, ovato transversa, carinula lata et sulcata secta, impressa.

Quilpué (1899).

Evophrys saitiformis sp. nov.

♀ Long 5,5mm. Cephalothorax laevis, pallide luteus, parte cephalica fusca utrinque, prope oculos nigro, thoracica vittis duabus fuscis dentatis postice valde altenuatis notata, parce albo-pubescentis et utrinque prope oculos pilis fulvo-rufulos munitus. Pili oculorum et clypei longi, albi, ad marginem anteriorem oculorum mediorum pilis aurantiacis paucis mixti. Oculi quatuor antici inter se subcontigui, apicibus in lineam rectam. Quadrangulus oculorum superne visus parallelus. Abdomen oblongum, luteo-testaceum, albo fulvoque longe sed parum dense pubescens, vittis duabus fuscis inter se remotis et postice divaricatis oblique striatis et prope apicem maculis parvis nigros triquetris uniseriatis supra ornatum, subtus parce fusco-punctatum. Chelae laeves et glabrae, partes oris sternum pedesque pallide lutea, parte labiali infuscata, femoribus quatuor posticis subtus olivaceo biguttulatis metatarsis posticis apice minute fuscis. Pedes aculeis ordinariis sat longis armati, metatarso antico tarso vix longiore. Area genitalis plagula media sat magna nigro nitida, obtuse triquetra et utrinque foveola parva rufula, munita.

Molle (Sep. 1899).

