ESTUDIOS SOBRE LA ORNITOLOJIA CHILENA

POR

FEDERICO ALBERT

(*Continuacion*)

FAM MOTACILLIDAE

(Caminantes i Aguzas)

Pico delgado cilíndrico; respiraderos nasales, basales; cabeza redonda; cuerpo esbelto; alas largas i puntiagudas; cola larga, escotada; tarsos esbeltos provistos de escudos; dedos i uñas largas.

Plumaje abigarrado i sencillo; los colores dominantes son pardo negro, ceniciento i amarillo.

Se alimentan de insectos, larvas i gusanos.

Habitan todos los continentes; se distinguen unas 60 especies repartidas en 7 jéneros; en Chile no hai sino un representante de esta familia que es *Anthus correndera*.

J. ANTHUS—*Bechstein*.

Pico derecho, cilíndrico; respiraderos nasales basales; plumaje manchado; cola escotada; tarsos de mediana lonjitud, uñas débiles i poco encorbadas.

Anthus correndera *Vieillot*.

Vulg. *Caminante*.

Sin: Alondra correndera *Azara*.
Corydola chilensis *Lesson*.
Anthus furcatus *D'Orbigny*
" Chii *Vieillot*.

Medidas:

1)	Largo total—	14,2	a	15,8	cm.
2)	" del pico—	1,5	"	2,1	"
3)	" de las alas—	7,5	"	7,8	"
4)	" de la cola—	5,8	"	6,1	"
5)	" del tarso—	2,2	"	2,3	"

La cara superior parda bruna, alas i cola pardas brunas, garganta blanca con dos fajas pardas, el pecho, pico i patas amarillentas, ojos negros.

Macho i hembra se distinguen en el color de las plumas.

Se encuentran con frecuencia a orillas de los caminos; se alimentan de granos, de algunos coleópteros, procrean de setiembre a noviembre; anidan en la tierra, escondidos entre la yerba; ponen de 4 a 6 huevos blancos.

Habitan la Patagonia, Arjentina Perú, Bolivia i Brasil.

Variedades:

Esta ave se asemeja mucho al color de la tierra en que vive, así se esplica que el plumaje del invierno suele ser un poco distinto al del verano i esta circunstancia en compañia de la del crecimiento del espolon, que naturalmente es mas corto en el estado de la juventud, ha dado lugar a los sinónimos, entre otros, el *Anthus chilensis* de Philippi; dichas diferencias en realidad no existen, pues, se encuentran los mismos en cada una de estas especies.

FAM. COEREBIDAE

(Guit-guitas.)

Pico derecho, mediocre, débil; respiraderos nasales laterales; cabeza redondeada; alas de mediana lonjitud, cola mediocre cortada derecha, algo redondeada; tarsos delgados, escamados; plumaje suave, de colores brillantes, dominando el negro, blanco, rojo, etc.

El *macho*, *hembra* i el *ave nueva* se distinguen con dificultad en el colorido del plumaje; lengua larga cilíndrica.

Son aves útiles que se alimentan de insectos; viven por lo jeneral de a pares, solo para emigrar se reunen en bandadas; la hembra pone de 2 a 4 huevos.

Habitan el norte de Sud América, América Central i el Sur de América Setentrional.

Se conocen 12 jéneros con 72 especies, de los cuales una suele visitar las provincias del norte de Chile.

J. CONIROSTRUM.

Pico de mediana lonjitud, derecho; respiraderos nasales basales; alas largas; cola mediana i cortada derecha; tarsos delgados.

Conirostrum cinereum, d'Orbigny.

Vulg. *Guit-guita.*

Sin: Conirostrum fraseri—Sclater.

Medidas:—	1)	Largo total	12	cm.
	2)	" del pico	1.1	"
	3)	" de las alas	6.10	"
	4)	" de la cola	4,8	"
	5)	" del tarso	1,7	"

La cara superior cenicienta, un poco mas rojiza hácia la rabadilla, ceja blanca, ancha; alas i cola negruzcas; garganta superior blanquizca amarillenta, el medio del pecho, el vientre i las piernas rojizas; el pico i las patas oscuras

Hembra parecida al macho; *ave nueva*, cenicienta en la cara superior; la ceja, los costados de la cabeza i la cara inferior del ave son amarillentos; alas de un blanco sucio. Se alimenta el guit-guita de insectos.

Habita el Ecuador, Bolivia, el Perú i las provincias del norte de Chile.

(Continuará)