

La forma più affine è *C. integer* Edw. delle coste meridionali degli Stati Uniti, delle Antille e del Brasile. Esempjari di questa specie provenienti da St. Thomas differiscono da *C. minutus* pel carapace assai più largo in rapporto alla lunghezza, meno convesso, distintamente granulato sul fronte, sui margini antero e postero-laterali, per il bordo del quadro boccale non conspicuamente granuloso, e inoltre per l'addome che si restringe gradatamente nei somiti III — VI ed ha quindi figura triangolare.

*Hab.*: "Cote de Talcahuano." (Jacquinot et Lucas).



## UN JÉNERO I TRES ESPECIES NUEVOS

DE

# TISANUROS CHILENOS

POR EL

**Dr. FILIPPO SILVESTRI**

(Bevanga, Umbria)

### 1 *Japyx megalocerus* sp. n.

Antennae 50 articulatae, articulis setis biseriatis brevibus et brevioribus instructis.

Abdomen tergitis setis duabus longis submedianis posticis et setis 3-4 lateralibus auctis, sternitis setis brevibus et brevioribus sparsis parum raris.

Tergitum 7<sup>um</sup> (1) postice utrimque rotundatim excisum, angulis triangularibus acutis.

Forceps (2) brachis sat attenuatis apice arcuato, tuberculis parvis fere usque ad apicem auctis et dente singulo armatis, dente brachii dexteri a basi forcipis parum magis quam idem lævis distante.

Long. corp. 37, lat. 5.

Long. antenn. 9.5; forcipis 4,5,

Exempla minora differunt tergito septimo angullis posticis parum productis et colore parum pallidiore. Forceps (3).




Fig. 2.—JAPYX MEGALOCERUS, *Silv, n. sp.*

Exemplum unum inter plura antennis tantum 35-articulatis. Patria. — Chile: *San Vicente* (Talcahuano).

Por las dimensiones, esta especie seria intermedia al *J. dux* Skorikow i al *J. goliath* Parona, pero difiere de ambos por la forma de la tenaza i de este último tambien por el número de los artejos de las atenas que es de 58.

## 2. *Japyx anodus*, sp. n.

Antennae 26-articulatae.

Abdomen tergitis antice setis longis duabus medianis, duobus sublateralibus et duabus lateralibus, postice setis longis duabus submedianis et duabus lateralibus, et setis nonnullis brevibus inter setas longas instructis, sternitis seriebus quatuor setarum paucarum sat longarum et setis nonnullis brevioribus sparsis. Tergitum 7<sup>um</sup> angulis posticis acute parum productis.

Forceps brachio dextero parum falciformi edentato tuberculis duobus basilibus parvis, cetero margine, vix crenulato, brachio laevo falciformi, dextero parum magis attenuato, tuberculis duabus basalibus perparvis et margine cetero interno vix vix crenulato.

Long. corp. 10. lat. 1,5.

Long. antenn. 3, forcipis, 0,9.

Patria. — Chile: *Temuco*, *Coipué* (Villarica).

## Gen. **EUTRICHOCAMPA** nov.

Genus hoc sculptura corporis *Campodeae* aequale, tarse terminatione *Lepidocampae* valde affine, ore, trorace et abdomine his generibus aequale.

Typus:

### 3. *Eutrichocampa chilensis*, sp. n.

Crenea. Caput subcordiforme lateribus supra setis nonnullis instructum. Antennae sat longae, attenuatae, 29-articulatae, moniliformes, articulis setis paucis brevibus instructis, articulo ultimo elliptico, penultimo aliquantum longiore.

Thorax tergitis setis nonnullis posticis brevibus et nonnullis posticis brevibus et nonnullis lateralibus longis apicem versus serratis, et setis pluribus sparsis, parum raris, supra auctis, sternitis setis brevibus sparsis et setis nonnullis lateralibus, sat longis, serratis.

Abdomen tergitis setis brevibus, parum raris, plenis et setis nonnullis posticis lateralibus auctis, sternitis setis brevibus, parum raris, plenis et seta laterali, robusta, serrata. Styli et vesiculae in segmentis 2-7. Sternitum primum processibus duobus cylindricis, crassis postero-lateralibus instructum. Sternitum decimum postice paululum sinuatum. Tergitum decimum postice non productum, vix triangulare vel paululum rotundatum. Cerci sat longi, graciles, articulis 11-12, inter se parum distinctis, seriebus 3-4 circularibus setarum longarum apicem versus serratarum instructis.



Pedes (Fig. 3) articulis omnibus setis brevibus instructis, coxa et trocantero brevissimis, femore tibia aliquantum longiore, lateraliter setis nonnullis longis aucto, tibia tarso longiore spinis duabus subtilibus apicalibus armata, tarso unguibus duobus arcuatis, brevibus armato et infra ad basim unguium appendice laminari, pilis minimis instructa, aucto.

Lon. corp 4, Lat. 0.6.

Long. anteun: 2.4, cercorum, 2.2.

Patria. — Chile: *Talca*.

Habitat: subsaxis.

Exemplum unum differt: antennis 19 articulatis et setis dorsalibus et ventralibus brevissimis, sed quum esset, si varietas vel species distincta affirmare nequeo.

