

CARCINOLOGIA CHILENA

Nueva localidad de la *Cervimunida Johni*.

Creo de interés para los carcinólogos dejar constancia que el *Galateido Cervimunida Johni* Porter, cuya descripción se publicó en esta Revista, tomo VII (1903) pp. 276-77, alcanza por lo menos hasta la latitud de Valparaíso.

El señor E. Laroze, de este puerto, ha tenido a bien remitirme dos ejemplares encontrados en el estómago de un congrio pescado en estos días.

Aunque algo destruidos los ejemplares (pues había comenzado la digestión), conservan casi íntegros el carapacho y el pleon y, uno de ellos, el pedúnculo de una de las antenas en cuyas partes están los caracteres distintivos más importantes para poderlos identificar con el ejemplar procedente de Coquimbo que me sirvió para establecer la especie el año 1903.

De los ejemplares recientemente recibidos, uno (♂) es algo más pequeño y el otro (♀) un poquito más grande que el obtenido por el señor John en Coquimbo.

Así es que, hasta hoy, nuestra especie—que parece rara—se ha encontrado en la bahía de Coquimbo y en la de Valparaíso y, ambas veces, en el estómago del pez carnívoro *Genypterus blacodes*.

CARLOS E. PORTER.

VALPARAISO, Febrero de 1905.

