



# ANTURIOS NUEVOS ECUATORIANOS

— POR —

ALOISIO SODIRO, S. J.

(Continuacion).

b *Limbos* dobles mas largos que anchos; *pedúnc.* mas o menos dobl mas largo que los *petiolos*.

**26 A. litanum** sp. nov.; *caudice* assurgente vel scandente, e nodis radicante; *internodiis* varie elongatis; *cutaphyllis* cartilagineis, linearis-lanceolatis, elongatis, mox deciduis; *petiolos* subcylindricis, basi breviter vaginatis, antice et lateribus 1-sulcati; *geniculo* longulo cylindrico; *limbis* ellipticis, basi et apice breviter acuminatis, latitudine sua sub 2-plo longioribus, quam petioli plerumque brevioribus, dense cartilagineis, utrinque pallide viridis, impunctatis, penninervis; *nervo centrali* supra tenui, argute angulato, subtus convexo; *nervis* I. utrinque 10-12, intermediis quam II. manifeste crassioribus, infimis utrinque 2-2 in margine desinentibus, intermediis et supremis in nervum collectivum a margine 8-10 mm. remotum confluentibus; *pedúnculo* angulato, quam petiolus longiore, tenuiore; *spatha* cartilaginea, dorso viridi, intus rubente, late linearis-lanceolata, basi amplexante, apice obtusa, quam spadis breviore; *spadice* sessili, cylindrico erecto, rigido, rubro-flavescente, per anthesin 4-5 mm., maturo 10-12 mm. crasso; *tepalis* apice cucullatis, dorso cristatis, basi cuneatis; *bacca* obovato-elliptica, apice in stylum brevem, tetragonum, viridem contracta.

Crece en los bosques tropicales de la prov. de *Esmalda*s, en las orillas del río *Lita*.

**B** Nervios I. aproximados, poco mas gruesos que los II;

**A** Tallo erguido muriculado; *entrenudos* mas cortos que los pecíolos.

**27 A. vestitum** sp. nov.; *caule* erecto; *internodiis* brevibus; *cataphyllis* cartilagineis, diu persistentibus quam internodia longioribus eaque vestientibus, dorso  $\infty$ -nerviis; *petiolis* basi dilatatis, intus breviter vaginatis, antice cum articulatione longiuscula 1-sulcatis, internodia superantibus, quam limbi brevioribus; *limbis* dense cartilagineis, supra intense viridibus subtus pallidioribus, nitidis, oblongis, latitudine sua sub2-plo longioribus basi obtusis, apice acuminatis, aristatisque penninerviis; *nervo centrali* utrinque exerto, convexo; *nervis* I. numerosis, quam II. palam crassioribus; *iugo infimo* in margine desinente, reliquis in nervum collectivum 3-4 mm. a margine remotum confluentibus; *pedunculo* tenui, rigido, erecto, quam petiolus  $\frac{1}{2}$  breviore; *spatha* dense cartilaginea, late linear-lanceolata, basi amplexante, apice breviter acuminata, spadicem subaequante; *spadice* sessili, rigido, erecto vel incurvato, (in specimine unico nec bene evoluto)  $4\frac{1}{2}$  cm. longo, 5 mm. crasso.

Crece en los límites de las provincias de *Imbabura* y *Esmeraldas* entre el *Hojal* y el río *Lita*.

**B** Tallo trepador o sarmentoso: *entrenudos* mas largos que los pecíolos.

**28 A. guallupense** sp. nov.; *caule* scandente radicante; *internodiis* elongatis, laevibus; *cataphyllis* cartilagineis, diu persistentibus, internodia elongata aequantibus eaque vestientibus; *petiolis* quam internodia et limbi brevioribus, basi nodoso-incrassatis, antice, cum articulatione callosa mediocri, 1-sulcatis; *limbis* cartilagineis, ovalibus. basi obtusis, apice acuminatis, latitudine sua plus 2 plo longioribus, penninerviis; *nervo centrali* supra parum, subtus prominente; *nervis* lateralibus I. crebris, quam II. palam crassioribus; *iugo* vel iugis 2 infimis in marginem prodeuntibus, reliquis in nervum collectivum a margine parum remotum confluentibus; *pedunculo* erecto, rigido, ab latere compresso, quam petiolus 2-5-plo longiore; *spatha* cartilaginea rufesciente, lanceolata, dorso  $\infty$ -nervia, basi amplexante, apice breviter acuminata; *spadice* sessili, gracili, erecto, rigido, purpureo, spatham superante; *bacca* orbiculari, apiculata, exerta.

Crece en la rejion inferior de la prov. de *Imbabura*, cerca de *Guallupe*.

Especie afine al *A. sarmentosum*, del cual se distingue fácilmente por las proporciones de la espata y del espádice.

#### ADICIONES

*A. angustelaminatum* Engler (v. Monog., páj. 18, N.º 15). Los ejemplares que tenemos a la vista, colectados en los bosques tropic. de *Esmeraldas* y en los sub-tropic. del *Tungurahua*, no manifiestan ninguna variacion apreciable de los colectados en diferentes puntos de la rejion suband. de la cordillera occidental.

*A. Nanegalense* (Ibid. pág. 40, N.º 34). Crece igualm. en los bosques de *Esmeraldas* y del *Tungurahua* y entre *Cuyujua* y *Baeza*.

*A. stenophyllum* (Ibid. pág. 34, N.º 29). Crece en los bosques de *Esmeraldas*, a lo largo del río *Cachabí*; distinguiéndose de la forma típica de los bosques occ. del *Pichincha* por los limbos mayores, más oblongos en la base y tenuem. membranáceos; caractéres sin embargo que se notan tambien en algunas muestras de la prov. de *Pichincha*.

*A. ochreatum* (Ibid. pág. 45, N.º 39). Var. *membranaceum*. Difiere de la forma típica por los catáfilos y los pecíolos mucho mas largos; los limbos elípticos, herbáceo-membranáceos, 50-60 cm. largos, puntiagudos en el ápice; los nervios cost. I. mas distantes y 3-4 de los inferiores terminados en el márgen.

Crece a lo largo del río *Cachabí* cerca de *Ventanas*.

*A. Hieronymi* (Ibid. pág. 46, N.º 40). Var. *ovali-ellipticum*. Difiere de la forma primitiva por los limbos, angostam. oval-elípticos, obtusos en la base: el nervio colectivo apénas 3 mm. distante del márgen.

En la misma rejion se halla tambien la forma truncada y casi acorazonada en la base, con el nervio colectivo mas distante que en la anterior, pero apenas distinta por ningun otro carácter.

Crece en los bosques de *Esmeraldas* a lo largo del río *Lita*.

**III. Digitinervia.** *Tallo* breve, erguido, raras veces trepador; *limbos* ± coriáceos y, así como los pecíolos y los pedúnculos, negro-punteados, 3-∞-nervios o 3-∞-pli-nervios; *nervios basales* los 2 interiores unidos con el central por los I. derivados de éste y terminados con él en el ápice del limbo; los pares esteriores reunidos con los (respectivamente) interiores por los I. provenientes de estos últimos y terminados a diferentes alturas en el márgen; *espádice* comunmente erguido, rígido.—*Plantas de la zona subtropical; raras veces de la tropical y de la subandina.*—(Spec. 29-37).

**I RUBENTIA.** *Espata* verde-rojiza; *espádice* craso, rígido, ± rosado o amarillo.—(Spec. 29-35).

**I** *Tallo* erguido; *entre nudos* mui cortos;

**A** *Limbo* 5-∞-nervios;

**A** *Limbos* aovados, peltados.

**29 A. peltigerum** sp.nov.; LAM. XXII *caule* (\*) erecto, robusto; *internodiis* brevibus; *cataphyllis* late lanceolatis, mox in fibras rudes resolutis; *petiolis* subcylindricis, cum geniculo longo, antice breviter sulcatis, quam limbi longioribus; *limbis* subcoriaceis, supra nigro-subtus pallide glaucescentibus utrinque nigro-punctatis, circumscriptione ovatis, peltatis, apice acuminatis, latitudine sua 3-plo longioribus, 7-nerviis; *nervis* lateralibus utrinque 3, ex apice petioli ortis, extimo supra medium limbi, interioribus in cuspidem limbi cum nervo centrali productis; *nervis* I. creberimis,

(\*) Las láminas se repartirán en el número próximo de esta Revista.—NOTA DE LA REDACCION.

tenuibus, nervum centralem cum laterali proximo, et hunc cum exterioribus vicissim nectentibus; *pedunculo* quam petiolus 3-4-plo breviore, graciliore; *spatha* dense papyracea, lanceolata, apice subulato-acuminata, quam spadix sub2-plo breviore; *spadice* sessili, cylindrico, rigido, 25-30 cm. longo, 10 mm. crasso, flavescente; *tepalis* apice cucullatis, deorsum obiter cuneatis.

Crece en los bosques tropicales de la prov. de *Esmeraldas*, cerca de *Alto-tambo*.

Especie de las mas originales de este género. La colocamos en esta serie por la nervacion: por los demás caractéres parece tener mas afinidad con las de la sección siguiente y entre éstas con las *Glaucescentes* de las *Leiophylas*.

*B Limbos no peltados;*

a *Pecíolos y pedúnc. lisos:* pecíolos mas cortos que los limbos y los pedúnc.

**30 A. lingua** sp. nov.; LAM. XXIII *caudice* erecto, crasso; *internodiis* brevissimis: *cataphyllis* coriaceis lanceolatis, sero dissolvendis; *petiolis* robustis, subcylindricis, basi longe vaginatis, antice cum geniculo longo incrassato, 1-sulcatis, quam limbi brevioribus; *limbis* ex basi ovata subtruncata, sursum in apicem obtusum gradatim angustatis, 2-plo fere longis ac latis, dense coriaceis, subtus pallidioribus et nigro-punctatis, 7-nerviis; *nervis* 2-extimis parum a basi mediis circa dimidium limbi, in marginem prodeuntibus, intermediis validioribus et una cum costa carinatis, in apice leviter retuso terminatis; *nervis costalibus* I. tenuioribus remotis, irregulariter dispositis; *pedunculo* quam petiolus sub2-plo longiore, erecto, rigido, laevi, ab latere leviter compresso; *spatha* coriacea, basi obtusa, antice decurrente, postice stipiti adnata, sursum lanceolata, apice acuta, quam spadix breviore; *spadice* crasso rigido, erecto, rubescente, sursum leviter attenuato, primum rubescente, fructifero rubro; *tepalis* leviter cuneatis, cucullatis, dorso carinatis; *ovario* ovali; *bacca* apice prismatica, demum exerta; *seminibus* oblongis, biconvexis.

Crece en los bosques subtropicales del volcán *Tungurahua*, (12/904).

Especie afín a nuestro *A. subtruncatum* (v. Monogr., Adiciones páj. 3); del cual se distingue por la lonjitud de la vajina basal; limbos relativam. mas angostos; pedunc. mas robustos; espata coriácea-novado-lanceolada, etc.

b *Pedúnc. estriados o asurcados;*

1 *Pecíolos* mas largos que los limbos.

**31 A. canaliculatum** sp. nov.; *caudice* erecto, 2-2½ cm. crasso; *internodiis* brevissimis; *cataphyllis* elongatis, petiolorum dimidium attingentibus, mox in fibras rudes resolutis; *petiolis* robustis, limbos ± superantibus, basi incrassatis, intus breviter vaginatis et cum geniculo crasso, sub 3 cm. longo, profunde sulcatis; *limbis* ovatis, basi obtusis vel subtruncatis, apice obtusis, coriaceis, supra viridibus, impresso-punctatis, subtus viridi-glaucoscentibus, nigro-punctatis, 7-9 nerviis (cum nervulo extimo

*tenui mox supra basin evanescente); nervo centrali subtus crasso supra modice exerto, laterali intimo ad apicem usque producto, medio prope apicem, extimo infra dimidium evanescente; pedunculis erectis, rigidis, robustis, cylindricis,  $\infty$ -sulcatis, petiolos aequantibus vel modice superantibus; spatha dense papyracea, oblongo-ligulata, extus nervosa, utrinque virescente, antice aperta stipitem denudante, dorso eidem adhaerente; spadice fructifero erecto, rigido, 15-18 cem. longo, 20-25 mm. crasso, flavorubescente; tepalis linearibus, apice modice cucullato-truncatis; ovario oblongo, obtuse prismatico; stylo brevi, tetragono, apice capitato, demum exerto.*

Crece en los bosques tropicales del volcán *Tungurahua*, (12/904).

Especie señalada por la amplitud de los limbos, el pedúnculo acanalado, la espata ligulada, el color del espádice, etc.

2 *Pecíolos* mas cortos que los limbos, mas largos que los pedúnculos.

**32 A. macrostachyum** sp. nov.; *caule* erecto, crasso; *internodiis* brevissimis; *cataphyllis* coriaceis, ex basi ampliata sursum in apicem gradatim angustatis, mature in fibras resolutis; *petiolis* robustis, basi breviter vaginatis, ab latere compressis, dorso obtusis, intus cum geniculo elongato crasso, 1-sulcatis, quam limbi brevioribus; *limbis* ovato-ellipticis, basi breviter acutatis, apice obtusis, latitudine sua sub 2-plo longioribus, dense coriaceis, supra intenise, subtus pallide-viridibus, supra impresso-subtus, cum petiolis pedunculisque, nigro-punctatis, 9-nerviis, costa supra convexa, modice prominente, subtus valne crassa semicylindrica; *nervis* bas. (ceterisque omnibus) supra insculptis, subtus  $\pm$  exertis, obtusis; 4 intimis (hinc et hinc) robustioribus, in limbi apice cum costa desinentibus, 2 sequentibus parum supra medium; 2 extimis infra limbi medium desinentibus; *nervis* cost. I, et II, tenuioribus (vix prominentibus) sub angulo valde acuto ascenditibus; *pedunculis* quam petoli gracilioribus et sub  $\frac{1}{2}$  brevioribus, obiter canaliculatis, erectis, rigidis; *spatha* crassa, succulenta, lanceolata, antice longe decurrente, dorso stipiti crasso adcreta, demum reflexa, marcescente; *spadice* fructifero, dorso basi sessili, cylindrico, rigido, apice obtuso, valde crasso, pedunculum superante, purpureo; *tepalis* linearibus, apice cucullatis, purpureis; *bacca* oblonga, flava in stylum elongatum, obtuse prismaticum, tepala 2-plo superantem producta; *seminibus* globuliformi-ellipticis.

Crece en los bosques tropicales del *Nanegal*. (3/905.)

Especie próximam. afine al *A. pachyphyllum*; del cual se distingue por los pecíolos mas cortos que los limbos y mas largos que los pedúnculos. Estos últimos levem. estriados, mas cortos que el espádice fructífero y éste mucho mayor y por los tépalos mucho mas largos que anchos. Del *A. canaliculatum* se distingue, además

que por las proporciones de los pecíolos con los limbos, por la forma y dimensiones mucho mayores de estos últimos; por los pedúnculos más cortos; el *espádice* 2-3-plo más largo y más grueso.

**B** *Limbos* 7-plinervios; *espádice* sesil;

**A** *Pedúnc.* más robustos y más largos que el pecíolo.

**33 A. Navasi** sp. nov.; *caudicis erecti; internodiis brevibus; cataphyllis cartilagineis lanceolatis, mox resolutis; petiolis crassis ab lactere compressis, antice complanatis; geniculo brevi crasso; limbis dense cartilagineis subcoriaceis, utrinque pallide viridibus, cum petiolis pedunculisque nigro-punctatis, anguste-ellipticis, utrinque acutis, latitudine sua sub 3-plo longioribus, 7-plinerviis; nervo centrali supra argute exerto, subtus convexo, cum iugo laterali intimo in limbi apice desinente, 2 intermediis supra medium ductis, 2 infimis ad  $\frac{1}{2}$  limbi partem attingentibus; pedunculis erectis, ab latere compressis, quam petioli longioribus et crassioribus; spatha linear-lanceolata, basi antice decurrente, apice acuminato subulata; spadice sessili, cylindrico, flavo, sub anthesi quam spatha 3-plo longiore; tepalis longitudine sua sub 2-plo latioribus, apice breviter cucullatis; antheris inclusis, flavis.*

Crece en los bosques tropicales de la prov. de *Esmalda*, en la orilla de los ríos *Cachabí* y *Santiago*.

**B** *Pedúnc.* más endeble y más corto que el pecíolo.

**34 A. septuplinervium** sp. nor.; *caudice* erecto, robusto, brevi; *cataphyllis* elongatis, late lanceolatis, tenuibus, mox resolutis; *petiolis* robustis, rigidis, antice cum articulatione incrassata, drofunde 1-sulcatis, limbos subaequantibus; *limbis* ambitu oblongo-ellipticis, basi apiceque acutis, latitudine sua sub 2-plo longioribus, dense papyraceis, vel subcoriaceis, intense viridibus, utrobique dense nigro-punctatis, 7-9 plinerviis; *iugo* infimo ad  $\frac{1}{2}$  limbi in margine desinente, medio et supremo ad apicem usque ductis; *nervis* I. omnibus et II. subaeque crassis; *pedunculo* quam petiolus paulo breviore, graciliore; *spatha* herbacea, late linear; *spadice* sessili, erecto, rigido, flavo-virescente, quam spatha longiore; *tepalis* apice breviter cucullatis, deorsum cuneatis; *filamentis* anguste marginatis, apice dilatatis; *antheris* parvis, flavo aurantiaceis; *ovario* subelliptico, apice conico.

Crece en los bosques tropicales de la prov. de *Esmalda*, a las orillas del río *Cachabí*.

**III** *Tallo* trepador; *entre nudos* largos; *limbos* 5-7 nervios más cortos que los pecíolos.

**35 A. parambae** sp. nov.; *caule* scandente; *internodiis* elongatis; *cataphyllis* coriaceis, persistentibus, rigidis, lanceolatis; *petiolis* subteretibus, antice, cum geniculo longulo, 1-sulcatis,

quam limbi longioribus; *limbis* subcoriaceis, viridibus, subtus pallidioribus, nigro-punctatis, ellipticis vel oblongo-ellipticis, basi acutis, apice acuminatis, longitudine sua 2-plo longioribus, 5-(7)-nerviis; *nervis* inferioribus tenuioribus, in margine desinentibus; *iugo* superiore crassiore cum costa in limbi apice terminato; *nervis* costalibus I. utrinque 6-9 intermediis quam basales vix tenuioribus.

Apesar de lo incompleto de nuestros ejemplares, por falta del aparato floral, hemos descrito esta especie por los caracteres sobresalientes de sus órganos vegetativos.

Por la lonjitud de sus pecíolos, la consistencia de los limbos y el desarrollo de los nervios costales I. hacia la mitad de los limbos, manifiesta mas afinidad con las especies del grupo anterior (Pergamentáceas) que con las del presente.

**II ATROVIRIDIA.** Intensamente verdes en todas sus partes: *espádice* tenué, largo y flexible; (Spec. 36-37).

**I Tallo erguido.**

**36 A. psilostachyum** sp. nov.; *caule* brevi, erecto, crasso; *internodiis* brevissimis; *petiolis* ab latere compressis, intus breviter vaginatis, cum articulatione brevi, antice 1-sulcatis, quam limbi saepius longioribus; *limbis* oblongo-vel obovato-ellipticis, latitudine sua sub 2-plo longioribus, a  $\frac{1}{3}$  superiore deorsum cuneatis, apice acutis, coriaceis, utrinque intense viridibus et nigro-punctatis, 5-7 nerviis; *nervis omnibus* ad limbi apicem usque ductis; *extimo marginem* ambiente; *nervis costalibus* I. et II. creberrimis subaequalibus; *pedunculo* gracili, quam petiolos breviore; *spatha* linear-lanceolata, apice subulata, basi amplexante; *spadice* viridi, sessili, tenui, flexili elongato, spatham iam per anthesin plus 2-plo superante.

Crece en los bosques tropicales de la prov. de *Esmeraldas*, en las orillas de los ríos de *Cachabí* y *Santiago*.

Especie afine a nuestro *A. atroviride* y al siguiente, pero distinto por la forma de los limbos, número de los nervios basales, proporciones de los pedúnculos, de el espádice, etc.

**II Tallo trepador.**

**37 A. polystictum** sp. nov.; *caule* scandente; *internodiis* elongatis, modice crassis; *cataphyllis* lanceolatis, internodia aequantibus vel superantibus, mox in fibras rudes dissolutis; *petiolis* quam limbi brevioribus, in secco angulatis, basi breviter vaginatis, antice, cum geniculo longulo, 1-sulcatis, cum pedunculis limbisque utrinque, dense nigro-punctatis; *limbis* cartilagineo-membranaceis, utrinque intense viridibus, oblongo ellipticis, latitudine suo  $\pm$  duplo longioribus, basi longiuscule cuneatis, apici breviter subulato acutis, 7-nerviis; *nervo infimo* tenui, ad  $\frac{1}{2}$  laminae partem, intermedio ad  $\frac{1}{2}$ , intimo ad apicem usque ducto; *nervo centrali* gracili utrinque parum exerto; *nervis costalibus* I,

tenuibus, erecto-patentibus, parallelis, vix 10 mm. ab invicem remotis, interiectis duobus II. multo tenuioribus; *pedunculo* quam petiolus tenuiore, sub 2-plo longiore, angulato; *spatha* linearis, herbacea, viridi, *spadice* subsessili, tenui, flexili, cylindrico, viridi-fuscescente, sub anthesi 12-15 cm. longo, 3-4 mm. crasso; fructifero ignoto.

Crece en los bosques tropicales de la prov. de *Esméraldas*, entre *Cachabí* y *Altotambo* (8/904).

**SECCION II Cordifolia.** *Limbos* acorazonados en la base y adelgazados hacia arriba, péndulos; *nervios* basales, por lo comun, ± soldados entre sí formando las costillas que rodean el seno basal, raras veces libres, *nervios* II. los mas confluentes entre sí en el ápice formando el nervio colectivo ± intramarjinal; *tallos* las mas veces trepadores. *Plantas de todas las zonas.*

**SERIE I. ACHROOSTACHYA.** *Espádice* verde, blanquecino, amarillento, o lívido (no purpúreo); *limbos*, por lo comun, pálidamente verdes o blanquecinos, mas raras veces intensamente verdes.

**§ I. Rhytidophylla.** *Limbos* ± rugosos; *nervios* prominentes en el erués, hundidos en la haz y el parenquima ± abollado en el retículo (spec. 37-38).

I *Limbos* lampiños; *lóbulos bas.* divergentes; *seno basal* parabólico.

**38 A. bullosum** sp. nov.; undique glabrum; *caule* robusto, ascendente vel breviter scandente; *internodiis* brevibus; *cataphyllis* elongatis, lanceolatis; *petiolis* *limbos* superantibus, basi breviter vaginatis, cylindricis, sursum cum geniculo longo crasso, leviter 1-sulcatis; *limbis* dense herbaceis, utrinque saturate viridibus, eximie lacunobullatis, truncato-ovatis, profunde cordatis, sursum gradatim attenuatis acutis, latitudine sua ± longioribus; *lobis bas.* quam terminalis ± 4-plo brevioribus, obtusis sinu parabolico, costis longe denudatis circumscripto, seiunctis; *nervis* I. subtus prominentibus; *lobor. bas.* (utrinque 8-9) extimis in margine desinentibus, intimis 2-3 cum interlobari et I. lobi terminalis (utrinque 18-20) in nervum collectivum margini approximatim confluentibus. (*Inflorescetia* in specimine nostro nondum satis evoluta).

Especie evidentemente afine al *A. corrugatum* y al *A. dictyophyllum*, pero diferente por los caracteres del tallo, pecíolos, limbos, número de los nervios y amplitud del seno basal.

Crece en los bosques occidentales del v. *Pululahua* 1,800-2,000 metros (1/904).

III *Limbos* fibroso-pulverulentos en el envés; *lóbulos basales* convergentes; *seno basal* acutángulo.

**39 A. scaherulum** sp. nov.; *petiolis* robustis, *limbos* superantibus, subcylindricis, basi postice incrassatis, antice longe

vaginatis, sursum cum geniculo elongato, crasso complanatis; *limbis* membranaceis, supra intense viridibus, subtus pallidioribus, in nervis (petiolisque) fibroso-pulverulentis, subrotundovatis, basi profunde cordatis, apice breviter acuminatis, linea convexa continua circumscripitis, latitudine sua parum longioribus; *lobis* bas. retrorsis, obtusis, intus convergentibus, sinu acutangulo seiunctis; *costis* longiuscule denudatis, 7-nerviis; *nervis* (4) extimis retrorsis, erga marginem abrupte arcuatis, in margine desinentibus, 2 intimis, cum interlobari et I. lobi terminalis (12-14 iugis), in nervum collectivum a margine 3-5 mm. remotum confluentibus; I. lobi terminalis quam II. loborum posticorum tenuioribus; *omnibus* supra impressis, subtus alte exertis; *pedunculo* subcylindrico, quam petiolis tenuiore,  $\frac{1}{3}$  breviore; *spatha* herbacea, lanceolata, apice cuspidata, mox reflexa, basi amplexante; *spadice* sessili, subcylindrico, viridi, pulverulento; *tepalis* deorsum leviter cuneatis, late membranaceis, apice cucullatis, viridibus, albo-pulverulentus; *ovario* obtuse tetragono, latitudine sua  $\frac{1}{3}$  longiore, apice viridi; *stylo* brevissimo; *stigmate* bilobo; *bacca* oblonga, leviter exerta; *seminibus* obovato-oblongis, biconvexis.

Crece en los bosques del Oriente, al paso del río *Masfa Quijos* (2/905).

Especie parecida a nuestro *A. Umbraculum* en la magnitud y forma de los limbos, en las proporciones del pedúnculo y por el espádice sesil, pero bien diferente por muchos otros caracteres. Del *A. pulverulentum* (al cual se parece algo en el indumento, forma y consistencia de las hojas) se distingue a primera vista por los nervios mas robustos y mucho menos numerosos.

## § 2. *Leiophylla*. *Limbos* lisos (no arrugados). (Spec. 39-51).

### I. *Glaucescentia*. *Limbos* blanquecinos al menos en el envés (Spec. 39-50).

**A** *Seno basal* angosto, todo o casi todo alado; *limbos* cartilajíneos, blanco-pruinosos;

**A** *Lóbulos bas.* paralelos, casi contiguos; *seno* todo alado; *limbos* 4-6 veces mas largos que anchos.

**40\* *A. ecuadorense*** Engler. A la descripción consignada en nuestra Monografía en la páj. 104 hecha sobre ejemplares incompletos, agréguese, segun muestras recientemente colectadas:

"*Catafilos* 10-15 cm. largos; *pecíolos* 2½-5 dm. largos; *vajina* hasta 15 cm. larga; *articulacion* 15-20 mm. larga; *limbos* hasta 7 dm. largos, 15-20 cm. anchos en la base; *lóbulos basales* 7-8 cm. largos; *nervios laterales* I. reunidos, así como los interlobares, en el nervio colectivo poco distante de la base; *pedúnculo* 40-55 cm. largo; *espata* 1-2½ dm. larga, 1 cm. ancha, *espádice* hasta 50 cm. largo,  $\pm$  5 mm. grueso despues de la floracion. flexible, péndulo."

No obstante estas diferencias, no dudamos que esta es la misma especie descrita por Engler (en la XV REVISION der Gattung *Anthuriums*, pág. 408, N.º 150) atentas las graduaciones paulatinas que se observan hasta en una misma muestra y por haber sido colectadas en el mismo lugar que la descrita por dicho autor. Un ejemplar colectado en los bosques occidentales del *Pichincha*, concuerda en los demás caracteres, pero tiene la espata blanca, mucho mas corta y relativamente mas ancha.

*B* Lóbulos basalis algo apartados; seno alado o brevem. desnudo; limbos 2-2½ veces mas largos que anchos.

**41 A. albidum** sp. nov.?; *caudice* assurgente, radicante; *internodiis* brevibus; *cataphyllis* pergamentaceis, lineari-lanceolatis, 10-15 cm. longis; *petiolis* subcylindricis, cum geniculo longulo supra leviter sulcatis, basi breviter vaginatis, limbos aequantibus vel superantibus; *limbis* anguste-ovalibus, basi cordatis, latitudine sua ½ longioribus, apice acuminatis, cartilagineis, utrinque glaucescentibus pellucido-punctatis; *lobis basalibus* quam terminalis, 4-ter-5-ies brevioribus, retrorsis, obtusis, convergentibus, sinu angusto seiunctis; *costis* membranaceo-alatis aut breviter denudatis, 3-4 nerviis; *nervis extimis* retrorsis erga marginem abrupte arcuatis; *intimo* patente, omnibus in marginem desinentibus; *lobo terminali* linea uniformiter convexa, in apicem acuminatum producto; *nervis costalibus* I. utrinque 12-15, supra vix exertis, subtus prominentibus, in nervum collectivum margini ± approximatum, quandoque interruptum, confluentibus; *costa* subtus convexa, supra vix exerta. (*Inflorescentia ignota*).

Crece en los bosques subtropicales de la prov. de *Imbabura* cerca de *Guallupe*.

*B* Seno basal ancho; limbos mas o menos ½ mas largos que anchos;

*A* Espádice sesil o subseasil, purpúreo-negruzco; baya globular-trasovada obtusamente tetragona.

**42\* A. rivulare** (Monog., pág. 101, N.º 78). Agréguese: "pedúnculos mas robustos y ½-¾ mas largo que el pecíolo; espata linear-lanceolada, alesnado-cuspidada, 8 cm. larga, 12-15 mm. ancha, verduzca, lijeram. escorrida y reflejada; espádice brevem. 2-3 mm. estipitado, cilíndrico, verde-violáceo, finalm. negruzco, algo flexible, 12-15 cm. largo, 6-8 mm. greuso; tépalos poco mas largos que anchos; baya obpiramidal-tetragona, semiexerta; semillas trasovadas biconvexas."

Crece en los bosques tropicales de la prov. de *Esméraldas* (8/904).

*B* Espádice estipitado, verde-purpurascente; baya ovalada o elipsoidal verde.

**43 A. chlorocarpum** sp. nov.; *caudice* breviter scandente; *internodiis* brevibus; *cataphyllis* lanceolatis, dense cartilagineis diu persistentibus; *petiolis* elongatis, rigidis, subcylindricis,

basi breviter vaginatis, cum geniculo brevi antice 1-sulcatis; *limbis* 25-30 cm. longis, prope basin  $\pm$  20 cm. latis membranaceis, in sicco cartilagineis, utrinque viridibus, subtus pallidioribus, ex basi truncata, leviter lateque cordata, subtrigono-ovatis; *lobis basalibus* patentibus, sinu lato seiunctis, obtusissimis, quam terminalis  $\pm$  5-ies brevioribus, 3-nerviis; *nervis* prope basin brevissime in costas, vix prope basin denudatas, coalitis, erga marginem arcuato protensis; *lobo terminali* linea uniformiter convexa circumscripito, in cuspidem linearem abrupte contracto; *nervis* I. utrinque 10-12 supra impressis, subtus exertis, approximatis, erecto-patentibus, arcuatis, cum plerisque loborum basarium in nervum collectivum a margine 3-4 mm. remotum confluentibus; *pedunculo* quam petiolus plerumque crassiore, ipsumque aequante vel superante, compresso, subcylindrico; *spatha* anguste ovali-lanceolata, intus purpurascente, dense membranacea, antice longe decurrente, aperta, spadicis stipitem ultra medium denudante; *spadice* brevi, erecto, rigido, atro-purpurascente, spatham aequante vel ea breviore; *tepalis* atro-purpureis, apice cucullatis, deorsum dilatatis; *bacca* subelliptica vel ovata, apiculata, demum ex tepalis longe exerta, viridi.

Crece cerca de *Alto-Tambo*, entre *Ibarra* y *Cachabi*.

Especie notable por la consistencia de los catafilos, forma y proporciones de las hojas, condiciones de la espata y por el color de la baya.

**C** Costillas del seno basal mas o menos largamente desnudas;

**A** Entrenudos indistintos; *limbos* membranáceos, verdes a lo largo de los nervios, blancos en el intermedio; *nervios* todos terminados en el márgen.

**44 A. albo-virescens** sp. nov.; *caule* erecto; *internodiis* brevissimis; *cataphyllis* membranaceis, lanceolatis, demum in fibras tenues resolutis; *petiolis* modice robustis, basi intus breviter vaginatis obiter 1-sulcatis exarticulatis, limbos superantibus; *limbis* membranaceis, viridibus, albo-maculatis, basi cordata dilatatis, sursum linea convexa in apicem acuminatum productis latitudine sua  $\frac{1}{3}$  longioribus; *lobis basalibus* retrorsis, divergentibus, quam terminalis sub 3-plo brevioribus, sinu parabolico costis longiuscule denudatis circumscripito, seiunctis, sub 7-nerviis; *nervis* 4 extimis retrorsis, intimisque erga marginem arcuatis, cum interlobaribus costalibusque I. secus marginem productis et singillatim in margine desinentibus; *pedunculo* quam petiolus parum breviore tenuiore, angulato-striato, *spatha* lanceolata, cartilaginea, extus herbacea, pluri-nervia, in apicem acuminatum circinnatum producta, quain spadix breviore; *spadice* subsessili, cylindrico, flexili, albo-virente; *tepalis* aequae fere longis ac latis, apice breviter cucullatis; *filamentis* late linearibus, breviter exertis; *bacca* oblonga obiter tetragona, viridi, apice obtusa.

Crece en la prov. de *Esmeraldas* entre *Cachabi* y *Alto-Tambo*.

Especie mui distinta de todas las demás de esta sección por la consistencia tenuem. membranacea, el color de las hojas, y de la baya, de la brevedad de la vajina basal, lo indistinto de la articulacion, etc. Solo con la especie anterior tiene puntos de contacto por la forma, proporciones y color de la baya, distigiéndose, empero, por la forma de las hojas, proporciones del espádice y de la espata, etc.

*B* Entrenudos mas o menos largos; *limbos* mas o menos apergaminados;

a *lob* terminal circunscrito por líneas introrsas;

I *Limbos* asaetados; *lob. bas.* divergentes; *espata* linear-lanceolada.

**45 A. sagittellum** sp. nov. assurgens vel breviter scandens, glaucescens; *internodiis* 1-1½ cm. longis aequis ac crassi; *cataphyllis* chartaceis, lanceolatis, elongatis, mature deciduis; *petiolis* subcylindricis, basi intus breviter vaginatis, intus cum geniculo longiusculo crasso, 1-sulcatis, dorso obtusis in sicco angulatis, quam limbi brevioribus; *limbis* basi profunde cordatis, e ½ sursum linea ± concava in apicem acuminatum, apiculatum angustatis, utrinque viridi-glaucescentibus; *nervis omnibus* et costa utrinque exertis; *lobis basalibus* retrorsis, divergentibus, sinu leviter parabolico seiunctis; *costis* intus breviter denudatis, 6-7-nerviis; *nervis marginem* versus abrupte arcuatis singillatim, aut pluribus simul coalitis in margine desinentibus; *lobo terminali* quam basales sub 3-plo longiore, costa supra tenuiore leviter carinata, subtus convexa; *nervis I.* 12-15 iugis, erecto-patentibus in nervum collectivum deorsum saepe interrupum a marginet 3-4 mm. remotum confluentibus; *pedunculo* quam petiolus sub ½ breviore, tenuiore; *spatha* cartilagineo-herbacea, extus albovirescens, ∞-nervia, intus albida, oblique inserta, longiuscule decurrente, revoluta, in apicem subulatum et uncinatum producta; *stipite* antice longiuscule denudato, postice totus spathae adnato: *spadice* erecto, rigido, cylindrico, nigrescente, spatham parum superante; *tepalis* apice truncatis, trigonis, cucullatis, nigrescentibus, dorso carinatis, deorsum cuneatis, fusco-punctatis, latitudine sua ½ longioribus; *bacca* o vata, sursum in apicem obtusum breviter contracta, 2 sperma: *seminibus* subellipticis.

Crece en las pendientes or. del v. Tungurahua (12/904).

. 2 *Limbos* aovados en la base; *lóbulos basales* convergentes;

\* *Espata* apergaminada, ovalada erguida; *espádice* cilíndrico, amarillo-rosado.

**46 A. esmeraldense** sp. nov.; LAM. XXIV. *caudice* brevi crasso, *internodiis* brevissimis; *cataphyllis* magnis, dense pergamantaceis, lanceolatis, persistentibus; *petiolis* robustis, rigidis, *limbos* aequantibus vel superantibus, basi breviter vaginatis, antice leviter, cum geniculo elongato crasso, 1-sulcatis; *limbis* ex basi ovata, profunde cordata, sursum gradatim angustatis, latitudine sua plus 2-plo longioribus, dense pergamantaceis, supra intense glauco-viridibus, subtus glaucescentibus, sparseque nigro-puncta-

*tis; nervis omnibus supra modice exertis, subtus prominentibus acietatis; nervis I. costalibus utrinque 15-18 sub angulo acuto ascendentibus, quam interlobares tenuioribus, II. tenuissimis, III. (e primariis ortis) crassioribus; lobis bas. retrorsis, obtusis, ± latere interiore conniventibus, sinu ovato e costis breviter denudatis seiunctis, 5-6-nerviis; lobo term. quam basales sub 4-plo longiore, prope medium contracto, apice acuminato, vel cuspidato; costa subtus 3 aristata; nervis interlob. (utrinque 1), quam ceteri crassioribus; pedunculis quam petioli gracilioribus et plerumque longioribus; spatha ovalilanceolata, apice cuspidata, albida, coriacea, basi antice aperta; spadicis stipitem logulum denudante, postice stipiti adcreta; spadice primum cylindrico, flexili, demum cylindraceo, rigido, flavo-rubello, post anthesin 15-18 cm. longo, in  $\frac{1}{3}$  inferiore ad 12 mm. crasso; tepalis flavescentibus, fere obovatis, apice truncato cucullatis; bacca fere obovata, obtuse angustata, e tepalis vix exerta.*

Crece en los bosques tropicales de la provincia de *Esmeraldas*, entre el río *Lita* y el *Cachabí*.

Especie afine a nuestro *A. marmoratum* y a varios otros de este grupo y su rival en las proporciones y hermosura del follaje, pero bien distinta de todas principalmente por los caracteres de la espata y del espádice.

\* \* Espata herbácea linear-lanceolada, colorada, reflejada; espádice cilíndrico verde.

**47\* *A. incurvatum* Engl.** A la descripción de esta especie (Monogr., páj. 116-7) añádase: baya madura aovada, cónico-tetrágona y verde en el ápice, apenas exerta; semillas lenticular-elípticas, algo y oblicuamente truncadas en el ápice, asimétricas.

Ademas de la variedad  $\beta$ , ocurre tambien otra forma intermedia de tallo mas delgado, altamente trepador y radicante, con pecíolos, limbos, pedúnculos y espádice menores que en las formas antecedentes. La forma y tamaño de los limbos y el seno basal están sujetos a variaciones; por el contrario son constantes las proporciones entre el pecíolo y el pedúnculo, la consistencia herbácea, color y demás caractéres de la espata, la dirección perpendicular y la forma del espádice, el aumento sucesivo de los tépalos durante la maduración etc.; caracteres por los cuales se la distingue fácilmente y a primera vista de todas las demás.

Crece tambien en los bosques subandinos orientales del volcán *Tungurahua* y del *Antisana*.

b Lóbulo terminal circunscrito por línea continua;

I Limbos blanquecinos. pedúnculos 3-4-plo mas cortos que los pecíolos; espata y espádice mas o menos = al pedúnculo.

**48 *A. glaucophyllum* sp. nov.; caule robusto scandente: internodiis longis; cataphyllis elongatis, lanceolatis, subcoriaceis, mature deciduis; petiolis elongatis, crassis, subcylindricis, antice**

basi longe vaginatis, sursum leviter 1-sulcatis; *geniculo* crasso, 1-1½ longo; *limbis* ex basi cordata ovatis vel ovalibus, petiolos subaequantibus, latitudine sua sub 2-plo longioribus, dense herbaceis, in sicco parchmentaceis, supra-albo-coerulecentibus, subtus albidis; *lobis bas.* quam terminalis sub 3-plo brevioribus, retrorsis conniventibus, sinu obovato costis fere ad ½ denudatis seiunctis, 6-7-nerviis; *nervis extimis* retrorsis, sursum cum 3 intimis erga marginem arcuatis; *lobo terminali* ovato, apice acuto, 18-20-nervio; *nervis I.* utrinque exertis, sursum leviter arcuatis, 2-3 cm. ab invicem remotis, in margine desinentibus vel superioribus in nervum collectivum saepe interruptum confluentibus; *nervis II.* tenuibus per anastomoses resolutis cum I. reticulatis; *pedunculis* quam petioli 3-4 plo brevioribus, tenuioribus; *spatha* subcoriacea, elongata pedunculum aequante vel superante, extus glaucescente, intus glauco-rubella, linear-lanceolata, basi amplexante, antice parum decurrente, apice subulato-acuta; *spadice* subsessili, crasso, erecto, cylindraceo, rigido, demum spatham superante, glauco-virescente; *tepalis* latitudine sua parum longioribus; *filamentis* linearibus; *antheris* parvis, flavidis; *ovario* oblongo, apice obtuso; *bacca* oblonga, demum breviter exerta, disperma.

Crece en la provincia de Imbabura entre Paramba y Peñanegra.

Especie primorosa por la magnitud y color de los limbos; próximo a nuestro *A. versicolor*, del cual se distingue por los lóbulos basales convergentes, casi contiguos en el ápice, el seno mas angosto y acutángulo en la base, el terminal circunscrito por línea uniformemente convexa, obtuso o ligeramente puntiagudo, en el ápice; los nervios terminados la mayor parte en el márgen, los pedúnculos 3-4-plo mas cortos que los pecíolos, etc.; parecido tambien al *A. incurvatum* Engl., del cual se distingue, fuera de los caractéres mencionados, por la consistencia y color de la espata, por el espádice mucho mas largo, etc.

<sup>2</sup> *Limbos* verde-blanquecinos o pálidamente-verdes; *pedúnculos* doble mas cortos que los pecíolos;

\* *Tallos* erguido; *limbos* 8-10 dm. largos; *espádice* estipitado.

**49 A. Baezanum** sp. nov.; *petiolis* robustis, subcylindricis basi longe vaginatis, antice una cum geniculo elongato, crasso, obiter bisulcatis, lobilos subaequantibus; *limbis* dense herbaceis in sicco parchmentaceis, supra intense, subtus pallide-viridibus, elongato-ovatis, basi profunde cordatis, supra medium parum constrictis, in apicem leviter acuminatum linea convexa desinentibus; *lobo antico* quam postici sub 4-plo longiore, retrorsis, vix convergentibus, sinu late parabolico basi costis longiuscule denu-datis circumscripto seiunctis, 7-nerviis; *nervis 3-4-posticis* retrorsis, marginem versus arcuatis, cum interioribus binisque interlobaribus quam I. lobi terminalis crassioribus, in margine desinentibus; *costa* nervisque I. 15-18-iugis, omnibus supra obiter exertis acietatis, subtus rotundatis, subangulo acuto erecto patentibus, parallelis; *nervis II.* (cum III. reticulatis) plerisque

ad nervum collectivum pertingentibus; *pedunculo* erecto, rigido, cylindrico, quam petiolus tenuiore et sub 2-plo breviore; *spatha* cartilaginea, lanceolata, basi amplexante, mature reflexa et decidua; *stipite* crasso longiusculo; *spadice* fructifero, subcylindrico, erecto, crasso cynereo-glaucoscente; *tepalis* aequae fere longis ac latis, apice cucullatis, muriculatis; *filamentis* brevibus late marginatis; *antheris* parvis, flavescentibus; *bacca* oblongo-elliptica, apice parum contracta, viridi vix exerta stigmate bilobo; *semin.* oblongis, asymmetricis.

Crece en los bosques subtropicales de la rejon oriental cerca de *Baeza* (2/905).

Especie proxima a nuestro *A. versicolor*, con el cual conviene tambien en la procedencia, distinto por las proporciones mayores de todas sus partes, los entrenudos mui cortos, la vajina del pecíolo mucho mas larga; los pecíolos manchados; las dimensiones y proporciones de los limbos, las costillas del seno mas largamente desnudas, etc.

Del *A. marmoratum*, con el cual tiene tambien mucha analogia en la lonjitud y robustez de los pecíolos y proporciones de éstos como los limbos, tamaño y forma de los limbos y proporciones del pedúnculo, etc.; se distingue por los pecíolos levemente bisulcados; la articulacion mas larga y abultada, los limbos mas verdes y relativamente mas anchos, los nervios costales mas aproximados, espádice mas largamente estipitado, etc.

\* \* *Tallo* trepador; *limbos* menores; *espádice* sesil;

+ *Limbos* casi triangulares; *lób. bas.* divergentes; *seno* parabólico.

**50\* *A. acrobates* Sod.** (Monogr. páj. 128). A la descripcion dada en ese lugar agréguese: "Varía en la forma de los limbos aovados u ovalados o triangular-asaetados; *lób. bas.* ± cortos relativamente al terminal y ± convergentes o simplemente divergentes; *nervios* I. costales mas o menos numerosos; *espata* abrazadora o ± escorrida, a veces larga y tenuemente cuspidada; *espádice* durante la floracion intensamente violáceo, 15-18 ctm. largo, 8-10 mm. grueso, fructifero verde-ceniciente; 20-25 ctm. largo, hasta 12 ctm. grueso," etc.

Crece tambien en los bosques subtropicales orientales del volcan *Tungurahua*.

Segun estos caracteres la especie *A. sagittale* Sod. (Ibid. páj. 125) debe suprimirse, pues sus caractéres traspasan paulatinamente en los de la presente.

Hemos trasladado esta especie al grupo presente, niéntras en la monografía figura en el siguiente, por la mayor analogia complexiva que manifiesta con las demás de este grupo.

†† *Limbos* aovados; *lóbulos bas.* divergentes; *seno basal* aovado.

**51 *A. pululahuae* sp. nov.**; *caule* scandente; *internodiis* longitudine variis, crassiusculis, laevibus; *cataphyllis* cartilagineis, ligulatis, apice obtusis caducis; *petiolis* limbos subaequantibus, basi breviter vaginatis, subcylindricis, in sicco angulatis, supra cum geniculo longulo complanatis vel obiter sulcatis; *limbis* dense pergamantaceis, supra viridi-coerulescentibus, subtus glauco-viridentibus, pilisque brevissimis dense conspersis, circumscriptione

ovatis, ex basi profunde cordata, sursum linea continua convexa in apicem acutum gradatim productis; *lobis basalibus* quam terminalis  $\pm \frac{1}{3}$  brevioribus, retrorsis, convergentibus, obtusis, sinu ovato, costis 6-7 nerviis, basi breviter (2 cm.) denudatis seiunctis; *nervis* lorum basarium retrorsis, erga marginem arcuatis in eoque desinentibus; 2 interlobaribus cum I. costalibus (utrinque 10-12) in nervum collectivum a margine 3-4 mm. remotum confluentibus; *pedunculo* quam petiolus graciliore et sub  $\frac{1}{2}$  breviore; *spatha?*; *spadice* sessili, subcylindrico, cinereo, fructifero, pedunculum superante; *tepalis* aequae fere longis ac latis, apice cucullato cinereis; *filamentis* linearibus, petala aequantibus; *bacca* prismatica-ovata, apice conico vix exerta.

Crece en las pendientes occidentales del volcán *Pululahua* 1,500 metros (1/905).

### III. *Viridia*. Limbos intensamente verdes, casi concoloros, apergaminados o coriáceos. (Sp. 52-53).

A. Espata acorazonada, poco mas larga que ancha, colorada; espádice amarillo, sesil, mas corto que la espata.

**52 A. venustum** sp. nov.; LAM. XXV. *Caule* tenui; *internodiis* varie elongatis, nunc brevissimis; *cataphyllis* lanceolatis, dense cartilagineis, persistentibus; *petiolis* tenuibus, erectis, rigidis, antice cum geniculo brevi 1-sulcatis, limbos plerumque superantibus; *limbis* dense cartilagineis, supra intense, subtus dilute viridibus, minutissime nigro-punctulatis, basi profunde cordatis, sursum gradatim angustatis in apicem longe acuminatum, apiculatum productis, latitudine sua 2-plo longioribus; *lobis basalibus* retrorso-divergentibus, angulo acuto seiunctis; *nervis* lorum basarium utrinque 4, 3 extimis in costas basi breviter denudatas coalitis, retrorsis; omnibus demum erga marginem arcuato-ascendentibus, extimis 2 in margine desinentibus, reliquis cum I. lobi antici utrinque 3-5 in nervum collectivum a margine paulo remotum coniunctis; *pedunculis* quam petoli sub 2-plo longioribus, erectis, rigidis, subcylindricis; *spatha* sub horizontaliter patente, plana supra serobiculata, late ovata, basi cordata apice acuminata, subcoriacea, intense coccinea; *lobis basalibus* retrorsis, latis, sese mutuo obtegentibus, 3-nerviis, quam terminalis 3-nervius parum brevioribus; *spadice* sessili, recto vel arcuato, flavo, quam spathae lobus anticus parum breviore; *tepalis* apice cucullatis, deorsum cuneatis; *bacca* fere obovata, angulata in apicem conicum brevem producta, primum purpurascente, demum flava.

Crece en la provincia de *Esmeraldas*, en las pendientes de *Alto-tambo*.

Varía con el tallo erguido, breve o casi trepador, en la longitud y espesor de los entrenudos, la magnitud y forma de los limbos, en la dirección y proporciones de los lóbulos basales, etc.

Especie ciertamente proxima al *A. andeanum* Lind., del cual sin embargo parece distinguirse entre otros caractéres, por la forma de la espata *plana* y no *cóncava*, arrugado-hoyosa, por los lóbulos basales sobrepuertos uno a otro por el espádice mitad menor que la espata, amarillo, etc. Aun el pedúnculo es en nuestra forma acanalado interiormente, no ya *rollizo*. La espata imita en esta especie mejor que en ninguna otra la forma y organizacion de las hojas. Es la especie mas elegante que hasta ahora conocemos de este género en el Ecuador.

**B** Espata lanceolada, mas corta que el espádice.

**53 A. Camposii** sp. nov.; LAM. XXVI. *Caule* robusto, ascendente v. breviter scandente; *internodiis* brevibus; *cataphyllis* coriaceis, persistentibus, lanceolatis, internodia plures superantibus; *petiolis* robustis, ab latere compressis, angulatis, intus basi longe vaginatis, sursum cum geniculo crasso argute 1-sulcatis, lateribusque striatis quam limbi brevioribus; *limbis* coriaceis, utrinque intense viridibus, late ovali-lanceolatis, basi profunde cordatis, linea convexa e basi ad apicem acuminatum gradatim contractis, latitudine sua sub 3-plo longioribus; *lobis* bas. quam terminalis sub 4-plo brevioribus, retrorsis, obtusis v. apice oblique truncatis, latere interiore convergentibus et sese mutuo obtegentibus, basi sinu acutangulo, costis longiuscule denudatis seiunctis; *nervis* omnibus supra immersis, subtus prominentibus, argute acietatis; *nervis lob. bas.* 6-7, extimis 5 retrorsis, prope marginem abrupte arcuatis in marginem desinentibus, 2 intimis, arcuato-ascendentibus, cum 4 interlobaribus el costalibus lobi terminalis (utrinque 14-15) in nervum collectivum a margine 3-4 mm. remotum confluentibus; *pedunculis* robustis, erectis, rigidis, ab latere compressis, deorsum truncatis vel striatis, quam petioli sub 2-plo longioribus; *spatha* coriácea,  $\infty$ -nervia, oblongo-lanceolata, apice subulato acuminato, basi antice longe decurrente stipitemque longe denudante, dorso intus eidem longiuscule adnata, extus carinata in pedunculum argute et longe producta; *spadice* cylindrico, flexili, subcernuo, sordide rubrovirente, spatham sub 2-plo superante; *tepalis* leviter cuneatis, apice cucullatis latitudine sua  $\frac{1}{2}$  longioribus; *bacca* fere obovata, apice conico tetragona; *tepala* vix superante.

Crece en los bosques de la cordillera oriental en la orilla del río *Masca* (2/905).

Especie próxima al *A. sclerophyllum*, distinguiéndose por su mayor robustez, los pecíolos estriados en los lados, siempre mas cortos que los límbos, los límbos mayores; los pedúnculos doble mas largos que los pecíolos; la espata mas larga y coriácea; el espádice mas largo y mas grueso; los tépalos relativamente mas cortos, etc.

**SERIE II ERYTHROSTACHYA.** *Espádice* rojo o purpúreo. (Sp. 54-64).

**I** Nervios de los lóbulos basales libres; espádice largamente estipitado.

**54 A. nitens** sp. nov.; *caudice* modice crasso, erecto; *internodiis* brevibus; *cataphyllis* dense papyraceis, persistentibus, linearibus, petioli  $\frac{1}{2}$  aequantibus; *petiolis* basi dilatatis, longius-

cule vaginatis, subcylindricis, cum geniculo longulo, tumido antrorum 1-sulcatis; *limbis* papyraceis, utrinque viridibus, nitidis, ex basi leviter cordata ovato-ellipticis, apice cuspidatis, latitudine sua  $\frac{1}{3}$  longioribus; *lobis basalibus* quam terminalis 6-ies brevioribus, retrorsis, divergentibus, sinu subtriangulari obtuso, costis ad basin usque alatis circumscripto; *nervis* omnibus tenuibus, in sicco utrinque exertis; *loborum basalium* utriusque 3, retrorsum arcuato-patentibus, omnibus vel 2 extimis exceptis, cum I. lobi terminalis (utrinque 17-18; erecto-patentibus parallelis) in nervum collectivum 3-4 min. a margine distantem confluentibus; *pedunculo* quam petiolus sub 2-plo breviore; *spatha* dense cartilaginea, lanceolata, apice longe subulato-cuspidata, basi amplexante, mature reflexa, quam spadix longiore; *spadice* longe ( $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$  cm.) stipitato, erecto, rigido, purpureo; *tepalis* apice cucullatis; *ovario* subelliptico; *bacca* stylo tetragono ultra sepala producta, purpurea.

Crece en los bosques tropicales de la provincia de *Esmeraldas*, desde *Alto-tambo* hasta *Cachabí*.

**III** Nervios de los lóbulos basales soldados entre sí en la base formando las costillas mas o menos largamente desnudas;

A *Espádice* sesil; *baya* colorada;

A *Seno bas.* mui ancho; *lób. bas.* cortos, divergentes;

a *Lób. bas.* 10-12 veces mas cortos que el terminal; *baya* oblonga de color carmin.

**55 A. macrolonchium** sp. nov.; *caudice* erecto vel ascendente, modice crasso; *internodiis* brevibus; *cataphyllis* cartilagineis, persistentibus, linear-lanceolatis, apice breviter subulatis, cum petiolis pedunculisque fusco-purpurascensibus; *petiolis* semicylindricis, basi breviter vaginatis, cum geniculo mediocri antice obtuse 1-sulcatis; *limbis* cartilagineis, supra intense, subtus pallide-viridibus; *lineolis* glandulise pellucidis dense notatis, latitudine sua plus 2-plo longioribus, basi haud profunde cordatis, sursum gradatim angustatis, apice longe cuspidatis; *lobis. bas.* divergentibus, obtusis, quam terminalis multoties brevioribus, sinu latissimo, costis divaricatis breviter denudatis circumscripto seiunctis, 4-nerviis; *nervis* 3 intimis cum I. costalibus plerumque in nervum collectivum a margine 2-4 mm. remotum, quandoque interruptum confluentibus; *nervis cost.* I. utrinque 18-20 subangulo acuto ascendentibus, parallelis, rectis vel vix arcuatis, cum ceteris supra impressis, subtus leviter exertis; *pedunculo* quam petiolus sub 2-plo breviore, ab latere compresso, vel fere trigono; *spatha* papyracea purpurascente linear-lanceolata, amplexante, apice subulato acutata, quam spadix breviore; *spadice* subsessili, cernuo, purpureo, rigido subcylindrico; *bacca* oblonga, sursum conice angustata, apice obtusa, miniata, matura e *tepalis* longe exerta.

Crece en la provincia de *Esmeraldas*, en la orilla del río *Santiago*.

Especie parecida, en cuanto al aspecto jeneral a nuestro *A. vexillare*, del cual sin embargo, se distingue por el seno basal mui ancho y poco profundo, por los lóbulos basales diverjentes y mucho mas cortos, por la forma y consistencia de la espata, por el espádice sesil y mucho mas corto, etc.

**b** Lóbulos basales 6-8-plo mas certos que el terminal; baya aovada rojo-anaranjada.

**56 A. Leveillei** sp. nov.; *cale* erecto vel ascendente; *internodiis* brevibus; *cataphyllis* elongatis, lineari-lanceolatis, fragilibus, mox deciduis; *petiolis* subcylindricis, antice basi breviter vaginatis, sursum cum geniculo mediocri, 1-sulcatis, limbos superantibus; *limbis* papyraceis, utrinque viridibus, crebre pellucido-punctatis, basi haud profunde cordatis, ab apice loborum basalium sursum linea recta vel obiter convexa gradatim in apicem cuspidatum contractis, latitudine sua sub 2 plo longioribus; *lobis bas.* retrorso-divergentibus, obtusis, quam terminalis 6<sup>ies</sup> 8<sup>ies</sup> brevioribus, sinu lato seiunctis patentibus; *costis* basi brevirter denudatis, 4-5 nerviis; *nervis* omnibus supra leviter, subtus manifeste prominentibus; *nervis* loborum basalium uno alterove excepto (cum 2 interlobaribus et costalibus I. utrinque 16-18 subangulo acuto adscendentibus) in nervum collectivum margini approximatum confluentibus; *pedunculo* quam petiolus tenuiore et  $\pm \frac{1}{3}$  breviore; *spatha* cartilaginea, oblonga, basi antice, breviter decurrente, apice longe subulata; *spadice* antice breviter stipitato, dorso subsessili cylindrico, obtuso conico, purpureo spatham parum superante; *tepalis* (fructiferis) cuneatis, 7 mm. longis, 4 mm. latis, purpureis, apice cucullatis; *bacca* ovata, rubro-aurantiaca, stylo conico, obtuse tetragono e *tepalis* exerto, acuminata.

Crece con la precedente, de la cual se distingue por las proporciones, color, consistencia y puntuacion del todo diferente del limbo.

**B** Seno basal aovado o casi circular; lób. bas. mas o menos converjentes;

**a** Seno basal aovado; lób. bas. separados; espádice fructifero cilindráceo.

**57 A. lineolatum** sp. nov.; *caudice* erecto, modice crasso; *internodiis* brevissimis; *cataphyllis* dense cartilagineis, purpurascenscentibus, lineari-lanceolatis, mature deciduis; *petiolis* erectis, rigidis, basi extus incrassatis, intus breviter vaginatis, sursum antice, una cum geniculo longulo incrassato, 1-sulcatis, limbos longe superantibus, purpurascenscentibus et lineolis albis dense conspersis; *limbis* cartilagineis, supra intensius, subtus dilute viridibus lineolis albidis notatis, latitudine sua subdupo longioribus, ovalibus, apice cuspidatis, basi cordatis; *lobis basal.* retrorsis, obtusis vix convergentibus, sinu ovato seiunctis, quam terminalis multo brevioribus, sub 4-nerviis; *nervo extimo* tenuissimo; 3 intimis basi in costas breviter exalatas concretis; intimo cum interlobaribus (utrique 1), et I. lobi antici (16 17 iugis) in nervum collectivum tenuem, a margine 3-4 mm. remotum con-

fluentibus, omnibus supra impressis, subtus exertis; *pedunculo* quam petiolus subbreviore et tenuiore, lineolis albidis, ut petioli, notato; *spatha* linear-lanceolata, dense cartilaginea, quam spadix fere dimidium breviore, basi antice obiter decurrente, stipitemque spadicis breviter denudante; *spadice* brevissime stipitato, erecto, sursum attenuato, purpureo; *bacca* matura miniata, oblonga, tetragona, sursum angustata, tepala superante.

Crece en la rejion tropic. de la prov. de *Esmeraldas*, entre los rios *Cachabí* y *Lita*. (8/904).

Especie afine a nuestro *A. oreophilum*, del cual se distingue principalmente por los lóbulos basales mucho mas largos, los nervios largamente soldados entre sí y la baya madura casi salida de los tépalos.

**b** *Seno basal* casi circular; *lób. bas.* empizarrados; *espádice* cilíndrico.

**58 A. Pirottæ** sp. nov.; *caudice* scandente; *intetnodiis* mediocribus; *cataphyllis* linear-lanceolatis, deciduis; *petiolis* robustis, 5-6 cm. longis, subcylindricis, basi breviter vaginatis, antice cum geniculo longulo, obiter 1-sulcatis; *limbis* pergamentaceis, dense pellucido-punctatis, utrinque viridibus, cordato-ovatis, latitudine sua sub 2-plo longioribus; *lobis bas.* quam terminalis sub 4 plo brevioribus, retrorsis, convergentibus et sese mutuo latisucule obtegentibus, sinu subrotundo aut ovato seiunctis; *lob. termin.* cum basalibus continuo, sursum linea obiter convexa, apice abrupte in cuspidem linearem contracto; *nervis* I. 15-18-iugis omnibus supra subimmersis, subtus exertis, carinatis; *nervis lob. bas.* 5, intimo, parum supra basin soluto, ceteris in costas 1-2 cm. a basi denudatas concretis, duobus v. tribus, extimis in margine desinentibus; reliquis cum interlobaribus et I. lobi terminalis in nervum collectivum a margine 4-5 mm. remotum confluentibus; *pedunculo* quam petiolus graciliore et sub  $\frac{1}{2}$  breviore; *spatha* papyracea, linear-ligulata, basi vix decurrente, apice abrupte in cuspidem subulatam,  $\pm$  longam contracta; *spadice* subsessili; cylindrico. rigido, obtuso, fusce-purpurascente, 8-10 cm. longo, 8-10 mm. (sub anthesi) crasso; *bacca* rubra obovata, sursum in stylum 1  $\frac{1}{2}$  mm. longum obtusum contracta.

Crece en los bosques de la prov. de *Esmeraldas*, entre los rios *Cachabí* y *Santiago*.

Especie semejante a la precedente en la forma tamaño y aspecto de las hojas, pero diferente a primera vista por la consistencia y color de las mismas, y otros caracteres relativos al tallo, pedúnculo, espádice, etc.

**B** *Espádice* estipitado.

*A* Limbos aovados, circunscritos por linea uniformem. convexa; *espata* cartilaginea blanca.

**59 A. albispatha** sp. nov.; *caudice* brevi, crasso; *cataphyllis* elongatis, lanceolatis, coriaceis, demum in fibras ferrugineas dissolutis; *petiolis* erectis, rigidis, fusce-purpurascensibus, limbos subaequantibus, dorso convexis, ab latere compressis, intus basi

breviter vaginatis, sursum cum geniculo mediocri 1-sulcatis; *limbis* cartilagineis nitentibus, supra intense viridibus, subtus albidis, tenuissime pellucido-punctatis, ovatis, profunde cordatis, apice breviter acuminatis, latitudine sua sub 2-plo longioribus; *lobis bas.* retrorsis, obtusis, leviter convergentibus, quam terminalis sub 4-plo brevioribus, sinu late ovato v. subparabolico seiunctis; *nervis* omnibus supra impresis v. vix prominulis, subtus exertis acietatis; *loborum bas.* (quam costales validioribus) utrinque 7, plerisque in margine desinentibus, intimis (1-3) cum interlobaribus costalibusque I. (18-20-iugis) in nervum collectivum a margine vix 2 mm. remotum confluentibus; *pedunculis* quam petioli tenuioribus et  $\frac{1}{3}$  brevioribus angulatis; *spatha* dense cartilaginea, alba, dorso tenuiter 8-nervia, late lanceolata, basi amplexante, apice acuto glandulifera, spadicem sub anthesi subaequante; *spadice* breviter stipitato, dilute-roseo, cylindrico, rigido, decurvato, sub anthesi 8-9 cm. longo, 5 mm. crasso; *tepalis* apice cucullatis, albopunctatis; *antheris* vix exertis, flavis. (Spadice maturo mihi ignoto).

Crece en los bosques trop. de la prov. de *Esmeraldas*, cerca de *Mina-rica*.

Varía algun tanto en la consistencia y color de los limbos, en la forma del lóbulo terminal ± prolongado y circunscrito por líneas laterales ± convexas o casi rectas, en la forma y amplitud del seno basal, etc.

B *Limbos* y *espata* de otras condiciones;

a *Limbos* mas o menos asaetados o hastados;

I *Lob. bas.* lijeram. converjentes; *limbos* discoloros.

**60 A. discolor** sp. nov.; *caudice* ascendente; *internodiis* brevibus; *cataphyllis* elongato-lanceolatis, acutis, pergamantaceis, diu persistentibus; *petiolis* robustis, subcylindricis, basi breviter vaginatis, antice, cum geniculo longulo, obiter 1-sulcatis, limbos superantibus *limbis* dense papyraceis, supra cyaneo-virentibus, subtus viridi-rubentibus, utrinque, pilis diminutis punctiformibus, supra potissimum, dense conspersis, ex basi ovata profunde cordata, sursum gradatim angustatis, prope apicem breviter acutatum obtusatis, latitudine sua 2  $\frac{1}{2}$ -plo longioribus; *lobis bas.* quam terminalis sub 3-plo brevioribus, retrorsis, obtusis, circa medium leviter convergentibus, sinu ovato, costis 4-6-nerviis longiuscule denudatis, circumscripto seiunctis; *nervis* omnibus modice crassis, utrinque (subtus magis) exertis, loborum basalium retrorsis, erga marginem abrupte arcuatis, extimo in margine desidente, ceteris (3) cum 2 interlobaribus et I. lobi terminalis utrinque 6-7 in nervum collectivum (a medio sursum) margini approximatim confluentibus; *nervis* II. lobi terminalis cum III. in reticulum coniunctis, intra marginem deliquescentibus; *pedunculo* petioli dimidium subaequante, eoque tenuiore; *spatha*

*papyracea fusce purpurascente, ovali-lanceolata, basi breviter decurrente, apice acuminata; stipite antice longiuscule denudato, dorso (totus) spathae adnato; spadice (cuius pas tantum prostat) purpurascente; tepalis cucullatis, cuneatis, latitudine sua subdupo longioribus.*

Crece en los bosques trop. de la prov. de *Esmeraldas*, entre los ríos *Santiago* y el de *Cachabí*.

Especie mui bien caracterizada y mui adecuada como planta de adorno por la hermosura de su follaje.

2 *Lóbulos basales* divergentes; *limbos* sensiblemente concoloros;

\* *Estípite* del espádice adherido en el dorso hasta la mitad a la espata; *filamentos* inclusos.

**61 A. Gaffurii** sp. nov.; *caule* erecto vel adscendente; *internodiis* brevissimis; *cataphyllis* subcoriaceis, fragilibus e basi dilatata sursum gradatim angustatis; *petiolis* rigidis, subcylindricis, intus basi modice vaginatis, sursum geniculoque longulo obtuse 1-sulcatis, *limbos* aequantibus vel superantibus; *limbis* subcoriaceis opacis, viridi-glaucescentibus subhastato-cuneatis, cordatis, latitudine sua plus duplo longioribus; *nervis* omnibus utriusque modice, supra tenuius exertis; *lobis basalibus* obtusis, retrorsis, divergentibus quam terminalis sub 6 plo brevioribus, in terminalem linea obiter concava transeuntibus, sinu basali parabolico; *costis* basi breviter denudatis, nervis 4, plerumque omnibus in marginem prodeuntibus conflatis; *nervis* interlobaribus, utrinque 1, cum costalibus I. 11-12-iugis cum uno altero ex II. pluribus inter singula iuga interiectis, in nervum collectivum margini approximatim confluentibus; *pedunculo* quam petiolus breviore et tenuiore; *spatha* pergamantacea, anguste ovali-lanceolata basi decurrente apice acuta, 7-nervia; *stipite* tenui longiuscule, dorso ad dimidium, spathae adnato; *spadice* (per athesin) tenui, erecto, cylindrico, rubro, quam spatha brevior; *filamentis* antheras parum superantibus; *ovario* ovato inclusio; *stylo* brevi, stigmate magno coronato.

Crece en los límites de la prov. de *Imbabura* con la de *Esmeraldas*.

Especie afine, en lo tocante a la forma, consistencia y nervacion de los limbos, al precedente y al siguiente; distinto del primero por el color de los mismos limbos por direccion y proporciones de los lóbulos basales, por el estípite del espádice adherido solo en parte a la espata etc.; del segundo, por las proporciones menores de todas sus partes, por la forma y direccion de los lóbulos basales, por la lonjitud del pedúnculo, del espádice y de los estambres etc.

(Concluirá).

