

SUR QUELQUES LATHRIDIENS DU CHILI

— PAR —

MAURICE PIC

(Digoin (Saône-et-Loire))

Les Lathridiens faisant l'objet du présent article m'ont été communiqués par le zélé professeur Porter; ils proviennent de ses récoltes et de celles du Dr. Delfin, faites à Los Molles en 1903, et de celles du Dr. Delfin à Talcahuano en 1900.

C'est aidé de la collection du grand spécialiste universellement connu, le R. P. Belon, que je possède aujourd'hui, qu'il m'a été possible d'entreprendre la présente étude. J'ai cru, l'occasion s'en présentant, devoir publier la description d'une espèce de *MELANOPHTHALMA* notée comme inédite dans cette collection.

Les espèces, plus nombreuses, provenant de Los Molles ont été recueillies au mois de Septembre 1903 par M. C. E. Porter et F. Delfin. Le Dr. Delfin a capturé en 1900 à Talcahuano, 3 espèces: un *Enicmus* et deux *Melanophthalma*.

Voici l'énumération des récoltes, dont je viens de parler; augmentée de la description de *Melanophthalma proxima*. Je n'ai pas cru devoir donner de noms à quelques exemplaires testacés et mal conservés du genre difficile et nombreux *Melanophthalma*, ceux-ci, voisins de *proxima* et *distinguenda*, seraient peut être nouveaux, ce qui sera à réétudier ultérieurement.

CONINOMUS DROMEDARIUS Belon	Los Molles
C. HUMERALIS Belon	Los Molles
C. SUBFASCIARUS Reitt.	Los Molles
ENICMUS (CONITHASSA) MINUTUS L.	Los Molles et Talcahuano
ADISTEMIA WATSONI Wol.	Los Molles
MELANOPHTHALMA DISTINGUENEDA Com. (<i>seminigra</i> Bel.)	Los Molles
MELANOPHTHALMA sp. (peut être <i>distingueda</i> var.)	Talcahuano
MELANOPHTHALMA sp.	Los Molles

Espèce incertaine, que je n'ose pas décrire, voisine de *distingueda* entièrement testacée pâle sauf les yeux foncés, à forme assez allongée, très atténuée à l'extrémité, pubescence en partie soulevée, prothorax médiocrement impressionné.

Melanophthalma proxima (Reitter). Modice elongatus, apice attenuatus, satis nitidus et luteo pubescens, nigropiceus aut brunnescens, elytris apice dilutioribus, antennis pro parte, capite anterius et pedibus pallidis; *C. distinguenda* vicina.

Modérément allongé, atténué à l'extrémité, assez brillant, orné d'une pubescence flave en partie soulevée, avec, à l'état frais, de longs poils dressés noir de poix, parfois brunâtre, avec les élytres plus ou moins flaves au sommet devant de la tête, base des antennes et pattes pâles, tête moyenne, plus claire antérieurement, finement alutacée avec une ponctuation forte et peu serrée, tempes distinctes; yeux gros et assez saillants. Antennes plus ou moins rembrunies au sommet et pâles à la base, à premier article globuleux, 2^{me} allongé et épais, suivants allongés et grêles, les trois derniers formant une massue bien distincte assez épaisse, le terminal étant plus large que les deux précédents. Prothorax large, ponctué comme la tête, un peu plus long que large, sinué et à angles obtus sur les côtés, fortement impressionné transversalement devant la base. Elytres bien plus large que les prothorax à la base assez longues, atténués à l'extrémité, subanguleusement arrondis au sommet, modérément striés mais fortement ponctués en rangées, la ponctuation moins forte au sommet, présentant quelquefois à la base une impression distincte plus ou moins en forme de demi cercle, épaules assez marquées; ces organes sont plus ou moins foncés avec l'extrémité (quelquefois aussi le pourtour ou les épaules) plus claire. Dessous du corps ordinairement foncé. Pates pâles. Long. 1,8 à 2 mill. Chili: Valdivia ⁽¹⁾ (coll. Pic); Los Molles (Porter et Delfin) Talcahuano (Delfin).

Cette nouveauté, voisiné de *M. distinguenda* Com., en outre de sa coloration, s'en distingue, à première vue, par la forme du corps plus allongée ou plus atténuée en arrière, enfin le prothorax plus long.

(1) Exemplaires de l'ancienne collection exotique de Reitter ayant fait ensuite partie de la collection Belon et maintenant en ma possession.

