

Himenópteros nuevos del Uruguay

DESCRITOS POR H. FRIESE EN LA REV. «TERMESZETRAJZI
FÜZTEK», I ESTRACTADOS POR EL

Prof. Carlos E. Porter

Dada la circulacion que hoy tiene en la República Oriental del Uruguay la presente Revista i en mi deseo de prestar un modesto servicio a los entomólogos uruguayos que no reciban la hermosísima publicación húngara a que hago referencia la que, por otra parte, no se remite hasta la fecha sino a una docena de Instituciones científicas centro i sud-americanas, extracto las siguientes diagnósticos de Himenópteros del Uruguay, nuevos para la ciencia i que pueden leerse en el tomo XXIII, en las páginas que indico entre paréntesis:

Epicharis maculata Sm., var. **grandior** FRIESE, n. var.
(Pág. 40). ♀.—Labro nigro, medio flavo-lineato, interoculari vix flavo-maculato, scutello fere flavo, abdominis segmentis 2-4 lateribus flavo-maculatis.—Long. 17-18 mm. (*Montevideo*, in Mus. Berlin).

Centris tricolor, FRIESE, n. sp. (Pág. 45).

CENTRIS LANIPES, *Burmeister*, Stettin Entom. Ztg. XXXVII (1876) Pág. 163 ♂ ♀! (nec. Fabr.) Nigra, fulvo-hirta, abdomine rufo, apice nigro-setoso; capite-nigro, nigro-hirto, mandibulis ante apicem flavo-cingulatis; thorace supra fulvo, subtus nigro hirto; pedibus nigris, nigro-hirtis, ♀ scopa nigra, ♂ clypeo labroque flavis.—Long. ♀ 14-15 mm., ♂ 12½-13 mm. *Montevideo* ♂ ♀, Mus. Berlin.

