

Los MIRIÓPODOS

Son los *Miriápodos*, o *Miriópodos* según la dicción más reciente, animales invertebrados terrestres, de aspecto vermiforme, que habitan en casi todas las regiones del globo prefiriendo los sitios húmedos i sombríos, debajo de las piedras, o bajo la corteza de los árboles, tanto en los campos como en las casas.

Estos animales pueden definirse brevemente así:

Artiópodos traqueales de cabeza distinta, seguida de una serie continua de anillos semejantes entre sí, cada segmento provisto de uno o dos pares de patas. Un par de antenas; dos o tres pares de apéndices bucales.

Los Miriópodos tienen sobre el hombre una influencia relativamente escasa si se la compara con la que ejercen otros grupos de invertebrados, v. gr. los Insectos.

Sus especies, poco numerosas (unas 800 en todo el globo), llamadas comunmente *ciempies* o *cientopies* i *milpies* son, en su inmensa mayoría, completamente inofensivas. Existen sólo en reducido número las que causan algún daño en los huertos, atacando las raíces, los tubérculos i las semillas durante la germinación (*Blaniulus*, *Polydesmus*, *Strongylosoma*, etc.), i son más escasas aún las temibles por su mordedura; estas últimas sólo se encuentran en los países cálidos i figuran entre las de mayor tamaño (*Escolopéndridos*).

Antes de entrar en el estudio de la organización, desarrollo

i clasificacion de los seres de que por ahora tratamos, terminaremos esta rápida introduccion indicando a nuestros lectores que, desde el punto de vista paleontológico, los Miriópodos existian ya en los terrenos *devonianos* (se conocen dos especies fósiles); que los terrenos *carboníferos* encierran, segun el PROFESOR SINCLAIR, no ménos de 32 especies (la mayor parte americanas) i que los terrenos *jurásico* i *terciario* nos presentan tambien, entre sus fósiles, representantes de esta clase del reino animal, especialmente en el ámbar.

I.—Morfología externa.

Estos artrópodos terrestres tienen un cuerpo alargado, cilíndrico o aplanado, compuesto en la mayoría de los casos de numerosos segmentos (9), provistos de apéndices articulados.

En algunas ocasiones el cuerpo es corto i grueso (*Glóméridos*).




Fig. 1.—SCOLOPENDRA MORSITANS.

El número de segmentos, variable de una especie a otra, parece ser constante para una misma especie. Jeneralmente presentan estos segmentos poca diferencia en tamaño; pero, como pasa en los *Lithobius*, alternan segmentos grandes con otros mas pequeños, provistos todos de patas.

La *superficie del cuerpo* de estos animales es, como en los insectos, de naturaleza quitinosa; presenta finísimos pelos (microscópicos) i los orificios de las glándulas hipodérmicas.

La *quitina* se encuentra dividida en dos capas: una mui delgada externa (*o cutícula*), resistente, que desaparece al nivel de las articulaciones

(9) En los *Himantharium* el número de segmentos llega a 173.

i una interna, estratificada, que no se interrumpe i recubre uniformemente toda la longitud del cuerpo. La quitina se encuentra atravesada por numerosos canalículos, jeneralmente formando zig-zag. Estos canalículos se abren al exterior por poros o bien terminan en la base de los pelitos cuticulares.

La *cabeza*, bien distinta, es mas o ménos del ancho del cuerpo i resulta de la soldadura de varios metámeros. Respecto a su posicion, es inclinada hácia abajo o bien horizontal.

En esta rejion se observan: *a)* las *antenas* que son sencillas i compuestas de un número variable de artejos; *b)* los *ojos*, colocados a los lados de la cabeza, que tambien sencillos i en número variable, están a veces tan juntos (*Scutigera*) que parecen verdaderos ojos compuestos; *c)* las *piezas bucales* (labio superior, mandíbulas, uno o dos pares de maxilas).

No se distingue en los Miriópodos el tórax del abdómen. Los apéndices que llevan los segmentos del cuerpo que siguen a la cabeza son *patas* todas idénticas, terminadas en ganchos i compuestas de 6 o 7 artículos; cortas, en número de dos pares para cada segmento e insertas mui juntas en la línea media de la rejion ventral del cuerpo en los *Diplópodos*, son por el contrario algo mas largas, en número de sólo un par en cada segmento e insertas en los lados del cuerpo en los *Quilópodos* (*).

(*) Habríamos querido hacer estudios sobre la locomocion de estos animales; pero debemos confesar que ello no nos ha sido posible por falta absoluta de tiempo para llevar a cabo tan importante investigacion, que requiere muchísimo cuidado i presenta grandes dificultades a causa de lo rápido que es el movimiento de las numerosas patas que poseen.

Por otra parte, ya competentísimos i pacientes investigadores se han ocupado del asunto sin arribar a conclusiones satisfactorias.

En un interesante trabajo que tuvo la amabilidad de remitirnos en 1904, el eminente profesor E. RAY LANKESTER, Director del *British Museum* de Lóndres (véase Bib iografía), hai un apéndice que trata sobre la locomocion en los Onicóforos, Diplópodos i Quilópodos. Con respecto a los últimos, dice que es mui difícil analizar este movimiento, a tal punto

De estos apéndices, los dos primeros pares contribuyen, en los Quilópodos, a la constitucion del aparato bucal como lo veremos mas adelante.

II.—Anatomía i Fisiología.

A) **Aparato digestivo.**—El aparato digestivo consta de la boca, de que ya nos hemos ocupado rápidamente i del *tubo digestivo* i de sus *anexos*, de los cuales diremos algunas palabras.

a) **TUBO DIJESTIVO.**—Sigue una direccion rectilínea desde la boca hasta el ano (salvo en los *Gloméridos*, en los cuales presenta algunas circunvoluciones), i se distinguen en él tres partes: *intestino anterior*, *intestino medio* e *intestino terminal*.

El intestino anterior o *esófago* es corto i estrecho, su direccion es vertical, encorvándose luego para abrirse en el intestino medio o *estómago* provisto de numerosos folículos gástricos


que, como jocosamente lo espresa, si a uno de estos mismos animales se le preguntara en qué orden mueven sus apéndices, seria incapaz de explicarlo, i cita, al final, las siguientes estrofas de un versificador ingles:

A centipede was happy! Till
 «One day a toad in fun
 Said, «Pray which leg
 Moves after which»?
 This raised her doubts to such a pitch,
 She fell exhausted in the ditch,
 Not knowing how to run.»

Los Diplópodos marchan con ménos rapidez que los Quilópodos.

SINCLAIR, en «The Cambr. Nat. Hist.» (V. Bibliogr.), emite la opinion de que estos Miriópodos (sin indicar en qué especie ha hecho sus observaciones), mueven sus pies a manera de oleadas en series de a cinco.

El profesor Lankester (l. c.) da dos figuras que indican la sucesion de los grupos de patas, en el movimiento de un *Archispirostreptus* i de un escolopéndrido.



ESPLICACION DE LA LÁMINA II

Anatomía de un *Lithobius* ♂. (Del *Memor. de Zool.* de C. E. PORTER. Esquema basado en la fig. 43 de Vogt & Yung): A, antenas.—B, gancho venenoso.—C, glándulas salivales.—D, patas.—E, cordon ganglional.—F, esófago.—F¹, intestino medio. - F², recto.—G, testículo impar.—J, testículos pares.—I, K, glándulas accesorias (grandes i pequeñas).—H, tubos de Malpighi.—L, láminas de las patas posteriores.

i rodeado de una cantidad de tejido adiposo mas o ménos abundante; la porcion terminal del tubo digestivo, el *recto*, que tiene constitucion análoga al esófago, es corto i ancho i se abre en la estremidad posterior del cuerpo (en el último anillo).

El interior del tubo digestivo está tapizado de una capa de *quitina*, la cual presenta en el esófago, donde es mas gruesa, algunos pliegues lonjitudinales, en cuya superficie suelen existir (*Lithobius*) pequeñísimos dientes dirigidos hácia atras que impiden al alimento volver a la boca; esta capa quitinosa se adelgaza notablemente en el estómago i forma, en este órgano, una finísima lámina trasparente.

En la constitucion del tubo intestinal entran tambien, como en los insectos, a los que tanto se asemejan los Miriópodos por su anatomía interna, capas de fibras musculares.

b) ANEXOS DEL TUBO DIGESTIVO.—Son éstos las glándulas salivales i los tubos de Malpighi.

Las *glándulas salivales* son de distinta conformacion segun el orden a que pertenecen los Miriópodos en que se observan: reducidas a simples tubos en los *Diplópodos*, son por el contrario mas complicadas en los *Quilópodos*, en los cuales son muy desarrolladas i acinosas. En ambos órdenes las glándulas salivales vierten su secrecion en el esófago.

Los *tubos de Malpighi*, en número de dos o cuatro son largos i delgados vasos urinarios (10) que desembocan en la union del estómago con el recto; estos vasos están comunmente enrollados en el tubo digestivo.

Dada la naturaleza del presente trabajo, omitimos describir la constitucion histológica de estos órganos.

(10) Se consideran tubos urinarios por secretar sus células *ácido úrico* que se deposita en forma de *concreciones* en la cavidad o luz del tubo, pasando en seguida al recto i siendo espulsadas estas concreciones con el escremento.

B) Aparato respiratorio.—Como en los insectos, la respiración de los Miriópodos es aérea i su *aparato respiratorio* está formado asimismo de *tráqueas* que se abren, al exterior, por *estigmas* situados en los anillos del cuerpo, hacia la inserción de las patas.

En los *Diplópodos* los estigmas i, en consecuencia, los ramilletes de tráqueas que de estos orificios arrancan son numerosos, existiendo un par de estigmas (en cada segmento) situado en la faz ventral.

En los *Quilópodos* no sólo los estigmas son ménos numerosos por ser mas reducido el número de anillos de que consta el tronco, sino porque hai anillos en que faltan estigmas, como sucede en los *Escolopéndridos* i en los *Litobíidos*; mas esta ausencia de los estigmas en algunos segmentos no es la única variedad que presentan en su aparato respiratorio los Miriópodos: así, en los *Scutigera* los estigmas, que existen sólo en número de siete, no forman sino *una sola fila a lo largo de la línea media dorsal*.

Estos *Scutigera* no tienen verdaderas tráqueas sino *pulmones* (CHALANDE, 1885), constituidos por grupos de numerosos i delgadísimos tubos sumamente cortos i sin espesamiento espiral. Los mencionados pulmones, o sacos pulmonares, están localizados en el borde posterior de los escudos dorsales i comunican con el exterior por un estigma cada uno.

Los ramilletes de tráqueas que tienen su origen en cada estigma conservan su independencia en los *Diplópodos*, i en los *Litobíidos* entre los *Quilópodos*; en los demás (escepto los *Scutigera*), un tronco anastomótico corre a lo largo de cada costado del cuerpo comunicando los estigmas del lado correspondiente.

Las contracciones del vaso dorsal i del tubo digestivo i además los movimientos del tronco durante la marcha, se traducen por cambios de volúmen en la cavidad del cuerpo del animal, produciéndose así la renovación del aire que recorre

los órganos en los que se consumen las finísimas ramificaciones del aparato traqueal.

C) Aparato circulatorio.—Es análogo al de los insectos. Un *vaso dorsal*, dividido en tantas *cámaras* cuantos segmentos presenta el cuerpo, recorre toda la longitud del tronco. Cada una de las cámaras está unida a la pared dorso-lateral del cuerpo por un par de *músculos aliformes*.

La *sangre*, que baña los órganos, penetra en estos departamentos por hendeduras que tienen la figura de un ojal (*ostíolos*) i se pone en movimiento por las contracciones rítmicas (1) de que están animadas dichas cámaras.

Dos *arterias* nacen de cada cavidad del vaso dorsal, excepto de la anterior que da origen, por su parte delantera: *a*) a una *arteria mediana* que distribuye sangre a las piezas de la boca i otros órganos cefálicos, *b*) a dos *arcos laterales* que, reuniéndose en la línea media de la parte ventral, forman un anillo sanguíneo completo que rodea el esófago. Del punto de reunión de estos arcos en la parte ventral, nace un vaso llamado *arteria ventral* que se dirige hacia la parte posterior del cuerpo por encima de la cadena ganglional. Del mismo punto en que nace la arteria ventral, arranca i se dirige hacia adelante la *arteria cefálica inferior*. De cada lado del anillo sanguíneo de que hemos hablado, nace una *arteria cefálica lateral*.

D) Secreciones.—Hemos ya hecho referencia a la secreción de *ácido úrico* por los *tubos de Malpighi* i dicho también algo sobre las *glándulas salivales* al ocuparnos de los anexos del tubo digestivo.

Agregaremos, en este lugar, que los Miriópodos poseen otras secreciones dignas de mención: *glandulillas* que se abren por poros situados en el borde posterior de los segmentos pro-

(1) VOGT i YUNG han contado 80 pulsaciones por minuto en el *Lithobius forficatus*, L.

ducen, en los *Diplópodos*, una secreción de olor nauseabundo que sirve de defensa al animal: los *Quilópodos* poseen, en el segundo par de patas, una *glándula* que secreta un líquido venenoso que deja escapar el bicho, cuando pica, por la estrechidad del encorvado i acerado gancho en que terminan dichas patas tan profundamente transformadas.




Fig. 2.—FORCÍPULA DE LA SCOLOPENDRA MORSITANS abierta por la cara bucal (Dubosq): g, glándula venenosa; c, conducto escretor visto por transparencia. o, orificio; i, incisura; ad1, manejo corto del aductor mayor; ad2, manejo largo del aductor mayor; n, nervio; v, arteria.

E) Sistema nervioso.—Como es de regla de en los artrópodos, el sistema nervioso de los Miriópodos está formada por una *cadena ganglional ventral* que comienza en la región cefálica por una *masa cerebroide* i por un *collar esofájico*.

La *masa cerebroide* comprende tres pares de *glanglios* o lóbulos gruesos que corresponden, según Perrier, a otros tantos segmen-

tos cefálicos o méridos.

El *collar esofájico* recibe esta denominación por rodear al esófago.

La *cadena ventral* está compuesta de una serie de ganglios colocados por pares a lo largo de todo el cuerpo, correspondiendo a cada segmento del tronco un par de ganglios muy contiguos i reunidos lateralmente por *comisuras* (1).

La masa cerebroide da origen a los nervios que se distribuyen por los órganos de la cabeza i además a los nervios viscerales.

Cada ganglio de la *cadena ventral* emite delgados *nervios*







Fig. 3.—SISTEMA NERVIOSO DE UN MIRIÓPODO.

(1) Delgados hilos nerviosos.



ESPLICACION DE LA LÁMINA III

A. CORTE TRASVERSAL DE UN QUILÓPODO } (Esquemas de
B. CORTE TRASVERSAL DE UN DIPLÓPODO } HERTWIG):

A, *vaso dorsal*.—B, pared del cuerpo.—C, *tubo digestivo*.—D, *glándulas jenitales*.—E, *tráqueas*.—F, *patas*.—G, *cordon ganglional*.—H, *glándulas repugnatorias*.

C. EMBRION DE STRONGYLOSOMA (Seg. Metschnikoff).

periféricos en número de cuatro, o de tres solamente, que van a las patas i los músculos de la vecindad del ganglio.

F) Organos de los sentidos.—Al ocuparnos de los órganos que lleva la cabeza, dijimos que los *ojos* de los Miriópodos son sencillos (*ocelos*), variables en número i agrupados a los lados de la rejion cefálica i que están a veces tan juntos (*Scutigera*) que parecen ojos compuestos.

En estos artrópodos falta, muchas veces, totalmente el órgano de la vision (algunos *Iulus*, en los *Blaniulus*, en los *Jeo-fílicos*, en los *Cryptops*, en muchos *Polidésmidos*, etc.

Los sentidos del *tacto* i del *gusto* se ejercen por *pelos sensitivos* situados en los órganos correspondientes (antenas, apéndices bucales).

Para la *audicion* no se ha encontrado un órgano particular; sin embargo HEATHCOTE (13) considera como aparato auditivo al *órgano de Latzel*, pequeño saco quitinoso situado en la rejion inferior de la cabeza en los *Scutigera*, i que tiene comunicacion al exterior por una hendedura estrecha, ubicada entre la base de las maxilas i de las mandíbulas.



Fig.—CABEZA MÚI AUMENTADA DE GLOMERIS CONVEXA, mostrando en X el órgano de Tömösvary.

VOGT I YUNG creen que la *olfaccion* es desempeñada por el *órgano de Tömösvary* (*Iulus*, *Lithobius*, etc), situado por delante de los ojos i hácia la base de las antenas. El Prof. EDMOND PERRIER participa de la misma opinion.

G) Aparato reproductor.—Los Miriópodos tienen *sexos separados*, siendo las hembras casi siempre de mayor tamaño que los machos. En ambos sexos los órganos de la jeneracion son comunmente cuerpos tubulosos, alargados e impares i es-

(13) *On a peculiar sense-organ in Scutigera coleoptrata*. Quarterly Journal of Microscopical Science. 3rd. series. Vol. XXV (1885), páj. 213.

tán acompañados en las hembras, por lo jeneral, de *receptáculos seminales* i, en los machos de los *Quilópodos*, de *glándulas accesorias*.

Los *orificios jenitales*, en número de dos en los *Diplópodos*, están situados sobre las ancas del segundo par de patas o bien entre éstas i el tercer par. En los *Quilópodos* existe un orificio jenital impar en el penúltimo segmento del cuerpo.




Fig. 5.—ÓRGANOS JENITALES MASCULINOS (A) I FEMENINOS (B) de la *Scolopendra complanata*: T, testículo; Ov, Ovario, Vd, canal deferente; Sb, vesícula seminal; Dr, Dr, glándulas accesorias.

En los *Diplópodos*, los machos poseen un *órgano copulador* doble, *pedes copulativi* (14), situado a alguna distancia de los orificios jenítales (en la cara ventral del sétimo segmento). Es-

(14) Estos órganos son hoy tomados muy en cuenta en las descripciones de los jéneros i especies; sus formas son muy variadas.

tos órganos se llenan de esperma antes de la cópula, sirviendo así de receptáculos seminales.

H). **Desarrollo.**—Salvo las Escolopendras, que son vivíparas, los Miriópodos se reproducen por *huevos* que ponen en la tierra. De estos huevos sale una pequeña larva provista de un reducido número de segmentos i de 3 a 8 pares de apéndices en los anillos anteriores.

Sólo despues de varias mudas adquieren estos artrópodos el número de segmentos i patas que les corresponde. Experimentan, pues, una metamorfósis incompleta.

NOTA.—Creemos interesante señalar en este lugar, el hecho curioso observado por FILIPPO SILVESTRI, en 1899, en el *Pachyiulus communis*. Esta especie presenta espermatozoides *inmóviles* atraídos por un pseudópodo que emite el huevo.

III.—Caza i conservacion.

Basta sólo recordar que son habitantes de los sitios húmedos i sombríos, i que es bajo las piedras i la corteza de los árboles donde frecuentemente se cobijan, para darse cuenta de la facilidad con que el coleccionista puede procurarse esta clase de animales.

Debemos, pues, tan sólo hacer las siguientes indicaciones:

1) La época mas propicia para obtenerlos es entre el otoño i la primavera, en los países templados.

2) Para tomar estos bichos debe hacerse uso de pinza, mui particularmente cuando se caza en países tropicales donde existen especies grandes cuya picadura es peligrosa.

3) Es importante anotar, juntamente con la procedencia de los ejemplares, la altura en que se encuentran o viven sobre el nivel del mar.

4) El *líquido conservador* mas adecuado es el alcohol de 70°, *debiendo evitarse en absoluto el uso de la formalina* (15).

(15) F. SILVESTRI, *Alcune norme per la raccolta dei Miriapodi*, Extracto de la «Rivista Italiana di Scienze Naturali», 15 Julio, 1895.

IV.—Clasificación.

En las clasificaciones de ARISTÓTELES, LINNEO, CUVIER, LAMARCK, etc., los *Miriópodos* forman parte de los insectos que hoy están, como se sabe, desmembrados en varias clases, constituyendo los animales de que nos ocupamos una división o grupo separado.

En la clasificación de BOLÍVAR (1885), los *Miriópodos* forman la 5.^a clase del tipo de los *Artrópodos* i están colocados entre los Onicóforos i los Insectos. En las clasificaciones de CLAUS (1889) i de PERRIER (1893), el grupo zoológico de que tratamos constituye respectivamente la 4.^a i 6.^a clase de *Artrópodos*, ocupando en ambas el mismo sitio que le asigna Bolívar entre las otras clases del tipo: es decir, entre los Onicóforos i los Insectos.

En nuestro «*Memorándum de Zoolojía*», del que reproducimos directamente las láminas coloreadas i varias de las figuras, constituyen la 3.^a clase de *Artrópodos traqueales* i se les coloca también entre los Onicóforos i los Insectos.

Más de un autor moderno ha separado totalmente los *Diplópodos* de los *Quilópodos*, asignando a los primeros la categoría de Clase autónoma i a los segundos la de simple Subclase de Insectos.

Se dividen comúnmente en dos órdenes principales i pueden distinguirse fácilmente por los caracteres del pequeño cuadro sinóptico que damos en seguida:

CUERPO:	{	<i>cilíndrico</i> o <i>subcilíndrico</i> . Dos pares de patas en cada segmento (excepto en los anteriores). <i>Orificios jenítales</i> en la extremidad anterior del cuerpo.....	Diplópodos
		<i>deprimido</i> . Un par de patas en cada segmento. Orificio jénital en la extremidad posterior del cuerpo	Quilópodos

El primer orden lo dividen muchos autores contemporáneos en 5 familias i el segundo sólo en 4, para cada una de las cuales anotaremos los caracteres mas sobresalientes i mas o ménos constantes, así como indicaremos los jéneros principales.

Orden 1.º: DIPLÓPODOS

Los Miriópodos de este orden tienen un *cuerpo cilíndrico* o *subcilíndrico*, compuesto de un número variable de segmentos que llevan, a escepcion de los anteriores, 2 pares de patas cada uno, insertas bastante juntas en la línea media ventral.




Fig. 6.—IULUS MAXIMUS.

Antenas sencillas de 7 u 8 artejos. Sin ganchos venenosos. *Dos orificios jenítales* en el segundo anillo o entre éste i el tercero. Un par de órganos copuladores, en los machos, sobre el 7.º segmento del cuerpo.




Fig. 7.—PIEZAS BUCALES DE IULUS




Fig. 8.—CABEZA I SEGMENTOS ANTERIORES DE POLYDESMUS COMPLANATUS: *Goe*, orificios sexuales femeninos; *D*, tubo intestinal.

Estos Miriópodos carecen de vesículas seminales i de las glándulas accesorias de que están dotados los Quilópodos. Los espermatozoides tienen forma capilar en algunos (*Polyxenidos*, etc.) i en otros son redondeados e inmóviles (*Polidésmidos*, *Iúlidos*, *Gloméridos*, etc. (16).

Los Diplópodos, llamados también *Quilognatos*, tienen sus patas cortas i se mueven con lentitud. Se alimentan de vegetales i a veces de detritos animales.

Habitan todas las rejiones del globo, principalmente en los sitios húmedos, debajo de las piedras.

Fam. Polyxenidae.—Poseen 10 a 12 segmentos i 13 pares de patas. Cuerpo blando con hacecillos laterales de pelos largos de variadas formas. Cabeza bien distinta. *Polyxenus*, Latr.

Fam. Glomeridae.—Cuerpo casi cilíndrico, aplanado por debajo i capaz de enrollarse formando bola. Cabeza gruesa i



Fig. 9.—GLOMERIS MARGINATA

bien distinta. Cuerpo de 11 a 13 segmentos, de los cuales el 1.º es estrecho. 17 a 21 pares de patas.

Estos Miriópodos se asemejan por su aspecto jeneral a los clopórtidos.

Jéneros principales: { *Glomeris*
 { *Sphaerotherium*.

(16) Consúltense los trabajos de CHALANDE, SILVESTRI, etc.

Fam. Polydesmidae.—Cuerpo a menudo aplanado i de tegumento duro, compuesto de 19 o 20 segmentos; 30 o 31 pares de patas. Carecen de ojos. Susceptibles de enrollarse en espiral.

Jéneros importantes: {

- Abatodesmus*
- Craspedosoma*
- Cryptodesmus*
- Eurydesmus*
- Leptodesmus*
- Polydesmus*
- Platydesmus*
- Strongylosoma*
- Trienchodesmus*
- Semnosoma.*

Entre las mas notables del extranjero mencionaremos el *Polydesmus toltecus* (fig. 10), de Méjico.





Fig. 10.—POLYDESMUS TOLTECUS

Fam. Iulidae.—Cuerpo cilíndrico, capaz de enrollarse en espiral, compuesto de mas de 30 anillos (indeterminado: a veces hasta 60 o 70). Cabeza gruesa, provista de ojos laterales agrupados. Labio inferior bien desarrollado.

Jéneros principales son: {

- Archispirostreptus*
- Autostreptus*
- Blaniulus*
- Cilindroiulus*
- Iulus*
- Lysiopetalum*
- Spirostreptus*
- Spirobolus*
- Schizophyllum.*



Fi. 11.—AUTOSTREPTUS CHILENSIS, 7/8 del tamaño natural (*Fig. orijinal*). De una fotografia tomada, para el autor, por Don Erasmo Arellano D.

Fam. Polyzonidae.—Cuerpo de tegumentos duros, compuesto de 30 a 100 segmentos. Cabeza pequeña, labio inferior nulo.

Estos acostumbran tambien enrollarse en espiral.

Jéneros importantes: { *Polyzonium*
Siphonotus.

Orden 2.º: QUILOPODOS

Estos Miriópodos poseen un *cuerpo comprimido dorsoventralmente*. Sus segmentos en número tambien variable, como en el órden anterior. Llevan los Quilópodos sólo un par de patas en cada anillo, insertas a los lados del tronco. Las antenas, filiformes, son a veces mas largas que el cuerpo i están formadas a lo ménos por 12 artejos. El 2.º par de patas-maxilares terminadas en un *gancho venenoso*. Orificio jenital en el penúltimo segmento del tronco. Machos desprovistos de órganos de apareamiento.

Los espermatozoides, filiformes, son espulsados en agrupación (espermatóforos).

Los *Quilópodos* se alimentan de pequeños animalitos a los que cazan i matan por medio de su mordedura venenosa.

Fam. Geophilidae.—Cuerpo angosto i mui alargado compuesto de segmentos numerosos subiguales, con 31 a 180 pares de patas; éstas, cortas, con tarso de un solo artejo. Cabeza de tamaño variable; sin ojos; antenas de 14 artejos.




Fig. 12. — APARATO BUCAL DE SCOLOPENDRA MORSITANS. 1, antenas.—o, ojos.—l, labio superior.—2, mandíbulas.—3, maxilas.—4, labio inferior provisto de palpos.—5, maxilípedos.

Jéneros importantes son:

Apogeophilus
Eurytion
Geophilus
Himantharium
Linotaenia
Mecistocephalus
Orinophilus
Pachymerinus
Pachymerium
Scolioplanes
Schendyla
Stigmatogaster
Schizotænia



Fig. 13.—GEOPHILUS ELECTRICUS

OBS.—La familia de los *Jeofilidos* es la única de Miriópodos en que han podido observarse especies fosforescentes (varios *Geophilus* de Europa i alguna especie de Africa).

Fam. Lithobiidae.—Cuerpo compuesto de pocos segmentos. Quince placas dorsales e igual número de pares de patas,

las posteriores mas largas; tarsos triarticulados. Ojos comunmente numerosos.

Jéneros importantes son: { *Anopsobius*
Henicops
Lithobius




Fig. 14.—LITHOBIUS FORFICATUS

Fam. Scolopendridae.—Cuerpo alargado, compuesto de 21 a 23 anillos i otros tantos pares de patas, siendo el último par mas largo. Comunmente 4 ojos, a veces ninguno. Antenas cortas, de 17 a 20 o mas artejos. Tarsos bi—o triarticulados.

Jéneros importantes: { *Cryptops*
Cormocephalus
Hemiscolopendra
Newportia
Scolopendra
Scolopendropsis

Fam. Scutigerae.—Cuerpo no muy largo. Dos ojos compuestos. Antenas muchas veces mas largas que el cuerpo i multiarticuladas. Patas largas (15 pares, jeneralmente) aumentando en longitud de adelante para atrás.

Pasan el día ocultos i corren, con mucha rapidez, por la noche.

Es notable la facilidad con que se les desprenden sus miembros (autotomía). *Scutigera* Lamk.

A los dos grandes órdenes de Miriópodos que acabamos de estudiar, se agregan dos pequeños grupos que comprenden un corto número de especies, i que se denominan *Sínfilos* i *Paurópodos*.

Diremos algunas palabras sobre cada uno de ellos:




Fig. 15.—SCUTIGERA COLEOPTRATA
(tamaño natural)




Fig. 16.—SCOLOPENDRELLA
INMACULATA

Orden 3.º: SINFILOS

Cuerpo delicado, cuyo tronco lleva pocos segmentos provistos de patas. Un solo par de tráqueas ramificadas con sus orificios externos ubicados en la cabeza. Antenas sencillas multiarticuladas. Orificio jénital único.

Estos Miriópodos tienen gran semejanza con los insectos tisanuros de la fam. Campodeidæ.

Actualmente se admiten dos jéneros que son:

Scolopendrella, (fig. 16), que habita en Francia.

Scutigereilla, con una especie chilena.

Orden 4.º: PAURÓPODOS

Fuera de la *cabeza*, consta el cuerpo de doce segmentos de los cuales once pertenecen al *tronco* i uno (el último) al *segmento anal* que posee caractéres propios. Primer segmento con sólo vestijios de patas; los demas anillos, salvo los dos últimos, con un par de patas cada uno. Antenas cortas, formadas por un pedúnculo de cuatro artejos que lleva en su estremidad dos ramas, una de las cuales tienen un largo flajelo, i la otra, dos de diversa lonjitud i un cuerpecito (*globulus*) pedunculado o nó. Dos áreas oculares (u ojos) a ambos lados de la cabeza. Dos orificios jenitales en la base del segundo par de patas. Un solo par de maxilas.




Fig. 17.—PAUROPUS FURCIFER

En la hermosa Monografía de los *Paurópodos* (véase la *Bibliografía* que damos al final) i que, apénas impresa, tuvo la amabilidad de enviarnos su distinguido autor, el doctor Hansen, aparece que el pequeño e interesante órden contiene mas de treinta especies, distribuidas en las familias i jéneros que se designan en el cuadrito que damos a continuacion:

ORD. PAUROPODA:	{	Fam. PAUROPODIDÆ:	{ <i>Stylopauropus</i> , Cook.
			{ <i>Pauropus</i> , Lubbock.
		Fam. BRACHYPAUROPODIDÆ: {	<i>Brachypauropus</i> , Latzel.
	{	<i>Eurypauropus</i> , Ryder.	
	Fam. EURYPAUROPODIDÆ:	{ <i>Tachypauropus</i> , Tömösvary.	

El primero de los jéneros tiene dos especies: *Stp. pedunculatus*, en diversos países de Europa, i *Stp. pubescens*.

El género *Pauropus* es el mas rico en especies, pues por sí solo, comprende veintiuna. Mencionaremos de ellas: *P. Huxleyi*-Lubbock, comun a toda la Europa, especie a la que debemos atribuir alguna importancia en la historia de la Entomología sistemática, por ser la primera descrita como tipo del orden, en 1867; ademas, las siguientes por ser sud-americanas: *P. robustus*, *P. intermedius* i *P. spectabilis* (Temuco, Chile); *P. ar-*




Fig. 18.—PAUROPUS SPECTABILIS. A la izquierda cabeza $\times 142$;
a la derecha, pata del último par $\times 100$

gentinensis, *P. inornatus*, *P. pygmæus* (de la Rep. Argentina) i *P. inornatus* (Paraguai). Estas siete especies, descritas en Marzo de 1902 por el doctor Hansen, fueron descubiertas por el Prof. Filippo Silvestri, que tan poderosamente ha contribuido al conocimiento de los Miriópodos de Europa i América.

El género *Brachypauropus* tiene sólo dos especies, una de Italia i otra austriaca.

Eurypauropus, tendria unas cinco especies de Europa i una de los EE. UU. de N. A., i *Tachypauropus* una esp. de Hungría.

Damos en la página siguiente un resumen de la clasificacion de los Miriópodos.

RESÚMEN DE LA CLASIFICACION DE LOS MIRIÓPODOS

Myriopoda:	{	DIPLOPODA	{	<i>Polyxenidæ</i> <i>Glomeridæ</i> <i>Polydesmidæ</i> <i>Iulidæ</i> <i>Polyzonidæ</i>
		CHILOPODA	{	<i>Geophilidæ</i> <i>Lithobiidæ</i> <i>Scolopendridæ</i> <i>Scutigерidæ</i>
		SYMPHYLA		<i>Scolopendrellidæ</i>
		PAUROPODA	{	<i>Pauropodidæ</i> <i>Brachypauropodidæ</i> <i>Eurypauropodidæ</i>

V.—Zoolojía aplicada

Ya lo dijimos al comienzo, los Miriópodos tienen sobre el hombre una influencia relativamente escasa si se la compara con la que en él ejercen otros grupos de invertebrados, v. gr. los Insectos.

Diremos sólo algunas palabras sobre el interés que tienen estos Artrópodos en *Zoolojía Médica* i en *Zoolojía Agrícola*.

A). Zoolojía Médica.—No alcanzan a 50 las especies hasta hoi acusadas, con razon, de temibles por su mordedura i por suseudoparasitismo.

Las que pueden causar daño por su mordedura, son las scolopendras de regular o gran tamaño que habitan las rejiones tropicales o vecinas a ellas, que pertenecen al órden de los Quilópodos i que entre otros caractéres poseen, como se ha visto, el de estar dotados de glándulas venenosas.

La inmensa mayoría de los Quilópodos pueden, en defensa propia, morder i depositar una pequeñísima cantidad de veneno en el hombre, al ser tomados con los dedos, pero sin otras consecuencias que el dolor e inflamacion local consiguiente, lo que puede neutralizarse con aplicaciones de amoníaco en el sitio de la mordedura. En cambio para los arácnidos, dípteros u otros insectos que les sirven de alimento, la picadura de los Quilópodos es algunas veces mortal i siempre produce a lo ménos la inmovilizacion absoluta de la víctima.

Mencionaremos, entre los Quilópodos mas o ménos peligrosos para el hombre por su mordedura:

Scolopendra gigantea (véase la lámina IV) que habita en el Asia así como en varios países de América i alcanza una longitud hasta de 25 centímetros. Su mordedura ha sido comparada, como la de otras grandes Escolopendras, a la picadura del alacrán por lo dolorosa, etc. Puede producir la muerte.

Scolopendra morsitans, especie comun en el sur de Francia i en el norte de Africa; produce hinchazon local acompañada de dolor i fiebre.

Scolopendra planipes, habita el Egipto. Su mordedura es mui temida por los habitantes del país.

Scutigera (o *Cermatia*) *forceps*, de los Estados Unidos de Norte-América, es temida por el vulgo; mas no pasa su mordedura de un fuerte dolor, un poco de hinchazon i accidentes nerviosos que dependen de la naturaleza del paciente.

Segun Blanchard (l. c.), la mordedura de un *Heterostoma* del Gabon produciría, al decir del marques de Compiègne, una fiebre intensa.

No necesitamos decir que el vulgo teme, sin razon, a casi todos los quilópodos o ciempiés, cuando en realidad, sobre todo los de los países templados i fríos, sólo son venenosos para los artrópodos que cazan para alimentarse.

Respecto a los Diplópodos, éstos tienen la boca adaptada para régimen vejetariano, i unos pocos, como vamos a verlo luego, merecen fijar la atencion de los agricultores.

Desde el punto de vista médico tienen también importancia los Miriópodos, por los casos de *seudoparasitismo* que han sido observados en la especie humana.

Los hechos que registra la literatura médica son contados i se refieren al acceso del bicho en las fosas nasales, desde donde ha podido penetrar i ha penetrado en los senos frontales i en el antro de Higmore, manifestándose su presencia por prurito, hormigueos, inflamaciones, dolores de cabeza intensos, desórdenes nerviosos los mas variados, vómitos, etc., que han durado cuatro i mas años.

Al profesor doctor RAPHAEL BLANCHARD (17) debemos una enumeración cronológica de casos típicos de *seudoparasitismo* producidos por Miriópodos.

Los casos a que se refiere el profesor Blanchard son los anotados por los siguientes autores, en los años que se espresan:

KERCKRING, 1710; SANDIFORD, 1789; BLUMENBACH, 1807; SCOUTETTEN, 1827; LEFÈVRE, 1833. LABOULBÈNE, 1867; LITTRÉ, 1870; LE ROY, 1878, i GIARD, 1880.

Las personas que se interesen en ello, pueden consultar la citada obra del eminente zoólogo Dr. Blanchard, Profesor de la Facultad de Medicina de Paris, i los autores a que él hace referencia.

También se han observado casos de ingestión accidental de Miriópodos, con el alimento, pudiendo éstos resistir algunos días i a veces hasta un mes a la acción de los jugos digestivos; en estos casos, se producen desórdenes gastro-intestinales i nerviosos.

En toda ocasión, la expulsión del miriópodo ha hecho cesar el malestar i los accidentes que su presencia había provocado.

En cierto número de casos ha podido determinarse la especie. En los anotados por Blanchard se ven representados los géneros *Scutigera*, *Geophilus*, *Iulus*, *Lithobius* i *Polydesmus*.

(17) *Zoologie Médicale*, tomo II, pájs. 409-411.

No tenemos noticia de haberse aún observado en Chile casos de introducción accidental, en el hombre, seguidos de permanencia mas o ménos larga de estos artrópodos en la economía.

B) Zoolojía Agrícola.—No dejan los Miriópodos de interesar a la Agricultura. Al lado de especies francamente útiles para ella (las especies insectívoras), existen otras que causan jeneralmente graves daños.




Fig. 19.—BLANIULUS GUTTULATUS (aumentado)
En A se ven varios individuos aislados; en B i C se observan los perjuicios en arvejas i porotos jermi-
nados.

Como el número VIII de la 1.^a serie de estos sencillos «Estudios Elementales de Zoolojía» está dedicado particularmente a considerar los Miriópodos en sus relaciones con la Agricultura (18), nos limitaremos a señalar aquí los nombres de al-

(18) Lecciones dictadas por el autor, en el Instituto Agrícola de Chile, en Abril de 1907.

gunas de las especies de mayor interes, por los perjuicios que ocasionan a las plantas, tales como:

Blaniulus guttulatus, *Iulus terrestris*, *Iulus sabulosus*, *Polydesmus complanatus*, *Craspedosoma mutabile*, etc., etc.

De Limache i Santiago hemos recibido un pequeño Miriópodo que, se dice, ataca a las raíces de algunas legumbres. No hemos tenido tiempo de estudiarlo, pero lo haremos en primera oportunidad.

Recomendamos a los señores hacendados i dueños de huertas, etc., nos envíen las especies que causen daños, conservadas en alcohol de mas o ménos 70°.

VI. — Catálogo de las especies chilenas.

Hemos llegado, en nuestro pequeño estudio sobre los Miriópodos, a la última parte, es decir, a la que tiene por objeto presentar una enumeracion sistemática — dando, al mismo tiempo, la sinonimia i el «habítat» o «localizacion» — de los jéneros i especies hasta hoi encontrados en el país.

Pero séancs ántes permitido hacer unas breves consideraciones históricas.

(1847). Las primeras noticias sobre Miriópodos de este país se deben a PAUL GERVAIS que describe 5 *Diplópodos* i 3 *Quilópodos* en el tomo IV de la obra de Walkenaer *Histoire Naturelle des Insectes Aptères*, publicada en 1847.

(1849). Al mismo naturalista GERVAIS confió los Miriópodos el célebre autor de la *Historia Física i Política de Chile*. En el tomo IV de la parte zoológica, pájinas 53-72, describe Gervais las mismas especies publicadas dos años ántes i agrega 4 *Quilópodos* más (19).

He aquí la lista de las especies que trae Gay:

(19) Recordaremos, en este lugar, que Paul Gervais describió tambien los *Miriópodos* i los Escorpiones del viaje de Castelnau a la América Meridional (Paris, 1859).

DIPLÓPODOS

Fam. *Polydesmidae*:

1. *Polydesmus Gayanus*.—*Gerv.*
2. *Strongylosoma concolor*.—*Gerv.*

Fam. *Iulidae*:

3. *Iulus chilensis*, *Gerv.*
4. *I. Gaudichaudi*, *Gerv.*
5. *I. sublevis*, *Gerv.*

QUILÓPODOS

Fam. *Lithobiidae*:

6. *Henicops chilensis*, *Gerv.*

Fam. *Scolopendridae*:

7. *Scolopendra chilensis*, *Gerv.*
8. *S. pallida*, *Gerv.*
9. *Cryptops monilis*, *Gerv.*

Fam. *Geophilidae*:

10. *Geophilus gracilis*, *Gerv.*
11. *G. millepunctatus*, *Gerv.*
12. *G. canaliculatus*, *Gerv.*

(1899). Nadie ha vuelto a ocuparse de los Miriópodos de Chile desde 1849 hasta el año de 1898. La rápida escursión llevada a cabo por el Dr. FILIPPO SILVESTRI desde el 23 de Marzo hasta el 13 de Abril de 1899—en nuestro país—ha dado un impulso vigoroso a estos estudios. El primer trabajo dado a luz despues de la publicacion de la obra de Gay, fué el que se dignó enviarnos desde Buenos Aires, el Dr. Silvestri, e₁

mismo año (1899), titulado *Contribucion al estudio de los Quilópodos chilenos* i que tuvimos el agrado de insertar en el número doble (10-11) correspondiente a los meses de Octubre i Noviembre de nuestra *Revista Chilena de Historia Natural*, páginas 141-152.



DR. FILIPPO SILVESTRI

El distinguido especialista describe allí un jénero i varias especies, nuevos para la ciencia, i algunas formas nuevas sólo para la fauna de este país.

El mismo año el DR. C. ATTEMS publicaba en Viena su interesante monografía *System der Polydesmiden*, en la cual se dan diagnosis de varias especies de Miriópodos de nuestra fauna.

(1901-1903). En estos años los Drs. ATTEMS i SILVESTRI continúan describiendo jéneros i especies nuevos; el primero estudiando las colectas hechas por los Drs. Michaelsen i Plate i el segundo lo colectado, en su mayor parte por él mismo en este país, en materia de Diplópodos (20). El profesor KRAEPELIN en su *Revision der Scolopendriden*, publicada en Hamburgo en 1903, se ha ocupado de algunos Miriópodos de Chile; otro tanto puede decirse del Dr. Attems, ya nombrado (1902-1903).

El año de 1902, el DR. J. H. HANSEN describe los primeros *Paurópodos* i, en 1903, el primer *Sínfilo*, descubiertos en nuestro país por el Dr. Silvestri.

Como se ve por esta brevísima reseña, a un silencio de 50 años ha sucedido una no interrumpida serie de exploraciones i trabajos sobre esta interesante clase de artrópodos de nuestro país, tan injustamente olvidados. Estamos seguros de que habrá mucho nuevo que descubrir, no sólo desde el punto de vista sistemático sino aun en la anatomía i biología de esta interesante clase, donde tendrán vasto campo de observacion naturalistas nacionales i extranjeros.

Segun la lista inserta a continuacion, los Miriópodos chilenos alcanzan a 34 jéneros abarcando 63 especies repartidas en los cuatro órdenes que hoi se admiten.

Debo declarar que, salvo las anotaciones sinonímicas, a partir del año 1905, i algunas de las notas de distribucion jeográfica, el siguiente *Catálogo* lo he aprovechado del Dr. Silvestri, distribuyendo las especies en las familias por él adoptadas.

(20) *Boll. Mus. Zool. Anat. Comp.* Torino, Vol. XVIII, (1903) N.º 433.

Ord. Diplopoda

FAM. POLYXENIDÆ

2. *Polyxenus chilensis*

1903. *POLYXENUS CHILENSIS*, *Silv.*, Boll. Mus. Torino, V. 18, núm. 433, p. 15.
 1905 *POLYXENUS CHILENSIS*, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 722.

El Dr. Silvestri lo encontró en *Temuco*.

2. *Polyxenus rosendinus*

1903. *POLYXENUS ROSENDINUS*, *Silv.*, Boll. Mus. Torino, V. 18, núm. 433, p. 15.
 1905. *POLYXENUS ROSENDINUS*. *Silv.*, Zol. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 722.

Habita en *San Rosendo* (Silvestri).

FAM. HETEROCHORDEUMIDÆ

3. *Eudigona chilensis*

1903. *EUDIGONA CHILENSIS*, *Silv.* Boll. Mus. Torino, V. 18, núm. 433, p. 10.
 1905. *EUDIGONA CHILENSIS*, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 724.

Se encuentra en *Coipué* (Silvestri).

4. *Apodigona abbreviata*

1903. *APODIGONA ABBREVIATA*, *Silv.*, Boll. Mus. Torino V. 18, núm. 433, p. 11.
 1905. *APODIGONA ABBREVIATA*, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 725.

Habita igualmente en *Coipué*.

FAM. STRONGYLOSOMIDÆ

5. *Pleonaraius pachyskeles*

- 1902 PLEONARAIUS PACHYSKELES, *Attems*, Syst. der Polydesmiden, Abth. 1, p. 54, tab. 3, fig. 65-68.
1905. PLEONARAIUS PACHYSKELES, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI. Heft 3, p. 725.

Se encuentra en los alrededores de *Talcahuano*.

6. *Pleonaraius omalonotus*

1903. PLEONARAIUS OMALONOTUS, *Silv.*, Boll. Mus. Torino, V. 18, núm. 433, p. 1.
1905. PLEONARAIUS OMALONOTUS, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 726.
1905. PLEONARAIUS OMALONOTUS, *Silv.*, Revista Chilena de Historia Natural, IX p. 225.

Vive en *Coipué*.

7. *Iulidesmus chilensis*

1903. IULIDESMUS CHILENSIS, *Silv.*, Boll. Mus. Torino, V. 18, núm. 433, p. 1.
1905. IULIDESMUS CHILENSIS, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 727.
1905. IULIDESMUS CHILENSIS, *Silv.*, Rev. Ch. Hist. Nat., IX p. 225.

Silvestri ha encontrado la especie en *Coipué* i *Temuco*.

8. *Semnosoma concolor* (21)

1847. STRONGYLOSOMA CONCOLOR, *Gerv.*, Ins. apt., V. 4, p. 117.

(21) El género *Semnosoma*, creado hace poco por Silvestri, tiene por tipo al *Strongylosoma concolor* Gerv. Diagnósis del nuevo género pueden encontrar nuestros lectores en la *Rev. Chil. Hist. Nat.*, año IX (1905) página 226.

1849. *STRONGYLOSOMA CONCOLOR*, *Gerv.*, in Gay, Hist. fis. i Pol. de Chile, Zool., V. 4, p. 59, Atlas zool. Myr., fig. 2.
1899. *STRONGYLOSOMA CONCOLOR*, *Attems*, Syst. d. Polyd., Abth. 1, p. 63, tab. 2, fig. 46.
1905. *SEMNASOMA CONCOLOR*, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 728.

Se encuentra desde *Puerto Montt* hasta el *Salto*.

SILVESTRI hace notar algunas pequeñas diferencias que existen en el aparato copulador entre los individuos de Puerto Montt i los de Coipué i El Salto.

9. *Semnosoma Porteri*

1903. *SEMNASOMA PORTERI*, *Silv.*, Boll. Mus. Torino, V. 18, núm. 433, p. 3.
1905. *SEMNASOMA PORTERI*, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 729.
1905. *SEMNASOMA PORTERI*, *Silv.*, Rev. Ch. Hist. Nat. IX, p. 227.

El Dr. Silvestri descubrió esta especie en *Temuco*.

10. *Semnosoma intricatum*

1903. *SEMNASOMA INTRICATUM*, *Silv.*, Boll. Mus. Torino, V. 18, núm. 433, p. 3.
1905. *SEMNASOMA INTRICATUM*, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft. 3, p. 730.
1905. *SEMNASOMA INTRICATUM*, *Silv.*, Rev. Ch. Hist. Nat. IX, p. 227.

Habita *San Vicente* (cerca de Talcahuano).

11. *Semnosoma subecarinatum*

1903. *SEMNASOMA SUBECARINATUM*, *Silv.*, Boll. Mus. Torino, V. 18, núm. 433, p. 4.

1905. SEMNOSOMA SUBECARINATUM, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 731.

1905. SEMNOSOMA SUBECARINATUM, *Silv.*, Rev. Ch. Hist. Nat. IX, p. 228.

Se encuentra en *Temuco*.

12. Semnosoma eukrates

1899. STRONGYLOSOMA EUKRATES, *Attems*, Syst. d. Polyd., Abth. 1, p. 64; tab. 2, fig. 44.

1905. SEMNOSOMA EUKRATES, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft. 3, p. 731.

El Doctor Plate encontró esta especie en *Corral*.

13. Semnosoma areatum

1899. STRONGYLOSOMA AREATUM, *Attems*, Syst. d. Polyd. Abth. 1, p. 65, tab. 2, fig. 29-31.

1905. SEMNOSOMA AREATUM, *Silv.*, Zool. Jahrb. Suppl. VI, Heft. 3, p. 731.

Encontrada como la especie anterior, por el Doctor Plate, en *Corral*.

14. Semnosoma ecarinatum

1899. STRONGYLOSOMA ECARINATUM, *Attems*, Lyst. d. Polyd., Abth. 1, p. 72.

1905. SEMNOSOMA ECARINATUM, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 731.

La especie ha sido obtenida por el Doctor Michaelsen, en *Valdivia*, i por el Doctor Plate, en *Corral*.

15. Semnosoma robustum

1899. STRONGYLOSOMA ROBUSTUM, *Attems*, Syst. d. Polyd., Abth. 1, p. 72, tab. 1, fig. 1-3.

1905. SEMNOSOMA ROBUSTUM, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 732.

Se encuentra en *Valparaiso* i *Quilpué*.

16. *Anaulacodesmus levissimus*

1899. ANAULACODESMUS LEVISSIMUS, *Attems*, Syst. d. Polyd., Abth 1, p. 100, tamb. 4, fig. 72.
 1905. ANAULACODESMUS LEVISSIMUS, *Silv.*, Zool., Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 732.

Habita *Coipué, Valdivia*, etc.

NOTA. El Doctor Silvestri da, en la páj. 733 (l. c.), la diagnóstico de una variedad (VAR. A). de esta especie, creada por Attems. *Coipué i Pitrufquen*.

17. *Anaulacodesmus carinobtusus*

1903. ANAULACODESMUS CARINOBTUSUS, *Silv.*, Boll. Mus. Torino, V. 18, núm. 433, p. 4.
 1905. ANAULACODESMUS CARINOBTUSUS, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 733.
 1905. ANAULACODESMUS CARINOBTUSUS, *Silv.*, Rev. Ch. Hist. Nat. IX, p. 228.

Habita en *Temuco*.

El Doctor Silvestri ha descrito igualmente una **variedad** de esta especie, que habita *San Rosendo*.

18. *Anaulacodesmus marmoratus*

1903. ANAULACODESMUS MARMORATUS, *Silv.*, Boll. Mus. Torino, V. 18, núm. 433, p. 5.
 1905. ANAULACODESMUS MARMORATUS, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 734.
 1905. ANAULACODESMUS MARMORATUS, *Silv.*, Rev. Ch. Hist. Nat. IX, p. 229.

El Doctor Silvestri encontró la especie en *San Vicente*.

19. *Myrmekia karykina*

1899. MYRMEKIA KARYKINA, *Attems*, Syst. d. Polyd., Abth. 1, p. 101, tab. 4, fig. 73-75.

1905. MYRMEKIA KARYKINA, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 734.

Se encuentra en *Valparaiso, Viña del Mar*, etc.

20. *Oligodesmus nitidus*

1899. OLIGODESMUS NITIDUS, *Attems*, Syst. d. Polyd., Abth. 1, p. 103, tab. 3, fig. 69-71.

1905. OLIGODESMUS NITIDUS, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 785.

El Doctor Michaelsen encontró la especie en *Valparaiso*.

FAM. POLYDESMIDAE

21. *Abatodesmus chilensis*

1905. ABATODESMUS CHILENSIS, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 735.

1905. ABATODESMUS CHILENSIS, *Silv.*, Rev. Ch. Hist. Nat., IX, p. 229.

Habita en *Coipué*.

FAM. CHELODESMIDAE

22. *Trienchodesmus gayanus* (22)

1847. POLYDESMUS GAYANUS, *Gerv.*, Ins. apt. v. 4, p. 114.

1849. POLYDESMUS GAYANUS, *Gerv.*, in Gay, Hist. fis. i pol. de Chile, Zool, v. 4, p. 58, Atlas zool. Mir., fig. 1.

1899. ODONTOPELTIS POLYDESMOIDES, *Attems*, Syst. d. Polyd., Abth. 1, p. 184, tab. 7, fig. 147.

1905. TRIENCHODESMUS GAYANUS, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 737.

En *Coipué, Valdivia, Corral*, segun Silvestri.

(22) Diagnósis del jénero *Trienchodesmus* (al que sirvió de tipo el *Polydesmus gayanus* Gerv.) puede verse en nuestra «Rev. Ch. Hist. Nat.», año IX, (1905) p. 230-231.

23. *Monenchodesmus chilensis* (23)

1903. *MONENCHODESMUS CHILENSIS*, *Silv.*, Boll. Mus. Torino, v. 18, núm. 433, p. 7.
1905. *MONENCHODESMUS CHILENSIS*, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 739.
1905. *MONENCHODESMUS CHILENSIS*, *Silv.*, Rev. Ch. Hist. Nat. IX, p. 231.

El doctor Silvestri encontró esta especie en *Talca*.

24. *Monenchodesmus Michaelseni*

1899. *ODONTOPELTIS MICHAELSENI*, *Attems*, Syst. d. Polyd., Abth., 1, p. 185, tab. 7, fig. 152.
1905. *MONENCHODESMUS MICHAELSENI*, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 740.
1905. *MONENCHODESMUS MICHAELSENI*, *Silv.*, Rev. Ch. Hist. Nat. IX, p. 232.

Se le ha encontrado en *Viña del Mar* i *Quilpué*.

25. *Monenchodesmus inermis*

1899. *ODONTOPELTIS GAYANUS*, *Attems*, Syst. d. Polyd., Abth. 1, p. 186, tab. 7, fig. 157.
1903. *MONENCHODESMUS INERMIS*, *ilv.*, in Boll. Mus. Torino, v. 18. núm. 433, p. 8.
1905. *MONENCHODESMUS INERMIS*, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 740.

Se encuentra en *Coipué*, *Valdivia*, *Corral*.

26. *Monenchodesmus monticola*

1903. *MONENCHODESMUS MONTICOLA*, *Silv.*, Boll. Mus. Torino, v. 18, núm. 433, p. 8.

(23) Diagnósis del jénero *Monenchodesmus* puede tambien consultarse en «Rev. Ch. Hist. Nat.» IX (1905) p. 231.

1905. *MONENCHODESMUS MONTICOLA*, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 741.
Cercanías del lago *Lacar*.

27. *Microporus granulatus*

1899. *MICROPORUS GRANULATUS*, *Attems*, Syst. d. Polyd., Abth. 1, p. 194, tab. 4, fig. 76-80.
1905. *MICROPORUS GRANULATUS*, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 742.

El Doctor Michaelsen descubrió esta especie en la isla *Teja* (Valdivia).

FAM. SPIROSTREPTIDAE

28. *Autostreptus chilensis*

1847. *IULUS CHILENSIS*, *Gerv.*, Ins. apt., V. 4, p. 193.
1849. *IULUS CHILENSIS*, *Gerv.*, in Gay, Hist. fis. i pol. de Chile, Zool. Vol. 4, p. 61, Atlas, Mir., fig. 3.
1903. *SPIROSTREPTUS COLLECTIVUS*, *Attems*, in Zool., Jahrb. V. 18, Syst., p. 88, tab. 7, fig. 17-19.
1905. *AUTOSTREPTUS CHILENSIS*, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 742.

En nuestras escursiones por la provincia de *Valparaiso* nunca hemos dejado de encontrar ejemplares de esta *especie*, en ninguno de los puntos que hemos recorrido. Damos, de ella, una figura orijinal, tomada de fotografía, en la páj. 40.

FAM. SPIROBOLIDAE

29. *Rhinocricus gaudichaudi*

1847. *IULUS GAUDICHAUDI*, *Gerv.*, Ins. apt., V. 4, p. 194.
1849. *IULUS GAUDICHAUDI*, *Gerv.*, in Gay, Hist. fis. i pol. de Chile, Zool., V. 4, p. 62, Atlas, Mir., fig. 5, 5a-5d.

1905. ¿RHINOCRICUS GAUDICHAUDI, *Silv.*, Zool. Jahrb. Suppl. VI, Heft 3, p. 744.

Gay dice solamente: *Chile*.

Ni esta especie ni la anterior han sido tomadas por el doctor Silvestri ni por otros naturalistas. Tampoco nos ha tocado a nosotros obtenerla en nuestras escursiones por el país.

30. *Rhinocricus sublaevis*

1847. IULUS SUBLAEVIS, *Gerv.*, Ins. apt., V. 4, p. 194.

1849. IULUS SUBLAEVIS, *Gerv.* in Gay, Hist. fis. i pol. de Chile, Zool., V. S, p. 62, Atlas, Mir., fig. 4, 4a-4e.

1905? RHINOCRICUS SUBLAEVIS, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 744.

Habita *Chile*.

FAM. CAMBALIDAE

31. *Dimerogonus chilensis*

1903. IULOMORPHA CHILENSIS, *Silv.*, in: Boll. Mus. Torino, V 18, núm. 433, p. 9.

1903. NANNOLENE NIGRESCENS, *Attems.*, in: Zool. Jahrb., V. 18, Syst., p. 90.

1904. DIMEROGONUS CHILENSIS, *Silv.*, in: Fauna Hawaüensis, V. 3, p. 324, in nota.

1905. DIMEROGONUS CHILENSIS, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 744.

Ha sido encontrada en *Coipué*.

FAM. BLANIULIDAE

32. *Nopoiulus pulchellus*

BLANIULUS PULCHELLUS, *Leach*, etc.

NOPOIULUS PULCHELLUS, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI (1905) Hef 3, p. 745.

Es una especie importada. El doctor Silvestri la ha encontrado en la Quinta Normal de Agricultura (Santiago). No sería extraño correspondan a esta especie los ejemplares que nos han remitido de Limache i Santiago (V. páj. 50).

Ord. Pauropoda

1. *Pauropus robustus*

1902. *PAUROPUS ROBUSTUS*, Hansen, Vid. Meddel. nat. Foren. Kjöbenhavn, V. 1, p. 360, tab. 2, fig. 2a-2f.

1905. *PAUROPUS ROBUSTUS*, Silv., Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft. 3, p. 746.

Esta especie como las dos siguientes habitan *Temuco*.

2. *Pauropus intermedius*

1902. *PAUROPUS INTERMEDIUS*, Hansen, Op. cit. 362, tab. 2, fig. 3a-3d.

1905. *PAUROPUS INTERMEDIUS*, Silv., Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 746.

3. *Pauropus spectabilis*

1902. *PAUROPUS SPECTABILIS*, Hansen, Op. cit., p. 363, tab. 2, fig. 4a-4h.

1905. *PAUROPUS SPECTABILIS*, Silv., Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 746.

Ord. Symphyla

1. *Scutigera chilensis*

1903. *SCUTIGERELLA CHILENSIS*, Hansen, Quart. Journ. microsc. Sc., V. 47, N. S., p. 46, tab. 3, fig. 4a-4g.

1905. *SCUTIGERELLA CHILENSIS*, Silv., Zool. Jahrb. Suppl. VI, Heft 3, p. 746.

Habita en *Temuco*.

Ord. Chilopoda

FAM. SCUTIGERIDAE

1. *Scutigera* sp.

1905. SCUTIGERA SP., *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 747.

El Dr. Silvestri ha visto una *Scutigera* en *Talca*, que no alcanzó a tomar, i recibió tambien ejemplares del *Salto*, en tan mal estado, que tampoco ha podido determinar su especie.

Yo he tenido un ejemplar de *Scutigera*, en mal estado, que recibí de *Copiapó* (Prov. Atacama), i que me dijeron corría de noche por una pared blanqueada con cal (en una cocina).

FAM. LITHOBIIDAE

2. *Lithobius* (s. s.) *platensis*

1847. LITHOBIUS PLATENSIS, *Gerv.*, Ins. apt., V. 4., p 237.
 1899. LITHOBIUS PLATENSIS, *Silv.*, in Rev. Ch. Hist. Nat., V. 3, p. 142.
 1905. LITHOBIUS PLATENSIS, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 747.

Habita en *Santiago*.

FAM. HENICOPIDAE

3. *Lamyctes inermipes*, *Silv.* var. *pacificus*.

1899. HENICOPS INERMIPES, *Silv.*, in Rev. Ch. Hist. Nat., V. 3, p. 143.
 1905. LAMYCTES INERMIPES, *Silv.*, var. PACIFICUS, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, d. 748.

Temuco, Coipué, Talca.

4. *Paralamyctes chilensis*

1847. HENICOPS CHILENSIS, *Gerv.*, Ins. apt., Vol. 4, p. 239.
 1849. HENICOPS CHILENSIS, *Gerv.*, in: Gay, Hist. fis. i pol. de Chile, Zool., v. 4. p. 65, Atlas Myr., fig. 6, 6-a, 6-b.
 1899. HENICOPS CHILENSIS, *Silv.*, in: Rev. Ch. Hist. Nat., v. 3, p. 142.
 1905. PARALAMYCTES CHILENSIS, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft. 3, p. 749.

El doctor Silvestri la ha tomado en *San Vicente*.

5. *Anopsobius productus* (24)

1889. ANOPSOBIUS PRODUCTUS, *Silv.*, Rev. Ch. Hist. Nat., v. 3, p. 143.
 1905. ANOPSOBIUS PRODUCTUS, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 750.

Habita en *Temuco*.

FAM. SCOLOPENDRIDAE


6. *Scolopendra gigantea* (Lám. IV)

El doctor Silvestri cita, con dudas, esta especie como de Chile. Nos atrevemos casi a asegurar que falta en el territorio de la República, por lo ménos de Antofagasta al Sur.

En nuestras escursiones desde Copiapó hasta Valdivia nunca la hemos encontrado ni tampoco nos la han enviado, entre otras especies, los muchos correspondientes que nos favorecen desde hace años con sus envíos.

Existe en países de la América tropical, como lo dicen el

(24) El jénero *Anopsobius*, fue creado por el doctor Silvestri en 1889, en nuestra *Revista Chilena de Historia Natural*, vol. III, páj. 143.



SCOLOPENDRA GIGANTEA, L. (Segun Brehm)

doctor Silvestri i otros autores: Brasil, Colombia, Venezuela, Trinidad, Jamaica, Méjico, Santo Tomas, etc.

7. *Hemiscolopendra chilensis*

1847. *SCOLOPENDRA CHILENSIS*, *Gerv.*, *Ins. apt.*, v. 4, p. 285.
 1847. *SCOLOPENDRA PALLIDA*, *Gerv.*, *Ins. apt.*, v. 4, p. 285.
 1849. *SCOLOPENDRA CHILENSIS*, *Gerv.* in Gay, *Hist. fis. i pol. de Chile, Zool.*, v. 4, p. 67, *Atlas Myr.*, fig. 7, 7-a, 7-d.
 1849. *SCOLOPENDRA PALLIDA*, *Gerv.*, in Gay, *Hist. fis. i pol. de Chile, Zool.*, v. 4, p. 68, *Atlas Myr.*, fig. 8, 8-a, 8-d.
 1903. *SCOLOPENDRA LONGIPLEURA*, *Silv.*, in: *Boll. Mus Torino*, v. 10, N.º 203, p. 2.
 1903. *SCOLOPENDRA CHILENSIS*, *Silv.*, in: *Rev. Ch. Hist. Nat.* v. 3, p. 144.
 1903. *HEMISCOLOPENDRA CHILENSIS*, *Kraepelin*, *Revis. d. Scolopendriden*, p. 214.
 1905. *HEMISCOLOPENDRA CHILENSIS*, *Silv.*, *Zool. Jahrb.*, *Suppl.* VI, *Heft.* 3, p. 751.

En todas nuestras escursiones en las provincias de Valparaíso i Aconcagua la hemos encontrado. Es probable correspondan a la misma especie unos ejemplares secos i en mal estado recibidos de Copiapó hace cuatro años; al ménos pertenecerian a una especie vecina. El doctor Silvestri la ha encontrado en abundancia en el sur, hasta *Talcahuano* i *Villa Rica*. Recojióla tambien en el Juncal, hasta 6,000 metros sobre el nivel del mar. Se encontraria igualmente, segun el mismo doctor Silvestri, en la República Argentina.

8. *Hemiscolopendra Michaelseni*

1903. *OTOSTIGMA MICHAELSENI*, *Attems*, in *Zool. Jahrb.* v. 18, *Syst.*, p. 97.
 1903. *HEMISCOLOPENDRA MICHAELSENI*, *Kraepelin*, *Revis. d. Scolopendriden*, p. 215.

1905. HEMISCOLOPENDRA MICHAELSENI, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 752.

Se encuentra en *Coquimbo, Valparaiso, Quilpué, Salto*, etc.

9. Hemiscolopendra Platei

1899. CORMOCEPHALUS PALLIDUS, *Silv.*, in: Rev. Ch. Hist. Nat., v. 3, p. 145.
1903. OTOSTIGMA PLATEI, *Attems*, in: Zool. Jahrb., 1. 18, Syst., p. 98.
1903. HEMISCOLOPENDRA PLATEI, *Kraepelin*, Revis. d. Scolopendriden, p. 216.
1905. HEMISCOLOPENDRA PLATEI, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 752.

Coquimbo, Valparaiso, Quilpué.

FAM. CRYPTOPIDAE

10. Cryptops monilis

1849. CRYPTOPS MONILIS, *Gerv.*, in Gay, Hist. fis. y pol. de Chile, Zool., v. 4, p. 69.
1899. CRYPTOPS MONILIS, *Silv.*, in Rev. Ch. Hist. Nat., v. 3, p. 146
1903. CRYPTOPS ABREVIATUS, *Attems*, in: Zool. Jahrb., v. 18, Syst., p. 107.
1903. CRYPTOPS MONILIS, *Kraep.*, Revis. d. Scolopendriden, p. 51.
1905. CRYPTOPS MONILIS, *Silv.*; Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 753.

Habitaria, esta especie, a lo menos desde *Valdivia* hasta *Valparaiso*.

11. Cryptops detectus

1899. CRYPTOPS DETECTUS, *Silv.*, in Rev. Ch. Hist. Nat. V 3,
p. 146.
1903. CRYPTOPS DETECTUS, *Kraep.*, Revis. d. Scolopendriden,
p. 48.
1905. CRYPTOPS DETECTUS, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft
3, p. 754.

Habita en *Temuco*.

12. Cryptops armatus

1899. CRYPTOPS ARMATUS, *Silv.*, in: Rev. Ch. Hist. Nat., V. 3,
p. 147.
1903. CRYPTOPS ARMATUS, *Kraep.*, Revis. d. Scolopendriden,
p. 49.
1905. CRYPTOPS ARMATUS, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft
3, p. 754.

Habita *Santiago*, segun Silvestri, quien la descubrió en su rápida excursion de 1899.

13. Cryptops triserratus

1903. CRYPTOPS TRISERRATUS, *Attems*, in: Zool. Jahrb., V. 18,
Syst., p. 107.
1903. CRYPTOPS TRISERRATUS, *Kraep.*, Revis. d. Scolopendri-
den, p. 53.
1905. CRYPTOPS TRISERRATUS, *Sil.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI.,
Heft 3, p. 755.

Se encuentra en *Valdivia*.

FAM. GEOPHILIDAE

14. Pachymerinus millepunctatus

1849. GEOPHILUS MILLEPUNCTATUS, *Gerv.*, in: Gay, Hist. fis.
i pol. de Chile, Zool., V. 4, p. 71, Atlas Mir., fig. 9,
9a-9d.

1899. MECISTOCEPHALUS MILLEPUNCTATUS, *Silv.*, in; Rev. Ch. Hist. Nat., V. 3, p. 148.
1903. MECISTOCEPHALUS MILLEPUNCTATUS, *Attems*, in: Zool. Jahrb., V. 18, Syst., p. 213.
1903. GEOPHILUS (PACHYMERIUM) CORRALINUS, *Attems*, *ibid.*, p. 252, tab. 14, fig. 33-38.
1905. PACHYMERINUS MILLEPUNCTATUS, *Silv.*, Zool. Jahrb., Heft 3, p. 756.

Habita desde *Temuco*, *San Rosendo* i *Valdivia*, por el sur, hasta la provincia de *Valparaiso* en la rejion central, no alcanzando al norte del país.

15. *Pachymerinus millepunctatus* (Gerv.)

1905. SUBSP. ABBREVIATUS, *Silv.*, in: Zool. Jahrb., Suppl. Heft 3, p. 757.

Se encuentra en el *Salto*.

16. *Pachymerinus canaliculatus*

1849. GEOPHILUS CANALICULATUS, *Gerv.*, in: Gay, Hist. fis. i pol. de Chile, Zool., V. 4, p. 72.
1399. MECISTOCEPHALUS MILLEPUNCTATUS, *subsp. canaliculatus* *Silv.*, in: Rev. Ch. Hist. Nat., V. 3, p. 148.
1905. PACHYMERINUS CANALICULATUS, *Silv.*, Zool., Jahrb., Heft 3, p. 758.

Vive en *Coipué*.

17. *Pachymerinus pluripes*

1899. MECISTOCEPHALUS MILLEPUNCTATUS, *Gerv.*, *subsp. pluripes*, *Silv.*, in: Rev. Ch. Hist. Nat., V. 3, p. 149.
1905. PACHYMERINUS PLURIPES, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 759.

18. *Pachymerinus Porteri*

1899. *Mecistocephalus Porteri*, *Silv.*, in: *Rev. Ch. Hist. Nat.*, V. 3, p. 149.
1905. *Pachymerinus Porteri*, *Silv.*, *Zool. Jahrb., Suppl.*, VI, Heft 3, p. 759.
- Encontró el Dr. Silvestri la especie en *Coipué* i *Temuco*.

19. *Eurytion gracile*

1849. *Geophilus gracilis*, *Gerv.*, in: *Gay, Hist. fis. i pol. de Chile, Zool.*, V. 4, p. 70.
1886. *Geophilus tenebrosus*, *Mein.*, in: *Vid. Meddle. naturh. Foren. Kjöbenhavn for 188-486*, p. 146.
1899. *Schizotaenia gracilis*, *Silv.*, in: *Rev. Ch. Hist. Nat.*, V. 3, p. 150.
1903. *Geophilus (Eurytion) moderatus*, *Attems.*, in: *Zool. Jahrb.*, V. 18, *Syst.*, p. 247.
1905. *Eurytion gracile*, *Silv.*, *Zool. Jahrb., Suppl.* VI, Heft 3, p. 762.
- Habita esta especie *Santiago* i *Quilpué*.

20. *Eurytion metopias*

1903. *Geophilus (Eurytion) metopias*, *Attems.*, in: *Zool. Jahrb.*, V. 18, *Syst.*, p. 246, tab. 14, fig. 41, tab. 15, fig. 45-47.
1905. *Eurytion metopias*, *Silv.*, *Zool. Jahrb., Suppl.* VI, Heft 3, p. 763.
- Se encuentra en *Corral* (provincia de *Valdivia*).

21. *Eurytion Michaelseni*

1903. *Geophilus (Eurytion) Michaelseni*, *Attems.*, l. c., p. 245.

1905. EURYTION MICHAELSENI, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 763.

El doctor Michaelsen encontró la especie en *Valparaiso*.

22. Pachymerium armatum

1905. PACHYMERIUM ARMATUM, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 763.

23. Schizotaenia alacer

1891. GEOPHILUS ALACER, *Poc.*, in: Ann. Mag. Nat. Hist. (6), V. 7, p. 226, tab. 12, fig. 11, 11-a.
1897. SCOLIOPLANES MAGELLANICUS, *Attems.*, in: Erg. Hamburg. Magal. Sammelr., V. 2, N.º 4, p. 4, fig. 1-4.
1899. SCHIZOTAENIA ALACER, *Silv.*, in: Rev. Ch. Hist. Nat., V. 3, p. 151.
1902. SCOLIOPLANES MAGELLANICUS, *Attems.*, in: Rés. Voyage S. Y. Belgique, Zool. Myr., p. 1, tab. 1, fig. 1-9.
1903. SCOLIOPLANES MAGELLANICUS, *Attems.*, in: Zool. Jahrb., V. 18, Syst., p. 269.
1905. SCHIZOTAENIA ALACER, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 764.

Habita en *Tierra del Fuego*.

24. Schizotaenia psilopus

1897. SCHENDYLA (SCHENDYLOIDES) PSILOPUS, *Attems.*, in: Erg. Hamburg. Magal. Sammelr., V. 2, N.º 4, p. 6.
1905. SCHIZOTAENIA PSILOPUS, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3, p. 765.

Habita en *Coipué*. Tambien en algunas partes de la Patagonia (Argentina).

25. Apogeophilus claviger

1905. APOGEOPHILUS CLAVIGER, *Silv.*, Zool. Jahrb. Suppl. VI, Heft 3, p. 766.

Se encuentra en *Santiago* (Chile).

26. Linotaenia araucanensis

1905. LINOTAENIA ARAUCANENSIS, *Silv.*, Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 4, p. 767,

Se encuentra en *Temuco*, *Pitrufquen*, etc.

FAM SCHENDYLIAE

27. Schendyla montana

1905. SCHENDYLA MONTANA, *Silv.*, Zool. Jahrb, Suppl. VI, Heft 3, p, 768.

Especie importada de Europa. El doctor Silvestri encontró ejemplares de ésta en la Quinta Normal, *Santiago*.

De las 63 especies hasta hoy encontradas en el país, sólo un *Diplópodo* es importado (*Nepoiulus pulchellus*); los *Paurópodos* i el *Sínfilo* del presente Catálogo le son propios. De los 27 *Quilópodos*, los 10 que a continuación se anotan se encuentran también en otros países, según el doctor Silvestri: *Lithobius platensis*, *Lamyctes inermipes*, *Paralamyctes chilensis*, *Scolopendra gigantea* (25), *Hemiscolopendra chilensis*, *Cryptops detectus*, *Eurytion gracile*, *Schizotaenia alacer*, *Schizotaenia psilopus* i *Schendyla montana*.

(25) Me permito dudar que esta especie exista en el territorio de la República, por lo menos desde la provincia de Antofagasta al sur (V. página 65).

VII.—Bibliografía

La literatura miriopodológica es mui escasa si se la compara no sólo con la entomológica (que es abundantísima) sino aún con la aracnológica i careinológica.

Daremos, para terminar este trabajo, una lista de las obras jenerales i especiales que pueden consultarse sobre Morfolojía, Sistemática, etc., de los Miriópodos, no sin manifestar ántes nuestros sinceros agradecimientos a muchos de los autores citados que nos han favorecido obsequiándonos, desde hace años, con sus interesantes producciones.

Los autores, cuyos nombres van subrayados son los de quienes hemos tomado el mayor número de datos para la confeccion del presente opúsculo.

Los trabajos señalados con *asterisco* son los que no hemos tenido a la vista i que, al hacerlos figurar en este capítulo, los hemos tomado de las citas que encontramos en las obras de M. M. Perrier, Blanchard, Dubosq, así como en la sobresaliente de Vogt i Yung, con el objeto de prestar un servicio mayor a los interesados en el estudio de los Miriópodos.

Adensamer T.—Zur Kenntnis der Anatomie des Auges von *Scutigera coleoptrata*, Wien, 1893.

Atems, C.—Die Copulationsfüsse des Polydesmiden.

Id.—Myriapoden, Hamburg. Magalh. Sammelreise, 1897.

* **Id.**—System des Polydesmiden, Wien, 1899.

Wien, 1894.

Berlese, A.—Acari. Myriopoda et Scorpiones huc usque in Italia reperta. Fascic. 1 79, Patav. 1882-96.

Id.—Sulla sistem. dei Chilognati del Museo zoológ. di Padova. I. Julidae, Venezia, 1884.

Id.—Julidi d. Museo di Firenze. Contrib. alla Fauna Miriapodolog. Ital. (Firenze), 1886.

- Blanchard, E.**—Iconographie des Myriopodes et Thysanoures, Paris, 1849.
- Blanchard, Raph.**—Traité de Zoologie médicale. Paris, 1890.
- Blanchard, R.**—Pseudo-parasites. Diction. encyclop. des sc. méd., 1889.
- Bollman, C. H.**—The Myriapoda of North-America, Wáshington, 1893,
- Borres, A. P. de.**—Notes sur les Julides de la Belgique. Bruxelles, 1884.
- Bourne, G. C.**—On the anatomy of Sphaerotherium, Lond., 1885.
- * **Brandt, J. F.**—Recueil d. mem. relat. à l'ordre des Myriapodes, Petersb., 1841.
- Brolemann, H. W.**—Contrib. à la Faune Miriapodol. méditerran. Lyon, 1889-94.
- Bachelier, L.**—La Scolopendre et sa piquêre. Des accidents qu'elle détermine chez l'Homme. Thèse de Paris, 1887.
- * **Blumenbach, F.** — Geschichte und Beschreibung der Knochen. Göttingen, 1807.
- Boas, J. E. V.**—Lehrbuch der Zoologie. Jena, 1901.
- * **Bode, J.** — Polyxenus lagurus, Beiträge sur Anatomie, Morphologie und Entwicklungsgeschichte der Chilognathen, Halle, 1888.
- Bollmann H., Charles.**—A Preliminary List of the Myriapoda of Arkansas. Little Rock, 1888.
- * **Carrade, L. R. E.**—Contribution à la géographie médicale. Le poste de Podor (Sénégal). Bordeaux, 1885-86.
- Castelli, G.**—Note intorno un caso di presenza di Geofili nelle cavità nasali dell'uomo. Giornale della R. Accad. di Med. di Torino, XXXII, 1894.
- Chalande, J.**—Sur l'appareil respirat. des Chilopodes, Toulouse, 1885.

Id.—«Recherches sur les Miriopodes du Sud-Ouest de la France». Toulouse, 1905.

Cook and Collins.—Notes on N. America. Geophilidae. Wash., 1891.

Chatin, J.—Eléments d'Anatomie comparée, Paris.

Id.—Observations sur les origines de l'artère récurrente chez les Myriapodes, Bull. Soc. Philomat., t. VII, 1883.

Claus, C.—Zoología, Ed. española. Barcelona, 1890.

Curtis, J.—The Myriapod Cermatia, poisonous. American Naturalist, VIII, 1874.

* **Compiègne, M. de**—L'Afrique équatoriale, Paris, 1875.

Duboscq, O.—La Glande venimeuse de la Scolopendre, Paris, 1894.

Duboscq, O.—Recherches sur les Chilopodes, Paris, 1899.

Duvernoy, G. L.—Sur les organes de génération des Myriapodes, des Crustacés, des Scorpions et des Céphalopodes, Paris, 1853.

Dufour, Leon.—Recherches anatomiques sur les Lithobius forficatus et la Scutigera lineata, Ann. scienc. natur, t. II, Paris, 1824.

Eydoux et Gervais.—Myriapodes rec. pendant le voyage de la *Favorite*, Paris, 1837.

Favre.—Recherches sur l'anatomie des organes reproducteurs et sur le développement des Myriapodes. Ann. sc. nat. t. III. 1855.

Faes, H.—Myriopodes du Valais, Genève, 1902.

Gay, Claudio.—Historia Física i Política de Chile, *Zoología*, Tomo IV. Paris, 1849.

Gegenbaur, Carl.—Elements of Comparative Anatomy. London, 1878.

Gadeau de Kerville, H.—Les animaux et les végétaux lumineux, Paris, 1890.

Id.—Les Myriapodes de la Normandie, Rouen, 1884.

- Gervais, P.**—Myriapodes et Scorpions rec. dans l'Amérique mérid. p. F. de Castelnau, Paris. 1859.
- Gilson, G.**—Étude comparée de la spermatogénèse chez les Arthropodes. En la Cellule, Recueil de Cytologie et d'Histologie générale, t. I.
- Grassi, B.**—Intorno all'anat. della Scolopendrella, Catania, 1884.
- Id.**—I progenitori degli Insetti e dei Miriapodi. Morfologia delle Scolopendrelle. Atti dell'Accad. delle scienze di Torino, XXI, 1886.
- Groult, Paul.** - Acariens, Crustacés et Myriapodes de la France. Paris, 2887.
- Giard, A.**—Note sur l'existence temporaire de Myriapodes dans les fosses nasales de l'Homme, suivie de quelques réflexions sur le parasitisme inchoatif. Bull. scientif. du département du Nord, (2), III, 1880.
- Gazagnaire, J.**—La phosphorescence chez les Myriopodes, Bull. de la Soc. zool. de France, XIII, 1888.
- Grenacher.**—Ueber die Augen einiger Myriapoden, Archiv. f. mikrosk. Anat. t. XVIII, 1880.
- * **Haase, Erick.** — Das respirationssystem der Symphilen und Chilopoden, Zoolog., t, 1, 1884.
- Hansen, H. J.** — On the genera and species of the order Pauropoda. Copenhagen, 1902.
- Heathcote, F. G.**—The early development of *Julus terrestris*, London, 1886.
- Id.**—The post-embryonic development of *Julus terrestris*, London 1888.
- * **Herbst, C.**—Anat. Untersuch. d. *Scutigera coleoptrata*. Jena, 1889.
- Heymons, R.**—«Mitteilungen über die Segmentirung und den Körperbau der Miriopoden, Berlin 1897. (Hai un extracto de este trabajo hecho por el Dr. O. Dubosꝓq.)

- Hers, (B. d').**—Thèse zoologico-médicale. Venins, Thèse de Montpellier, 1843.
- Humbert, Alois.** — Études sur les Myriapodes, Archiv. Sénatur., Genève, 1882.
- Humbert et Saussure.**—Descr. des Polydesmides du Musée de Vienne, Vienne, 1869.
- Hertwig, R.**—Lehrbuch der Zoologie. (traducción inglesa, Londres, 1903).
- Kunckel d'Herculais, J.**—«Les Insectes, les Myriopodes et les Arachnides», 2 tomo 8.º de la colección «Merveilles de la Nature», Paris.
- Kenyon, F. C.**—Morphol. and classification of the Pauropoda, with notes on the morphol. of the Diplopoda, 1895.
- Koch, C. L.**—System d. Myriapoden. Regensb. 1847.
- Íd.**—Die Myriapoden, Halle, 1863.
- * **Karlinski.**—Ueber die Giftdrüsen in den Kieferfüßen der Lithobiidae, «Kosmos» de Lemberg, 1883.
- * **Kerckring, Th. A.**—Opera omnia. Lugduni Batavorum, 1717.
- Kraepelin, K.**—Revision der Scolopendriden. Hamburg, 1903.
- Krug, H.**—Beiträge zur Anatomie der Gattung Julus. Jena, 1907.
- Lang, Arnold.**—Traité d'Anatomie comparée et de Zoologie, tome I, Paris, 1893.
- Lankester, E. Ray.** —The structure and classification of the Arthropoda. Vol. 47 of «Quarterly Journ. of microsc. Sc.» (1904); Appendix, pp. 577-582. pl. 42.
- Latzel, R.**—Die Myriopoden d. Oesterr.-Ungar. Monarchie, 1880.
- Leach, W. E.**—New arrangement of the Crustac., Myriapoda a. Arachn. London, 1815.
- Lubbock, J.**—On Pauropus, a new type of Centipede. London, 1868.

- Lucas, H.**—Hist. nat. d. Crustac., d. Arachnides et d. Myriap. Paris, 1842.
- Laboulbène, Al.**—Faux parasitisme d'une espèce de Myriapode, le *Blaniulus guttulatus*. Comptes rendus de la Soc. de biologie, 1882.
- Id.**—Sur un *Geophilus electricus* trouvé dans le corps humain, Ann. de la Soc. entomol. de France, VII, 1867.
- * **Littre.**—Histoire de l'Académie des sciences, 1870.
- Lefèvre, Al.**—Annales de la Soc. Entomol. de France, II, 1833.
- * **Le Roy, J. J.**—Mededeeling over *Arthronomalus similis* Nerop. Tijdschrift der nederl. dierkundige Vereeniging, III, 1878.
- Mattozo, F. S.**—Myriapodes d'Afrique au Mus. de Lisbonne. I. Lisb., 1881.
- * **Metschnikoff, E.**—Embriologie der Chilognathen, Leipzig, 1873.
- * **Id.**—Embryologisches über *Geophilus*, Leipzig, 1874.
- Mac-Leod, J.**—Recherches sur l'appareil venimeux des Myriapodes chilopodes. Bull. de l'Acad. de Belgique, 1878.
- Meinert, Fr.**—Caput Scolopendreae: the head of the Scolopendra and its muscular system, Copenhagen, 1883.
- * **Id.**—De formeentlige Aandetratsredskaber vg. deres Mundiger (Stomata) hos Slægten *Scutigera*, Meddel. Nat. For. Kjöbenhavn, 1883.
- Newport, G.**—On the organs of reproduction and the development of the Myriapoda, London, 1841.
- Id.**—Monogr. of the class. Myriapoda, order Chilopoda, London, 1844.
- Id.**—On the structure, relations and development of the nervous and circulatory systems, 1843.
- Id.**—On the reproduction of lost parts in Myriapoda and Insecta, *ibid.*, 1844.

- Nuove Relazioni** intorno ai lavori della R. Stazione di Entomologia Agraria di Firenze.—Serie Prima, núm. 4.º, Firenze, 1902.
- Packard, A. S.**—Scolopendrella and its position in nature, Philad. 1881.
- Perrier, Edmond.**—Traité de Zoologie, Paris, 1893.
- Perrier, R.**—Eléments d'Anatomie comparée, Paris, 1893.
- Pórter, Carlos E.**—Curso de Zoolojíaajeneral, Agrícola e industrial. (Enprensa).
- Id.**—«Memorándum de Zoolojía» Valparaiso, 1899-1900.
- Plateau, F.**—Matériaux pour la Faune Belge des Myriapodes. Bruxelles, 1872.
- Id.**—Myriapodes de la Belgique. Bruxelles, 1876.
- Id.**—Recherches sur les phénomènes de la digestion et sur la structure del'appareil digestif des Myriapodes. Mém. Acad., t. XLII, 1876.
- Id.**—Recherches expérimentales sur la vision chez les Arthropodes, Bruxelles, 1887-88.
- Pocock, R. J.**—Contrib. to our knowl. of the Chilopoda of the West Indies, London, 1893.
- * **Passerini.**—Sull'organo ventrale del Geophilus Gabrielis, Bollet. Soc. Entomol. Italiana. Anno 14. 1882.
- Prenant.**—Obs. cytol. sur les éléments séminaux de Scolopendra morsitans et du Lithobius forficatus, ibid., t. III.
- Revista Chilena de Historia Natural.**—Publicacion bimestral ilustrada, dedicada al cultivo i fomento de las Ciencias Naturales en Chile. Fundador i director: C. E. Pórter. Años I (1897), III (1899) i IX (1905).
- Raillet, A.**—Traité de Zoologie Médicale et Agricole. 1 vol. en 8.º Paris, 1905).
- Roule, Louis.**—L'Embryologie comparée, Paris, 1894.
- Riley, C. V.**—On the Insecta, Arachn. and Myriap. of West Africa. Washington, 1893.

- Rooms.**—Observation d'accidents morbides produits par la présence de Myriapodes chez un jeune garçon. Arch. méd. belges, XXVIII, 1885.
- Ryder, J. A.**—Scolopendrella as the type of a new order of Articulates (Simplyla). American Naturalist, XIV, 1880.
- Id.**—The structure, affinities and species of Scolopendrella. Proceed. Acad. nat. sc. of Philadelphia, 1881.
- Sinclair, F. G.**—«Myriapods» in The Cambridge Natural History».—Vol. V, pp. 29-80. London 1895.
- * **Id.**—New mode of respiration in the Myriapoda. London, 1892.
- * **Sandiford, Ed.**—Observationes anatomo-pathologicæ. Lugduni Batavorum, lib. III, 1789.
- * **Scoutetten,**—Hémicrânie due à la présence d'une Scolopendre dans les sinus frontaux. Comptes rendus des travaux de l'Acad. des sc. méd. de Metz, 1827.
- Soulié, H.**—Appareil venimeux et venin de la Scolopendre. Esquisse anatomique, physiologique et pathologique. Thèse de Montpellier, 1885.
- * **Stein.**—De Myriapodum partibus genitalibus. Arch. de Müller, 1842.
- Sébastienany.**—Piqûre de la Scolopendre mordante. Gazette des Hôpitaux, 1870.
- Saussure, H. de.**—Sur la fam. des Polydesmides, principal. au point de vue d. espèces améric. Diagnose de div. Myriap. nouv. Leipsic, 1858.
- Id.**—Essai d'une faune des Myriapodes du Mexique. Genève, 1880.
- Saussure (H. de) et Humbert.**—Etudes sur les Myriapodes du Mexique et de l'Amérique centr., avec catal. gén. des Myriap. Améric. Paris, 1878.
- Scudder, S. H.**—On the carbonif. Myriapods in the Sigil

- larian stumps of Nova Scotia, w. suppl. note. Bost. 1873-75.
- Id.**—On carbonif. Myriapods of N. Scotia and on Euphorbia. 2 mem. 1874-81.
- Id.**—Review of our Knowledge of fossil insects, incl. Myriapods and Arachnids. Wash., 1886.
- Silvestri F.**—Chilopodi e Diplopodi racc. nell'America merid. Genova, 1885.
- Id.**—Chilopodi e Diplopodi d. Paraguay et dell'Argentina, Torino, 1895.
- Id.**—Alcune norme per la raccolta dei Miriapodi. Siena, 1905.
- Id.**—Diplópodos, Quilópodos en *Rev. Ch. de Hist. Natural.*
- Id.**—Miriapodi in Zool. Jahrb. Suppl. VI. Heft 3, 1905.
- Tömösvary, E.**—Beitr. z. Kenntn. d. Myriapoden Ungarns. Budapest, 1879.
- Id.**—Eigenthümliche Sinnesorgane der Myriapoden, Mitth. naturw. Ber. Ungarn, t. I, 1882.
- ***Id.**—Ueber den Bau der Spinndrüsen der Geophiliden, *ibid.*, t. II, 1884.
- Tiedemann, Fr.**—Von lebenden Würmern und Insecten in den Geruchs Organen des Menschen. Gesellschaft für Natur. und Heilkunde, 1844.
- Vogt et Yung**—*Traité d'Anatomie comparée pratique*, t. II, Paris, 1894.
- Verhoeff, C.**—Beitr. z. Kenntn. d. Glomeriden. Bonn, 1895.
- Voges, E.**—Beiträge zur Kenntniss des Juliden, *Zeitschr. f. wissensch. Zool.*, t. XXXI, 1878.
- Id.**—Das Respirationssystem der Scutigeren, *Zoolog. Anzeiger*, 5. Jahrg., 1882.
- Walckenaer et Gervais.**—*Histoire Naturelle des Insectes Aptères*, t. IV, Paris, 1847.
- Weber, M.**—Ueber eine Cyanurasserstoffsäure bereitende Drüse. *Archiv f. mih. Anatomie*, XXI, 1882.

- Wood, H. C.**—On the Chilopoda of N. America, w. catal. of the specimens in the coll. of the Smithson. Philad., 1862.
- Id.**—The Myriapoda of N. America, Philad., 1863.
- Wood-Mason, J.**—Notes on the structure. postembryonic development and systematic position of Scolopendrella. Annals and Magasin of Nat. History, XII, 1883.
- Zograf, N. de.**—Anatomie du Lithobius forficatus. Travaux du mus. Zool. Univ. t. 1, Moscou, 1880.
- Id.** — Der Bau der Augen bei den Tausendfüßen. Zoolog. Anzeiger, 4 Jahrg, 1881.
- Id.**—Sur le Système nerveux central du Lithobius forficatus, Soc. des amis de la nature de Moscou, 1881.

LISTA DE LAS FIGURAS INTERCALADAS

- FIG. 1.^a Scolopendra morsitans (Segun CUVIER).
- » 2.^a Gancho venenoso de Scolopendra (Seg. DUBOSCQ).
 - » 3.^a Sistema nervioso de un Miriópodo (Seg. R. PERRIER).
 - » 4.^a Organo de Tömösváry de un Glomeris (Seg. BERLESE).
 - » 5.^a Organos jenítales de la Scolopendra (Seg. FAVRE).
 - » 6.^a Iulus maximus, como ejemplo de Diplópodos (Seg. CUVIER).
 - » 7.^a Piezas bucales de un Iulus (Seg. LATZEL).
 - » 8.^a Cabeza, etc., de Polydesmus (Seg. LATZEL).
 - » 9.^a Glomeris marginata (Seg. BLANCHARD).
 - » 10. Polydesmus toltecus (Seg. SAUSSURE).
 - » 11. Autostreptus chilensis (PORTER, «Memorandum de Zool.», orij.)
 - » 12. Aparato bucal de Scolopendra morsitans (Seg. R. HERTWIG).
 - » 13. Geophilus electricus (Seg. P. GROULT).
 - » 14. Lithobius forficatus (Seg. BLANCHARD).
 - » 15. Scutigera coleoptrata (Seg. CUVIER).
 - » 16. Scolopendrella immaculata (Seg. LATZEL).
 - » 17. PAUROPUS SPECTABILIS (Seg. HANSEN).
 - » 18. PAUROPUS FURCIFER (EMERY, Seg. BERLESE).
 - » 19. Blaniulus guttulatus (Seg. R. FLORENTIN).

