

DESCRIPTION DE TROIS CHALCIDIDÆ DU CHILI

PAR

Jean BRÈTHES

Entomologiste au Musée National (B. Aires)

Anagyrus? *chilensis* BRÈTHES, n. sp.

♀ *Niger*; *capite* (*macula clypei et margine postico capitis nigris*) *pronoto margine postico et pleuris totis aurantiacis*; *scapo linea angulosa apicali, pedicello apice albis* (*cetero antennarum deest*); *pedibus testaceis*; *alis hyalinis*. *Long.: 2 mm.*

La tête est finement chagrinée, les yeux à bord interne parallèle. Les antennes ont le scape développé en lamelle antérieure comprimée. Les ocelles forment un triangle équilatéral. Le pronotum est transverse, court; il est chagriné comme la tête et le mésonotum. Ils portent des poils courts, blanchâtres, de même que le scutellum et les axilles; celles-ci sont séparées à la ligne médiane. Le scutellum est un peu plus long que large. L'abdomen est sessile, à peu près de la longueur du thorax, en triangle allongé comprimé (peut-être de structure différente dans la vie). Les ailes sont hyalines; les veines sous-costale, marginale, post marginale et stigmale mesurent respectivement 740, 60, 40 et 80 microns.

Comme il manque les antennes à partir du pédicelle, je ne puis assigner la place générique que d'une manière douteuse. D'autres envois me permettront peut-être de fixer ce point.

Un exemplaire de Santiago, recueilli par Mr. le Dr. Carlos E. Porter, en Janvier 1914.

Megastigmus Porteri BRÈTHES, n. sp.

Niger, viridi vel cupreo-nitens, pedibus testaceis, sed femoribus posticis viridibus; alis hyalinis. Long.: ♀ 3 mm. Terebra: 1,4 mm.—♂ 2 mm.

La tête et le thorax sont chagrinés, assez opaques, les ocelles presque en ligne droite. De fins poils blancs couvrent le thorax; les lignes parapsidales sont bien marquées; les axilles assez éloignées entre elles derrière le mésonotum. Le scutellum est plus long que large avec une ligne enfoncée transverse avant l'extrémité; après cette ligne transverse le chagriné est longitudinal: une ligne de fovéoles à son extrémité. Le segment médiaire a une carène médiane longitudinale et des stries également longitudinales. L'abdomen est ovale-allongé, le premier segment plus long que les autres réunis. Il est lisse avec un chagriné très fin.

Le ♂ est semblable à la ♀, si ce n'est son teint vert plus gai, moins foncé est sa taille moindre.

Santiago, X 1914.—C. E. Porter leg.

Eudecatoma opposita BRÈTHES, n. sp.

♀ *Nigra, obscure viridis; genibus, tibiis apice (tibiis anticis totis) et tarsis testaceis; alis hyalinis. Long.: 2-2,2 mm.*

La tête est pontuée-ombiliquée, avec les espaces chagrinés, et des poils blancs et courts aux points ombiliqués. Les mandibules ont trois dents mousses. Les antennes ont le scape cylindrique, le pedicelle obovoïde, le premier article du funicule cylindrique, un peu plus long que l'article suivant, les articles 2-5 subégaux, aussi longs que larges, la massue ovoïde, 3-articulée, les articles peu distincts entre eux, mais chaque article à peu près de

la grosseur des antérieurs du funicule. Long. des articles: 200, 80, 10, 80, 70, 70, 70, 65, 80, 60, 60 microns. Le thorax, comme la tête, a des points ombiliqués épars, avec les espaces chagrinés. L'écusson surplombe légèrement le postécusson qui est vertical et marqué de points enfoncés. Le segment médiaire est oblique, presque vertical et uniformément chagriné. L'abdomen, qui est pratiquement sessile, est lisse, avec un chagriné presque imperceptible au microscope, et avec des poils blanchâtres vers son extrémité. Les ailes sont hyalines, les veines marginale, postmarginale et stigmale mesurent respectivement 180, 200, 190 microns.

Quelques exemplaires recueillis à Santiago, X, 1914 par le Dr. C. E. Porter.

