

## DESCRIPCIÓN DE UNA NUEVA LABIADA CHILENA

P O R

R. P. Félix JAFFUEL

**Sphacele Lindleyi**, BENTH. var. **Costesi** JAFFUEL

*S. fructicosa*, fragrans, multipliciter ramosa, ramis prismaticis, recentioribus plus minusve quadratis, tomentosis, procumbentibus simulque erectis, circiter 1 m. erectis; foliis petiolatis, oppositis, ovato-lanceolatis, obtusis, mucronatis, margine paulisper subduplicatis, desuper rugosis et sulcis sinuosis reticulatis, subtus tomentosis, basi subcordatis vel hastato-cordatis, cinerescentibus; petiolo tomentoso, foliis brevioribus; bracteis sessilibus, ovatis, calyce brevioribus; calyce campanulato, persistente, quinquefido, *virido-cinerecente*, id est, foliis colore simillimo, laciniis tubo brevioribus; corolla *alba nitida*, 2-2, 3 cm longa. Flores apparent jam ab Augusto mense et exstant plus minusve usque ad Martium.

In praedio dicto «Quebrada Verde», prope Valparaíso, legi.

\*  
\* \*

Hasta ahora se han descrito tres especies chilenas del género *Sphacele*; a saber: *S. Lindleyi* BENTH.,

*S. subhastata* BENTH., *S. campanulata* BENTH.

Al dar a conocer la descripción de esta nueva Labiada, lo hacemos con la duda de si debemos separarla en absoluto de *S. Lindleyi*, o si la debemos considerar como una simple *variedad* de la misma; creemos sin, embargo, más acertado lo segundo. De todos modos, como *variedad*

se distingue netamente de ella por dos caracteres muy visibles: el color blanco de la corola y el color blanco-ceniciento del cáliz y del pedúnculo; *S. Lindleyi* tiene la corola purpúreo-morada y el cáliz con un tinte morado-negrusco más o menos pronunciado; la variedad *Costesi* es planta escasa, vive socialmente con *S. Lindleyi*.

La siguiente clave facilitará la determinación de las especies chilenas de *Sphacele*.

I. *Verticilos 4-6 floros:*

- a) Corola purpúreo-morada.....*S. Lindleyi*
- b) Corola blanca.....*S. Lindleyi*, var. *Costesi*

II. *Verticilos bifloros. Corolas azules:*

- a) Láminas largamente atenuadas en el pecíolo.....*S. campanulata*
- b) Láminas con la base acorazonada-aflechada.....*S. subhastata*

Dedico con especial agrado la variedad descrita, a mi sabio colega el R. P. Nataniel Costes, SS. CC., cuya ilustración es ventajosamente conocida y a cuyo esfuerzo y entusiasmo se debe, además de sus publicaciones propias sobre Ciencias Naturales, el descubrimiento de los Musgos de Marga-Marga descritos en esta misma «Revista» (pp. 6 - 37) por el eminente briólogo señor I. Thériot.

VALPARAÍSO, Octubre de 1916.

