

**SOBRE ALGUNOS HONGOS CHILENOS**

COLECCIONADOS POR EL PROF. J. A. CAMPO

POR

**Carlos SPEGAZZINI**

A mediados de 1916 tuve la agradable sorpresa de recibir un paquete de macromicetos chilenos, debidos a la amabilidad y reconocida actividad del señor J. A. Campo, respondiendo a la enérgica propaganda que efectúa el incansable Dr. C. E. Porter en beneficio de la ilustración de todo lo que atañe a las Ciencias Naturales de Chile. Desgraciadamente ocupado en tareas laboulbeniológicas no pude ni quise distraerme, y por lo tanto he tenido que demorar hasta ahora la publicación del material que se me había brindado y pido la consiguiente disculpa tanto al señor Prof. Campo como al amigo Dr. Porter.

La colección se componía de 34 números recogidos sobre ramas y troncos muertos en los alrededores de Victoria (Mariluán) pertenecientes todos al grupo de los Himenomicetos de tipo coriáceo, representando en conjunto 7 especies, de las cuales 3 aún no habían sido mencionadas como inquilinas de Chile.

***Lenzites flaccida* (BLL.) FR. (número 9)**

Especie muy elegante coriácea de sombreros semidiscoïdales subconquiformes, superiormente grises pasando casi al blanco hacia los bordes, con numerosos surcos concéntricos entre cerdosos y aterciopelados: las laminillas

inferiores numerosas delgadas tenaces anchas y más o menos laceradas son de color blanco amarillento. Es cosmopolita, pero nueva para Chile.

**Chaetoporus tabacinus** (MNTGN.) (número 32)

Otra linda y elegante especie ya descrita y figurada por Montagne en la obra del Gay (Bot. vol. VII, pág. 361, lam. 7 fig. 6). Los ejemplares que tengo a la vista difieren de la descripción y figura mencionadas por su borde redondeado y obtuso pero concuerdan en todos los demás caracteres.

**Polystictus velutinus** FR. (número 8)

Especie cosmopolita que aun no había sido mencionada de Chile. Se asemeja bastante a ciertas formas del que sigue, apartándose por el mayor espesor de su sombrero y por la vellosidad característica del mismo.

**Polystictus versicolor** FR.

Especie también cosmopolita y ya conocida de Chile (Mntgn, in Gay, Bot. vol. VII, pág. 362); es sumamente polimorfa ofreciendo una variabilidad extrema en cuanto a tamaño, forma, espesor y coloración del sombrero como también a los tubitos del himenio.

**Polyporus sanguineus** L. (número 6)

Otra especie aún no indicada de Chile a pesar de ser también cosmopolita; como los anteriores es muy variable de tamaño y forma, pero es fácilmente reconocible por su color escarlata.

---

**Hymenochaete tabacina** (Sw.) (número 10)

Especie también cosmopolita ya mencionada para Chile en la obra del Gay (Bot. vol. VII, pág. 379) bajo el antiguo nombre de *Stereum tabacinum* Fr.

**Stereum amoenum** LÉV. (números 26 y 28)

Montagne cita también la especie, (Gay, Bot. vl. VII, pág. 378) que ha sido hallada en casi todas las partes del globo.

LA PLATA, 14 de Junio 1917.

