

COLOMBÍDEAS DEL VALLE DE MARGA-MARGA

POR EL

R. P. Nataniel COSTES

Doy comienzo con esta breve nota sobre las Colombídeas, a la publicación en esta «Revista» de los apuntes que he tomado durante algunos años sobre las aves del *Valle de Marga-Marga*. Y para que estos puedan prestar un interés mayor, agregó la principal sinonimia que sigue a continuación del nombre que le corresponde llevar a la especie según el sabio ornitólogo Dr. Dabbene, del Museo Nacional de Buenos Aires.

Familia: COLUMBIDÆ

GÉNERO: COLUMBA LINN.

***Columba araucana* LESSON, 1826.**

Columba Araucana LESSON, Voy. Coquille Zool. I, 1826, 706, atlas, Birds, Pl. X L.

Columba Fitzroyi, KING Proc. Zool. London, 1830, 15.

Columba denisea, TEMM. Pl. Col. I, 502.

Columba araucana GAY, Fauna chilena, aves 376.

Columba araucana JOHN CASSIN The U. S. astronomical expedition to the southern hemisphere during the years 1849—52—Birds Vol. II. pág. 190.

Columba araucana RODOLFO A. PHILIPPI, Zoología chilena: Catálogo de las aves chilenas existentes en el

Museo Nacional de Santiago, formado por su director R. A. P. Anales de la Universidad de Chile, Agosto de 1868, t, XXI pág. 267 N.º 114.

Columba araucana. JAMES New list of Chilean Birds (1892).

Columba araucana TEMM-MARTENS (G. H.) en Hamb. Magh. Lamm. 1900 pág. 13.

Columba araucana LESS. DABBENE Ct. Sist. Aves Arg. en an. Mus. Nac. Buenos Aires, Ser. Cat. B. B. Mus XXL. 273.

Nombre vulgar: *La Torcaza*

«El color de esta ave es rojizo obscuro; la parte superior del cuello ostenta una media luna plateada a la que sigue un ancho collar verde dorado. Las alas son negras, la cola del mismo color, pero terminada por dos fajas trasversales negras y blanquizas».

En las quebradas boscosas, donde abundan el belloto (Bellota Miersi) el lingue (Persea lingue), el petra (Temu divaricatum) allí escogen sus dormitorios en las ramas horizontales. Se juntan en el invierno en grandes bandadas, pero viven de a pares en el verano para formar sus nidos rudimentarios sólo con ramitas secas. El lecho del nido es aplanado, casi trasparente. La paloma torcaza incuba durante veinte días dos huevos blancos. Los polluelos al salir del cascarón están cubiertos de un plumón ralo amarillo. Los primeros días reciben de sus padres un líquido albuminoideo, y poco a poco lo mezclan con semillas maceradas en el ingluvio (buche) durante algún tiempo. La cría abandona el nido cuando las plumas han llegado a su completo desarrollo para un vuelo rápido y sostenido. La baya del peumo, del lingue, del petra y del arrayán son sus alimentos preferidos en los bosques. Busca en el llano la semilla del cardo, del yuyo, del quilo

(*Muehlenbeckia sagittae-folia*). Causa perjuicio en las siembras de trigo y cebada. A orillas de los arroyos y de las vegas se les vé comer con avidez: el berro (*Cardamine nasturtioides*) y las yerbas que forman cojines en las vertientes. Durante los meses de Enero y Febrero revisa los coligües (*Chusquea coleu*) para alimentarse con sus semillas, que es parecida al alpiste. Su arrullo es triste y monótono, jujúú, jujúú.

Ciertos años durante el invierno, pero sin que sea posible decir cuales, aunque preferentemente en los lluviosos aparecen bandadas de varios miles en el valle. En 1898 y 1899 los coligües (*Chusquea coleu*) florecieron con extraordinaria uniformidad en Marga-Marga. Aquellos años las torcazas fueron excepcionalmente abundantes tanto en verano como en invierno. (Revista Escolar 1909. Un habitante de las selvas chilenas por Ives).

GÉNERO: **METRIOPELIA** Bp.

***Metriopelia melanoptera*. MOL.**

Zenaida boliviana. GRAY, GAY, p. 379 et.

Columba melanoptera (Gm.) RODULFO A. PHILIPPI, Zoología chilena. Catálogo de las aves chilenas existentes en el Museo Nacional de Santiago, formado por su director R. A. P. Anales de la Universidad de Chile. Agosto 1868 pág. 268.

Columba boliviana. D'ORBIGNY Y LAP. Lám. 75.

Metriopelia melanoptera (MOL.) JAMES. New list of Chilian Birds (1892).

Metriopelia melanoptera (MOL.) DABBENE, Cat, Sists Aves Arg. in. an. Mus. Nac. Buenos Aires, Ser. III, 44, XI (1910), pág. 192, N.º 38. Cat. B. B. Mus. XXI, 497.

Nombre vulgar: *Tortolita cordillerana*.

Frecuenta los llanos solitarios cubiertos de arbustitos y de pastos donde busca las semillas de las gramíneas.

A menudo se le ve a orillas de los riachuelos de poca agua, donde abunda el *Baccharis rosmarinifolia*. Vive por pequeños grupos. Durante su vuelo deja oír un silbido muy especial. La alula y algunas tectrices marginales de los metacarpianos llaman la atención por su color blanquecinos.

El color general del cuerpo es isabelino vinoso; fácilmente se le distingue de la *Z. auriculata*.

Anida en los arbustos secos, en medio de los matorrales. Su nido construido con ramitas secas contiene dos huevos blancos.

Habita Chile, Cordillera de Mendoza.

Familia: PERISTERIDÆ

GÉNERO: ZENAIDA BP.

Zenaida auriculata DES MURS.

Columba aurita TEMM. Pig et Gall. II 1811, 60, Pl. XXV.

Peristera auriculata GAY. Fauna chilena, Aves, 1847, 381, Pl. VI:

Zenaida aurita GRAY gen. of Birds 1846.

Columba meridionalis KING (nec Lath) Zool. Journ IV, pág. 92 (1828) R. Dabbene, Mamíferos y aves página 372.

Zenaida aurita (TEMM.) RODULFO A. PHILIPPI. Zoología chilena. Catálogo de las aves chilenas existentes en el Museo Nacional de Santiago, formado por su director. Anales de la Universidad. Agosto 1868, pág. 327.

Zenaida maculata (VIELL.) JAMES, New list of Chilean Birds (1892).

Zenaida auriculata SALVAD. Ann. Mus. Civ. Génova S. 2, Vol. XX (XI), pág. 623, (1899).

Zenaida auriculata DES MURS DABBENE Cat. Sits. Aves arg. in an. Mus. Nac. Buenos Aires, ser. III, t. XI (1910) pág. 192, N.º 33. Cat. B. B. Mus. XXI 384.

Nombre vulgar: *Tórtola*.

La tórtola lleva un color violeta dorado muy vivo y resplandeciente; en las alas de la hembra joven se nota una gran cantidad de manchas brunas.

En general la tórtola es una ave muy tímida; el menor ruido la vuelve recelosa. Sus enemigos abundan entre los rapaces.

El cernícalo (*Tinnunculus sparverius*) y el peuco (*Parabuteo unicinctus*) la persiguen y destruyen sus polluelos en el nido.

El hombre la caza por su carne fina y sabrosa. Se multiplica en las lomas y en los cerros cubiertos de matorrales y de arbustos. Algunas ramitas secas sirven para fabricar su nido trasparente, pues por debajo se pueden ver sus dos huevos blancos. La hembra empolla durante diez y ocho días. Sus polluelos al nacer son ciegos y cubiertos de un vello muy escaso. Es ave monógama; anida dos o tres veces al año. Su grito es melancólico y repite cinco o seis veces la misma nota «Tur, tur, tur, tur, según Ives, pero produciéndolo con tanta dulzura que halaga el oído más rebelde». Se alimenta de toda clase de semillas; en los ingluvios he hallado: Trigo, correhucla, semillas de cardo y de diversas compuestas. Por bandadas visitan las viñas durante el invierno en busca de las pepitas de la uva que provienen de los granos caídos durante la vendimia. Para apagar su sed busca las pequeñas vertientes o los vados de los esteritos. Vuelve todos los días a la misma hora, generalmente durante las horas más ardientes de la tarde. Aspira con avidez el agua y no levanta la cabeza como las demás aves cuando beben. Gracias al clima privilegiado de Chile no emigra como la tórtola europea. Es muy común en Chile y por bandadas

recorre los rastrojos de las siembras durante el otoño y el invierno.

GÉNERO: COLUMBULA BP.

Columbula picui TEM.

Colombina strepitans (SPIX) 1825 DR. CIENU, O. DES MURS. Encyclopédie d'Hist. Nat. Oiseaux 6/partie, página 48, fig. 44 y 45.

Columbina picui (GRAY) GAY, Fauna chilena, Aves, (1847) 377.

Columba strepitans SPIX av. Bras. II, 1825, Pl. LXXV f. V. JOHN CASSIN, The U. S. astronomical exploration to the southern hemisphere during the years 1849-52, Birds Vol. II, pág. 191.

RODULFO A. PHILIPPI. Zoología chilena. Catálogo de las aves chilenas existentes en el Museo Nacional de Santiago, formado por su Director R. A. P. Anales de la Universidad de Chile, Agosto 1868, t, XXXI pág. 268 N.º 115, 331 N.º 36.

Columba picui, JAMES. New list of Chilean Birds 1892.

Chamoepelia cyanotigma (RCHECH) Zoología chilena etc. RODULFO A. PHILIPPI. Agosto 1868 t, XXXI página 325 N.º 11.

Columbula picui (TEMM) DABBENE Cat. Sis. Aves Arg. in an, Mus. Nac., Buenos Aires Ser. III, t, XI 1910, pág. 192 N.º 35 Cat. B. B. Mus. XXX 470.

Nombre vulgar: *Tortolita cuyana*.

Esa pequeña ave vive en los llanos solitarios y en los montes boscosos. Es monógama; construye su nido como las columbideas. Vive en pequeños grupos de cuatro a seis. La mayor parte del año lo pasa en la misma zona. Vive en Chile, Argentina y Brasil.

