QUELQUES INSECTES DE MANAOS,

avec description d'un Platypus (Col.) et d'un Neomesostenus (Hym.) nouveaux

PAR

Jean BRÈTHES

Le Dr. Alfredo A. da Matta, de Manaos, a eu l'amabilité de me confier la détermination d'une petite collection d'insectes dont la liste ne sera pas sans intérêt, je la crois, au point de vue de la distribution zoogéographique.

COLEOPTERES.—1. **Xanthopygus morosus** SHARP.

2. **Osorius intermedius** ER.

3. **Chlorida festiva** (L.) Ce beau longicorne s'étend jusqu'au nord de la République Argentine.

4. **Platypus Mattai** BRÈTHES. **n. sp.**—*Capite thoraceque ferrugineis, metasterno elytrisque obscure testaceis, elytris apice et segmentis abdominis vix piceis, pedibus ferrugineis, tibiis anticis vix piceis, antennis ferrugineis, articulo ultimo testaceo. Long. 7 mm. Lat. vix 2 mm.*

Cet insecte appartient à la 5e section de Chapuis, à intervalles des élytres similaires séparés par des streis ponctuées. De taille moyenne, de forme cylindrique; front plan, antennes insérées près de l'angle antéro-interne des yeux, le scape une fois et demie plus long que large, grossi vers la base extérieurement et atténué vers l'extrémité, le dernier article comprimé, elliptique, correspondant assez exactement en surface latérale à la surface de l'œil. Le front est plan, ponctué, avec une très légère impression transversale au niveau de la base des antennes. Une carène lisse longitudinale au vertex. Prothorax cylindrique, un peu plus long que large,

tronqué en avant et en arrière, un sillon longitudinal au tiers postérieur, une ponctuation assez peu régulière depuis ce sillon jusqu'à l'avant et près de l'encoche latérale. Elytres deux fois plus longs que le prothorax; intervalles similaires séparés par des stries ponctuées; seul l'intervalle 3 est légèrement plus large vers l'avant; aucun ne porte des stries vers la base; les points sont ovalaires. Le rétrécissement postérieur des élytres commence insensiblement un peu après leur milieu, leur prolongement terminal a une silhouette presque comme dans *P. Wesmaeli* (Chapuis, f. 112 ♀). L'intervalle 1 termine en une petite crête aiguë à l'extrémité, au commencement de la déclivité; les intervalles 3,4 et 5 ont une verrue minuscule, avant de commencer la déclivité. Le prolongement terminal est trièdre, une crête paraissant correspondre à l'intervalle 2, une autre à l'intervalle 8 et la 3e au bord interne postérieur de l'élitre. Vu d'en haut, ce prolongement est bifide; vu de côté (ou plutôt de $\frac{3}{4}$) il termine en 3 épines, la supérieure plus petite que l'inférieure, les deux aiguës, et la médiane mousse. Métasternum avec une grosse impression longitudinale, une ponctuation grosse non serrée, une petite épine avant l'impression postére-latérale. Les arcs ventraux ponctués-ruguleux, surtout le dernier. Tibias antérieurs avec 5 carinules au bord externe.

5. **Calaspidea discors** (Oliv.)
6. **Erotylus gibbosus** (L.)

LÉPIDOPTÈRES.—7. **Sibine nesea.** (Stoll) Kirby. —Grand exemplaire qui mesure 54 mm. d'envergure, et bien reconnaissable à la tache dorée sous la cellule et à la raie de même couleur après la cellule.

HYMÉNOPTÈRES.—8. **Neomesostenus manaosensis** Brèthes, **n. sp.** *Capite palpisque flavis, mandibulis (macula basali excepta), marginibus clypei, macula lata antennas et ocellos includente, nigris; antennis nigris, art. 8-13 interne flavis: thorace nigro, protharace antice, mesonoto lobis lateralibus interne exterreque, scutello vix toto, puncto postscutelli, segmento mediario basi et ad spinas transverse, tegulis, mesopleuris maculis 4 (2 intermediis majoribus),*

metapleuris macula magna flavis: abdomine subferrugineo, segmento 1° apice flavo; terebra nigra; pedibus ferrugineo-flavis, tarsis posticis dimidio apicali fusco, unguibus nigris. Alis tantulum infuscatis, venis nigris. Long. 13 mm. Alae: 10 mm. Antennae: 10 mm. Terebra: 5 mm.

La tête a quelques stries transverses vers les ocelles, le reste est ponctué; la carinule entre les antennes est peu prononcée, le thorax est ponctué. Les impressions entre le mésonotum et le scutellum, entre les mésopleures et les métapleures, entre les mésopleures et le mésosternum, au milieu des mésopleures, à l'impression mésosternale sont striées. Le segment médiaire est rugueux; la première crête transversale est bien visible, la 2e est à peine marquée aux épines latérales qui sont coniques et aussi hautes que larges; les stigmates sont elliptiques Le premier segment de l'abdomen est de la forme générale des *Cryptus*, lisse avec une impression apicale au coude préapical, la crête supéro-latérale allant de la base à l'extrémité; les segments suivants sont lisses avec une légère pubescence progressivement plus visible vers l'extrémité. Les ailes sont légèrement rembrunies, les veines noires; la veine médio-discoïdale est intersticielle, la cubito-discoïdale sans angle ni fausse veine, l'aréole petite, rectangulaire; aux ailes inférieures la veine transverso-médiane est brisée sous le milieu.

DIPTÈRES.—9. **Stegomyia argentea** (POIR.) D'après mon savant ami et collègue, le Dr. Dyar, le nom spécifique *argentea* doit prévaloir sur *calopus* et *fasciata* qui lui ont été attribués aussi.

10. **Culex** sp.? Une femelle assez détériorée, et qui appartient au groupe de *C. quinquefasciatus*, *fatigans*, etc., pour lequel il faut disposer de bon et abondant matériel.

11. **Culicoides guttatus** COQ.

12. **Simulium amazonicum** GOELDI.

13. **Volucella obesa** (FAB.)

APHANIPTÈRES. — 14. **Dermatophilus penetrans** (L.)