

DESCRIPTION D'UN NOUVEAU HOMOPTÈRE CHILIEN

PAR LE

Dr. Jean BRÈTHES

Mr. le Dr. Carlos E. Porter vient de m'envoyer une cigale qu'il recueillit à Lonquimay en 1917. Comme il s'agit encore d'une espèce nouvelle, je me fais un devoir de la lui dédier en reconnaissance de tant de matériel nouveau que lui doit la Science.

Tettigades Porteri BRÈTHES. n. sp. — ♀ *Piceo-niger*, prothorace disco utriusque, elevatione cruciformi, abdomine segmento penultimo, abdomine subtus paulum distinctiore, obscure ferrugineis: pedibus ferrugineis: maculis 2 ante elevationem cruciformam ochraceis: alis hyalinis, venis ochraceis, ad apicem paulum fuscioribus.

Avec pilosité fauve comme dans *T. chilensis*, mais de moitié moins épaisse. La tête est presque aussi large que le pronotum. Le front avec des stries transverses et une impression médiane longitudinale. Les stries sont indistinctes sur la partie supérieure du front. Une impression après l'ocelle antérieur et une autre à l'extérieur des ocelles latéraux. Pronotum un peu plus large que la tête, transverse, ses bords arrondis, légèrement relevés, les angles aussi arrondis; une impression triangulaire antérieure dont l'angle postérieur dépasse un peu le milieu du pronotum; une autre impression oblique en face du bord interne des yeux et une autre impression postérieure qui

sur les bords se recourbe en arc vers les angles antérieures du pronotum. Mésonotum convexe avec la marque de deux impressions qui se perdent vers le milieu. L'élévation cruciforme est de forme ordinaire. En face de la base des ailes il y a une plaie formée d'une quarantaine de fines stries. Les fémurs antérieurs avec deux épines. Ailes hyalines, ridées transversalement, les veines en général ochracées, devenant à peine rambrunies à l'extrémité des cellules postérieures, les cellules ulnaires 1-3 d'égale longueur, les cellules apicales: la 1^e petite et étroite, les 2, 5 et 6 à peu près égales, les 3,4 et 7 plus grandes et égales entre elles, la 8 à peu près large comme les 6 et 7 ensemble. Long. du corps: 16 mm. Ailes supérieures: 16 mm. Envergure: 42 mm.

Voisin du *T. ulnarius* Dist., mais l'envergure est bien moindre; plus voisin encore de *T. parvus* Dist. mais les couleurs que décrit cet auteur ne conviennent pas à *T. Porteri*; encore voisin de *T. Lebruni* Dist., mais la véneration alaire de cette espèce est généralement noire.

Une ♀ de Lonquimay, I. 1917; C. E. Porter leg.

BUENOS AIRES, Decbr. 1919.

