

SOBRE DOS BRACÓNIDOS ARGENTINOS

POR EL

Prof. Dr. Carlos E. PORTER

Catedrático de Zoología general y Entomología Aplicada en el Instituto Agronómico de Chile

Desde la publicación que hice en nuestro país de dos especies nuevas de *Apanteles* FOERSTER (*) y solicité después material de estudio de Braconidos en general, en la 3.^a edición de una de mis obras salidas a luz en Mayo de 1918 (**), no he dejado de recibir algunas especies de esa interesante familia de himenópteros parásitos. Así, el ingeniero agrónomo señor Rafael Barros V. y el Hno. Claudio me han favorecido con algunos de los ejemplares que han cazado. Más recientemente el señor Director del Museo Educativo de Mendoza, profesor Carlos S. Reed, me remitió para su estudio capullos de *Apanteles* en dos tubitos, de los cuales nacieron los imagos en mi Laboratorio.

Con respecto a los Braconidos que han salido ya de los capullos enviados por el Prof. Reed, y que pertenecen a dos especies, la primera es ya conocida y la otra nueva para la ciencia.

1. *Apanteles paphi* SCHR.

La descripción de esta especie puede verse en los *An. Mus. Nac.* (B. Aires), tomo I de la Ser. 3.^a (1902), p. 107.

El capullo es amarillo y me fué enviado abundante material de ellos desde Mendoza, como parasitando a la larva de *Tatochila autodice*.

C. S. Reed, leg. (Mendoza, Rep. Argentina.)

(*) *Apanteles Rivera* PORTER, n. sp., en «Rev. Ch. Hist. Nat.», XX (1916) p. 96 y *Apanteles Brethesi* PORTER, n. sp., en «An. Zool. Aplic.», IV (1917), n.º 3, p. 45.

(**) «Breves Instrucciones para la recolección, conservación y envío de ejemplares de Historia Natural», p. 21 (nota de pie).

2. *Apanteles Reedi* PORTER, n. sp.

Niger, mandibulis plus minusve ferrugineis: palpis, antennis subtus obscure, tegulis et pedibus a coxis flavis: femoribus posticis apice paulum, tibiis posticis apice paulum, tarsis posticis sat fuscis, alis hyalinis, venis testaceo-fuscis, stigmate subfusco. Long.: 2-2 $\frac{1}{4}$ mm. Antennae: 2 $\frac{1}{4}$ mm. Alae: 2 $\frac{1}{4}$ mm. Terebra haud exserta.

El elípeo es transverso, su base y su extremidad en cresta bastante aguda; es poco puntuado; la cara con puntuación pilífera bastante fuerte pero no apretada, los espacios lisos, una carena longitudinal que no alcanza a las antenas; los ojos vellosos; la frente lisa con pelos cortos esparcidos; la distancia entre los ocelos posteriores menor que la que las separa de los ojos. Tórax bastante densamente puntuado, la puntuación pilífera; el mesonoto separado del escudete por una línea de foveolas. El escudete liso, poco puntuado, sus bordes laterales con una serie de foveolas. El postescudete con dos foveolas grandes en el medio, los bordes laterales lisos cerca del escudete y foveoladas cerca del segmento mediario. Segmento mediario fuerte y densamente puntuado, los espacios lisos, dos líneas hundidas convergentes hacia la base del abdomen, una de cada lado de la línea media. Abdomen corto, deprimido, el primer segmento arqueado en su medio transversalmente y como vermiculado longitudinalmente, segmento segundo transverso, fuertemente puntuado y un poco vermiculado longitudinalmente, con una pequeña elevación mediana longitudinal. Los segmentos siguientes lisos, con pelos blanquizeos esparcidos.

Los capullos son blancos, más pequeños y algo más consistentes que en la especie precedente. Adheridos a una larva de un *Protoparce*.

(C. S. Reed, leg. Mendoza, Rep. Argentina).

Por no retardar la publicación de esta notita, no agregó figuras de esta especie nueva.

