

DOS HALICTUS NUEVOS DE CHILE

POR

P a u l H E R B S T

Halictus (Corynura) atrovirens, n. sp. ♂

Formas de *H. apicatus* Sich., pero de menor estatura, de abdomen más angosto y de distinto colorido.

♂. Cabeza y torax de color verde algo azulado, con densa, fina puntuación, casi lustrosos, revestidos de escaso pelaje blanquisco, clipeo verde cubierto de pelos blancos, labro de color café, mandíbulas amarillentas, antenas en el lado superior café-oscuro, el inferior amarillentas, primer y segundo artejo de las antenas negros, primer y segundo artejo del flajelo muy cortos, el primer artejo más corto que el segundo, este último tan largo como ancho, tercer artejo del flajelo y todos los restantes arqueados, cuatro veces tan largos como anchos, los cuatro últimos artejos paulatinamente ensanchados y aplanados. Mesonoto verde con finísima puntuación, área verde azulado, arrugado longitudinalmente, su borde posterior realzado; abdomen café negro, con lustre verdoso, dotado de corto pelaje blanquisco; segmentos ventrales de color café, los últimos segmentos cóncavos; patas del color verde como el tórax, menos el ápice del femur y base de la tibia, el metatarso y los tarsos que son amarillentos; alas hialinas, con las venas, estigma y tegulae amarillentas.

7 a 8 mm. de longitud, 1½ mm. de ancho.

Varios ejemplares de los alrededores de Valparaíso, Santiago y del estero de Marga-Marga, provincia de Valparaíso, cogidos durante Diciembre y Enero, visitando las flores de Quillaja saponaria, *Daucus carotta*.

Halictus analis, n. sp. ♀

Parecida a la hembra de *H. apicatus* Sich., pero de mayor estatura y de más arqueado abdomen.

♀. Negra, con pelaje blanquizeo, tórax con aislada puntuación fina, cabeza verde-bronceada, clipeo violáceo oscuro, labro negro con franjas de pelos rojizos, mandíbulas negras con el ápice rojo, antenas negras, artejos 3 al 11 en su cara inferior testáceas. Mesonoto escutelo y post-escutelo negro, mate, segmento mediario lustroso verde oscuro; abdómen lustroso, primer segmento negro, base del cuarto segmento a veces también del tercero negro-azul, mitad posterior del tercer y cuarto, además el quinto y sexto segmento colorados, surco anal (rima) más oscuro; primer segmento ventral negro, la mayor parte de los restantes en parte o totalmente colorados; pelaje del abdómen blanquizeo sobre sus últimos segmentos dorsales y ventrales rojizo. Patas negras, tarsos colorado amarillentos, con pelos blanquizeos, en los tarsos colorado amarillentos. Alas lavadas de amarillo, venas de color café claro, estigma de café oscuro, tegulae negras.

12 mm. de longitud, 4 mm. de ancho.

3 ♀ cogidas en la región de la costa de la provincia de Colchagua (Tramune) las debo a la amabilidad del R. P. señor Félix Jaffuel.

