

APUNTES SOBRE LAS AVES DE LA ISLA LA MOCHA

POR EL

R. P. Rafael HOUSSE

(Redentorista)

Como el ilustre e incansable doctor C. E. Porter tuvo a bien pedirme un artículo, para su preciosa «Revista Chilena de Historia Natural», le entrego con el mayor gusto estos apuntes, por si pueden ofrecer alguna utilidad a la ornitología del país.

Por supuesto, no pretendo establecer aquí una nomenclatura completa y definitiva de las aves moquinas.

Desembarcado en La Mocha el 3 de Enero del presente año de 1924, llevaba una vivísima curiosidad de conocer los volátiles de la isla, tanto más cuanto que ni el doctor Carlos Reiche en los Anales del Museo Nacional, ni el doctor R. A. Philippi en sus obras habían tomado en especial cuenta este ramo de la fauna moquina.

Las faenas de la Misión, que predicábamos a los insulares, nos dejaron bastante tiempo para reconocer la isla, y he aquí los resultados de nuestras excursiones y pesquisas en cuanto a la avifauna de La Mocha. Adopto, en la siguiente nómina, la división más común y clara en ocho órdenes. Don Carlos Reiche habla de 30 especies residentes, sin contar las migratorias. Nosotros, podemos enumerar 59 por todo, a lo menos cuya existencia nos fué posible comprobar durante nuestra estada.

Orden: Aves de Rapiña

1.º Según parece, faltan en absoluto en la isla los rapaces nocturnos. De ninguno oímos hablar, de ninguno sentimos el grito de guerra en la noche. Y hacen falta, para destruir las ratas que en los campos se vuelven legiones, y vagan sin temor a la luz del sol.

2.º En cuanto a los diurnos, sólo anotamos dos especies, vistas con nuestros ojos:

JOTE.—*Cathartes aura aura* (LINNEO). Son los veteranos de la Mocha. En número de unos 60, anidan en la selva central, y hacen presa en los cadáveres de jibias, focas, y animales ganaderos de la hacienda.

PEUCO.—*Buteo poecilogaster* (PHIL.), muy afin al *Buteo ventralis*. Nos trajeron uno vivo, y divisamos otro, que sería talvez la pareja de éste. Creo que eran los únicos.

BAILARIN.—*Elanus leucurus* (VIEILL). Según referencia de la gente, arribaría también a la isla; pero, en todo un mes no se nos presentó ninguno.

Orden: Pajarillos

GOLONDRINA.—*Hirundo leucoptera* (Gmel.). Revolotea por toda la isla. Residente.

GALLINA CIEGA.—*Stenopsis longirostris* (Bonap.) Una voló a nuestro paso.

ZORZAL COMUN.—*Turdus falklandicus* (Q. y G.) Residente. En todos los puntos abunda, y mucho aficiona a las playas, en donde caza los insectos que saltan por la arena.

CAMINERO.—*Geositta cunicularia* (Wieill.). Corrían unos cuantos por la falda de los cerros. ¿Residentes?

CHERCAN.—*Cisthorus platensis* (LATHAM). Residente y bastante común.

DIUCON, llamado allá; **URCO** *Taenioptera pyrope* (KITRE). Bastante escaso.

CACHUDITO.—*Anaeretes parulus* (KITTLITZ). Salta en los arbustos del bajo cerro, y parece no haberse aún multiplicado mucho. Residente.

DORMILONA CENICIENTA.—*Muscisaxicola cinerea* (Ph. y Land.) Vimos y conseguimos una sola, cazada viva por un isleño.

COLILARGA DEL SUR.—*Silviorthorhynchus Desmursi* (Gay). Se la encuentra, en reducido número, en el monte bajo que rodea las selvas centrales. Residente. Es muy tímida y difícil de cazar.

RAYADITO.—*Oxyurus spinicauda* (GMEL). Es muy co-

mún por toda la parte boscosa, y muy confiado. Residente.

MOLINERA.—*Cinclodes fuscus* (VIEILL). Merodea por las rocas de la costa, pero no es abundante. Residente.

RARA.—*Phytotoma rara* (MOL). Es la plaga de la huerta. Residente.

DIUCA.—*Diuca grisea* (LESS) No descubrimos más que una. Siempre son escasas, y éstas vuelven al continente, lo que me parece notable y no me explico, puesto que hallan copiosa comida.

CHINCOL.—*Zonotrichia pileata* (BODD). Como en todas partes tiene preponderancia. Residente.

JILGUERO.—*Chrysomitris barbata* (MOL). Viven numerosos en los cardizales. Residente.

TORDO.—*Curoeus aterrimus* (KITTL). Más bien escaso. Parece más chico que el del continente, y no es de un negro intenso y mate como sus congéneres de acá. Todos los ejemplares que examinamos tenían las alas y la cola brunas algún tanto obscuras. Parece residente.

TRILE.—*Ageloenus thilius* (MOL). Habita el pantano noroeste. Pocos individuos. Residente.

CHURRIN DE LA MOCHA.—*Triptorhinus paradoxus* (KITTL). Habita en regular número, tanto entre los matorrales como en la selva. Residente.

CHUCAO.—*Pteroptochus rubecula* (KITTL). Corre y canta por todo el terreno montuoso. Andan aislados, y son muy hábiles en escurrirse por el suelo. Es común y residente.

HUEZ-HUEZ.—*Hylactes Tarnii* (KING). Imita al chucao, y es más abundante. Los isleños lo llaman «Tuta». Es residente.

PICAFLOR.—*Eustephanus galeritus* (MOL). Dos o tres revolotearon a nuestra vista, y examinados con los gemelos me parecieron ser de los vulgares. Seguramente son emigratorios.




Fig. 9. *El Chucao* (ORIG.)

Orden: Trepadores

CHOROY.—*Henicognathus leptorhynchus* (KING). Llega a la isla por bandadas, pero se estaciona en las cumbres, inaccesibles por lo tupido de la vegetación. Ni topamos con él, ni sentimos sus gritos.

Orden: Palomas

TORTOLA COMUN.—*Zenaida auriculata* (DES MURS)

Es ya residente, pero poco multiplicada aún, por lo cual el hacendado tiene prohibida la caza de ella.

TORCAZA.—*Columba araucana* (Lessón). Pulula en toda la isla. Es en parte residente, y parte advenediza. Constituye uno de los alimentos de los habitantes que, con sendas escopetas, matan a veces de un tiro 20 y aún 30.

Orden: Zancudas

QUELTEGUE.—*Belonopterus cayennensis* (MOL). Son pocos, y residentes. Tienen todos la particularidad de lucir patas y dedos negros. Los isleños los apellidan «Treiles».

PILPILEN.—*Hoematopus leucopus* (GAIN). Recorren las rocas que ciñen la isla. Dudo que alcancen, por todo, a más de dos docenas. Es de creer que son residentes.

PILPILEN NEGRO.—*Hoematopus niger* (PALL). No lo hallamos en la misma isla, sino en un islote meridional contiguo. Allí matamos tres, de los diez que formaban la reducida colonia.

ANGELITO.—*Oegialitis falklandica* (LATHAM). Corren por pequeños grupos en las playas del norte y noroeste. Han de ser viajeros.

POLLITO DE MAR.—*Eumenetes pusillus* (BREHM). Visitan todos los arenales, jugando con las olas.

POLLO DE MAR.—*Charadrius marmoratus* (Temm). Menos frecuente que el anterior. Los raros individuos de esta clase no se mezclan nunca con los angelitos. Son también aves de paso.

POLLO DE MAR.—*Arenaria interpres* (LINNEO). Llegaron dos bandadas que circularon por las rocas del lado noroeste, como descansando de un largo vuelo.

POLLO DE MAR.—*Charadrius cantianus* (LATHAM). Pasean por los arenales, solos o en filas. A menudo desaparecen, lo que indican que viajan mucho.

VUELVEPIEDRAS: *Tringa borealis* (LATHAM). No se nos presentó más que una bandada de 25 ejemplares, que

se posaron en los arrecifes al caer la noche, y siempre en la costa noroeste. En el litoral opuesto, no descubrimos ninguna vez estas últimas especies. Sin duda los vientos fuertes del sur las molestarían demasiado.

HUAIRAVO.—*Nycticorax cyanocephalus* (MOL). Es el único representante de la familia. Dos individuos vimos por todo.

BANDURRIA.—*Ibis menalops* (GMEL). Andaban dos parejas de unas quince cabezas. Tan reducido número prueba que los cazadores las han diezmando mucho. Residente; antes abundaban.

ZARAPITO.—*Limosa hudsónica* (LATHAM). Al rededor de una docena gritaban en los escollos, pero muy miedosos y alertas.

POROTERA.—*Gallinago paraguayoe* (VIEILL). Su colonia ha mermado bastante al soplo de las escopetas, pero no es raro dar con ellas en los parajes húmedos. Residente.

PIDEN.—*Rallus ryrhynchus* (VIEILL). Ninguno vimos, pero, o nos equivocamos mucho, o fué su grito el que percibimos en un estero. Ha de ser rarísimo.

TAGÜITA.—*Porphyriops melanops* (VIEILL). Nos pareció oírla en la laguna de arriba, pero sin verla.

Orden: Palmípedas

TABLERO DE DAMAS.—*Daption capensis* (LINNEO). Dos no más andaban en el mar. Pero, cuando los balleneros traen y dejan sus presas amarradas frente a la caleta de las casas, o cuando van los isleños a su cacería de focas, pululan los tableros en derredor de la Mocha, y se cogen con la mano.

ALBATROS.—*Diomedea erulans* (LINNEO). Nadaban mar adentro quizás una media docena.

LAGARTON.—*Diomedea melanophrys* (TEMN). Seguían uno que otro los cardúmenes de sardinas y corbinas que desfilaban frente a la isla.

- GAVIOTA.—*Larus dominicanus* (LICHT). Por centenares pueblan el aire y los farallones.
- FARDELA.—*Puffinus creatopus* (COUES). Es el ave marina más numerosa, pero nocturna. Pasan el día en las cuevas que en el monte se abren. Allí duermen, allí anidan; allí se cazan con perritos; y, llegada la noche, salen a pescar. Residentes.
- FARDELA BLANCA.—*Priocella glacialoides* (SMITT). Tal cual acompañaban las gaviotas, sin parar en tierra.
- FARDELA NEGRA.—*Majaqueus æquinoctialis* (SR.) Sólo descubrimos tres o cuatro, ocupadas en perseguir peces, sin lograr una sola de ellas. Mar muy adentro, divisamos dos veces inmensas procesiones de ellas.
- PATO YUNCO.—*Pelecanoides Garnotii* (GRAY). Abunda en las aguas de la isla, pero nunca andan juntos, siempre solitariamente, y no se acercan a la costa.
- SALTEADOR.—*Magalestris chilensis* (BONAP). Uno descansó de pasada sobre las rocas.
- CAGÜIL.—*Larus Francklini* (VIEILL). Navegando en lancha, nos cruzamos con algunos pocos.
- GOLONDRINA DE MAR.—La apunto con su nombre vulgar, porque, según los moradores de la Mocha, llegan a esa golondrinas de mar durante el invierno, pero ignoro de que especie sean.
- ALCATRAZ.—*Pelecanus Landbeki* (PII.) Todo el mes, media docena se domiciliaron en la costa noroeste, por donde pasan los bancos de peces viajeros. Digiéron en las rocas.
- PAJARO NIÑO.—*Spheniscus Humboldti* (MEYEN). Es muy común; vive casi siempre en el agua.
- LILE COMUN.—*Phalacrocorax Gaimardi* (GARNOT). Es más bien raro.
- HUANAY.—*Graculus imperialis* (KING). Cuéntase entre las aves más adictas a la isla, y existe en regular número entre los peñascos; aveces descansa en los are-

nales.

PATO YECO.—*Phalacrocorax vigua* (VIEILL). Más común que el lile; amante de los arrecifes.

PIQUERO.—*Sula variegata* (TSCHT). Columbramos uno que otro que, sin detenerse en su viaje, se tiraban a pique y se iban con la presa.

Las más de estas aves tienen su nido en un islote más al sur, denominado por esto: «isla de los pájaros».

Según el testimonio de los primeros historiadores de la Mocha, la poblaban antiguamente varias especies de patos, hoy queda una sola, y representada por unos ocho sobrevivientes: el

PATO JERGON.—*Querquedula flavirostris* (VIEILL.) Nadan en los esteros y en las pozas del mar.

