

## SUR QUELQUES INSECTES DE SAN JOSE DE MAIPO

PAR LE

Dr. Jean BRÉTHES

Entomologiste au Muséum (B. Aires)

Dans une excursion réalisée en Novembre 1923 à San José de Maipo, Mr. le Prof. Dr. Carlos E. Porter recueillit plusieurs insectes qui, bien que connus pour la plupart, aideront à circonscrire leur distribution géographique.

## COLÉOPTÈRES

*Anthaxia concinna* (MANNERH.)

*Mordella luctuosa* BL.

*Eriopis 16-pustulata* (Latr.) BRÉTHES.

*Apion obscurum* BL.

*Eriopis 16-pustulata* var. *marginicollis* Ws.

## HYMÉNOPTÈRES

*Psammochares sobrinus* (SPIN.)

*Cerceris chilensis* SPIN.

*Anodontyra tricolor* WESTW.

*Pseudelaphroptera tricolor* SPIN ♀ ♂.—Les insectes étant *in copula*, je vais décrire la ♀, bien que Spinola l'ait donnée à connaître sommairement en 1851.

Presque 7 mm. de longueur. Tête manifestement transverse, les angles postérieurs arrondis; surface lisse, luisante, avec un pointillé très fin; des points plus forts vers les angles antérieurs une ligne longitudinale imprimée au quart antérieur et qui termine en un point enfoncé. Le cadre buccal à peu près circulaire. Clypéus transverse, un peu relevé longitudinalement en son milieu. Mandibules un peu arquées, simples. Pronotum aussi long que large, subcarré, bien moins large que la tête, poli, très peu opaque, mésonotum semicirculaire, un

peu voûté, segment médiaire oblique, obtusément caréné longitudinalement sur sa moitié supérieure et légèrement impressionné de chaque côté de cette carène.

Abdomen ovale-ellipsoïde, un peu plus long que la tête et le thorax réunis, à peine un peu plus large que la tête, premier segment avec poils courts sur sa troncature antérieure, où il est finement ponctué, avec une légère impression longitudinale; sa partie supérieure est lisse, avec un chagriné microscopique et quelques points enfoncés; une ligne imprimée transverse avant l'extrémité; cette ligne s'avance un peu vers l'avant au milieu. Deuxième segment avec une ligne imprimée subbasale et une autre subapicale, celle-ci légèrement arquée vers l'avant au milieu: entre les deux lignes la surface est rugueuse-ponctuée; le bord postérieur est testacé. Troisième segment également avec une ligne subbasale et une autre subapicale, celle-ci assez peu prononcée. Quatrième et 50 segments lisses, très éparsément ponctués. Plaque subgénitale arquée, peu visible au milieu de l'armature masculine. Mandibules, les articles médians des antennes et les tibias et tarses plus ou moins ferrugineux.

## DIPTÈRES

*Erax cinereus* PHIL.

*Sapromyza nigriventris* BL.

**Hippelates Porteri** BRÈTHES, n. sp.—Noir, le front aussi large que chaque oeil dans sa plus grande largeur; une tache indécise brunâtre au dessus des antennes; celles-ci brunes, le style avec quelques poils longs. Thorax laissant voir le fond métallique bleuâtre sous une légère pruinosité. L'abdomen plus distinctement métallique bleuâtre, avec poils courts et noirs répandus sur les segments. Ailes normales, limpides. Haltères d'un blanc de crème. Extrémité des quatre tibias postérieurs plus ou moins ferrugineuse, les quatre tarses correspondants plus distinctement clairs. L'éperon du tibia postérieur n'est que modérément développé. Longueur: 2 mm.

