

Descripción de dos nuevas formas de Saturniadae del género
Dysdaemonia de la Prcia. de La Rioja (R. Æ.)

(*Dysdaemonia Cortesi* GIAC. y *Dysdaemonia* CORTESI Giac.
forma Jordani GIAC).

POR EL

Dr. EUGENIO GIACOMELLI

La Rioja, Rep. Argent.

Al enviar al conocido especialista Dr. K. Jordan los dibujos exactos de dos *Saturniadae* del género *Dysdaemonia* que conocíamos y sospechándolas nuevas, han resultado, según parece, tales.

Damos aquí una sumaria descripción de dichas formas.

1.º *Dysdaemonia Cortesi* GIAC. n. sp. *forma Cortesi* (n. f.)

Esta forma que se distingue fácilmente por su característico color gris rojizo o atortolado es comparable a la *Dysdaemonia fosteri* Roths. en su forma gris, con la cual fué antes confundida por algunos: siendo sin embargo imposible de confundir con un atento examen. El fondo del ala en su superficie superior es como dijimos color rojizo atortolado, mientras que en *Fosteri* es gris: en esta última la faja larga contigua o muy cercana a las manchas vítreas, transparentes características se esfuma al exterior en una ancha faja obscura bien visible que no existe en ninguna de las formas riojanas; el tamaño general de esta forma es como *Fosteri* o un poco menor. Mucho menos puede confundirse la forma gris de *Fosteri* con *Cortesi* en la pág. inf. de las alas; en esta última es más intenso el color rojizo-atortolado siendo la otra completamente gris. En resumen *Cortesi* típica (*Cortesi Cortesi*) se parece a una *Fosteri* que fuese rojiza y sin la faja citada obscura. De esta nueva *Dysdaemonia* (*Dysdaemonia Cortesi forma Cortesi*) tenemos tan sólo dos ejemplos que juzgamos ser ♂ & ♀,

cazados por el señor Emilio Cortés en la Sierra en Cuchi-Jaen (Pcia. de La Rioja, Oeste), que aquí trajo por encargo de aquél el señor Lucio Aranda y dedicamos al primero con su nombre esta interesantísima *Saturniadae*.

2.º *Dysdaemonia Cortesi* GIAC. n. sp. forma *Jordani*, n. f. (o sp?).

Más interesante resulta la forma siguiente *D. Cortesi* f. *Jordani*, que dedico con placer a este ilustre entomólogo. Esta, poco estudiada aún, y que consideramos como una forma gris, de la llanura, de *Cortesi*, pero que bien podría resultar una vez que se conocieran los estados larvales, una especie distinta, se distingue claramente de la anterior *cortesi cortesi* por su color gris, parerecido al de la forma gris de *Fosteri*, pero muchísimo más plateado fuliginoso y no puede jamás confundirse con *Fosteri* porque carece como *Cortesi* de la faja obscura próxima a las máculas vítreas características de la forma gris de *Fosteri*; además *Jordani* resulta ser algo más grande de tamaño, algo más esbelta y con las colas algo más alargadas que las anteriores. De ella tenemos sólo dos ejemplares, que juzgamos ♂♂, en pasable estado, que cacé en la Usina eléctrica de La Rioja (ciudad).

Ambas formas (*Cortesi Cortesi* y *Cortesi Jordani*) parecen ser raras y sólo ocasionales: ignoramos en absoluto donde vivan la oruga y la crisálida. Juzgamos inútil la descripción minuciosa y detallada de estas dos interesantes formas que resultan más fáciles de distinguir, comparándolas como hicimos con la forma gris de *Dysdaemonia Fosteri* más esparcida en las colecciones y que hay que conocer bien para conocer estas otras. Para guiar al que se dedique al estudio de este interesante grupo, damos, sin embargo, el siguiente pequeño cuadro o clave distintivas de estas *Dysdaemonia* de la R. A.

| | | | | | |
|---|----------------------|---|-------|---|--|
| 1 | Dysd. <i>Fosteri</i> | » | verde | { | ♂♂ y ♀♀ provistos de una ancha faja |
| | | | | | gris oscura contigua o muy cercana a las muchas transparentes. |
| | | | | | Inconfundible por su color verde característico. |

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|---|--|
| 2 } <i>Dysd. Cortesi</i> | <i>Cortesi Cortesi</i> | { | Color gris rojizo tórtola, inconfundibles característico, sobre todo en la pág. inf. faja obscura ausente. |
| | « <i>Jordani</i> | { | Color gris como la forma gris de <i>Fosteri</i> pero más fuliginoso o plateado; faja obscura ausente; corte de las alas más esbelto que en las demás formas. |

Esperamos que este cuadrito sea más que suficiente para demostrar claramente las diferencias de cada una de las formas descritas, y terminamos, al dedicar una de ellas a nuestro distinguido colega Dr. Jordan que tuvo la bondad de examinar exactas acuarelas de todas por hacer votos de que se encuentren los raros y desconocidos estadios larvales de la forma de La Rioja, que nos darían una clave más segura para la absoluta afirmación de lo que hoy adelantamos.

Inútil añadir que conocemos y poseemos también la *Dysdaemonia Boreas*. Cram, inconfundible con las especies y formas ya citadas.

La Rioja, 10 de Enero de 1925.

