

Avifauna de San Bernardo y sus alrededores

POR EL

R. P. Rafael Housse

Nada se le puede negar al incansable Doctor Carlos E. Porter, que ha pasado una circular a los que en el país se dedican a las Ciencias Naturales, invitándolos a colaborar en el tomo de 1925 de su excelente «Revista Chilena de Historia Natural».

Por esto escribo el artículo que viene a continuación.

Como se verá por la nomenclatura que sigue, parece que hay, entre las aves cordilleranas, cierta tendencia a emigrar hasta el valle central, por lo menos en estos últimos años. He aquí los pájaros que pude ver o matar sobre todo en el cuadrienio pasado.

Orden: RAPACES

Jote.—*Cathartes aura* (LINNEO) No arriba en los cerros de Chena, pero se ven a veces bandadas de doce y quince, atraídas por alguna carroña que desde muy lejos han olfateado. Tuve uno en cautividad, pero intratable.

Aguila.—*Geranoæetus melanoleucus* (VIEILLOT) Siempre residen varias parejas en nuestros cerros, haciendo su nido en saliente de roca, o entre los tallos de algún quisco, o en la copa de árboles. Dice Gay que pone a lo más dos huevos; sin embargo, saqué yo mismo tres polluelos de un mismo nido, y los tuve muy domesticados. A los dos años, tenían todavía su plumaje castaño y negro. En los bordes del nido, había cadáveres de ratas y de un conejito. He visto dos cazando, en pleno vuelo, un cernícalo.

Aguilucho.—*Buteo erythronotus* (KING) Frecuentan nuestros cerros habitualmente, sobre todo en invierno. Nunca pude dar con su nido, lo cual me inclina a creer que no se multiplican en la comarca. Vienen en busca de ratones.

Peuco.—*Buteo unicinctus* (GRAY). Aunque comunes, nunca tuve noticias de su nido. Grandes destructores de ratas, los he visto también perseguir perdices y bajar a nuestro gallinero. Otros dos se volaban con una culebra en las garras.

Peuco.—*Buteo ventralis* (GOULD). Aparecieron un solo año, sin duda llegados del sur. Pude matar tres en el invierno, mientras acechaban ratones en el cerro.

Peuquito.—*Accipiter Cooperi* (BONAY). Nunca lo había divisado en estos contornos cuando, en Mayo de este año 1924, llegó uno a posarse en un árbol de nuestra propiedad, desde donde pasó a nuestro museo.

Vari.—*Circus cinereus* (VIEILLOT). En veinte años tampoco se me había presentado uno solo, y en Mayo de 1921, un tiro feliz derribó una ave que pasaba en vuelo alto: era un vari joven que iba de viaje.

Gavilán.—*Falco peregrinus* (GMEL). Otro advenedizo que, por casualidad, vino a descansar en un fundo inmediato, y terminó ahí su peregrinación.

Bailarín.—*Elanus dispar* (LESS). Puede decirse que no se le vé en el tiempo veraniego; en otoño e invierno llegan algunos a bailar en los aires. Maté uno que traía un ratón del cerro.

Cernícalo.—*Falco sparverius* (GMEL). No es abundante. Pocos se ven en el estío, y jamás hemos podido descubrir un nido de ellos. Los que embalsamamos tenían, en el buche y en el estómago, pelos de roedores y plumas de pajarillos. Cosa rara en aves de rapiña: una pareja en jaula nidificó y puso huevos, en 1922.

Tiuque.—*Milvago chimango* (VIEILLOT). Común. Sus buches venían hinchados de lombrices y caracoles. Cuando tienen polluelos, se les ve arrebatarse pollitos en el gallinero y avecitas en los nidos. Ellos mismos anidan en la región, en los quiscos y en los árboles altos.

Traro.—*Caracara vulgaris* (CUVIER). Escasísimo. Uno que otro han aparecido en los potreros en un período de quince años.

Pequén.—*Strix cunicularia* (LINN). Residente en los cerros vecinos, pero son pocas las parejas. Los que maté tenían en curso de digestión un ratón y un lagarto.

Chuncho.—*Glaucidium nanum* (KING). Varios han

caído bajo nuestra munición. Habían comido insectos y un pajarillo.

Lechuza.— *Strix flammea* (LINNEO). Habitan el entretecho del convento, en donde comen ratas, diucas, zorzales, pichones que cazan.

Orden: PAJARILLOS

Cata argentina.— *Conurus jendaya* (GMELIN). De vez en cuando llega una extraviada. Sus alas intactas no permiten creer que son escapadas de jaula.

Gallina ciega.— *Stenopsis longirostris* (BONAP). En general es emigratoria y se ve de paso. Sin embargo, encontramos los dos huevos de un nido, en un hueco de roca, que la hembra estaba empollando. Se ve en el cerro y en nuestra propiedad.

Gallina ciega.— *Stenopsis exilis* (LESS). Lo mismo que la anterior. Ambas especies llevaban en el estómago despojos de mariposas crepusculares.

Golondrina.— *Hirundo leucopygia* (LITCH). Común y de mismas costumbres que en todas partes.

Pinguera.— *Patagona gigas* (VIEILL). Sólo revolotea en el cerro, donde anida y chupa el jugo y parásitos de las flores silvestres. Es veraneante.

Picaflor.— *Eustephanus galeritus* (MOLINA). Ave de otoño e invierno; ello no obstante, todos los años quedan una que otra pareja para multiplicarse en el jardín.

Churrin.— *Scytalopus niger* (SWAINSON). Nunca lo he visto, pero varias veces he sentido su grito típico en los matorrales de los cerros de Chena. Serían uno o dos. Hasta hace años jamás habíase notado su presencia.

Turca.— *Hylactes megapodius* (KITTLITZ). Tiene cuevas en las vecinas colinas. Abrimos una, tenía como metro y medio de profundidad horizontal, y dos polluelos velludos. El examen estomacal reveló una alimentación de semillas e insectos, mezclados con piedrecillas. Fué en Diciembre del año 1923.

Tijerita.— *Leptasthenura ægithaloides* (LESSON). Frecuenta tanto las colinas como los jardines para buscar los insectos, pulgones y otros, que infestan las cortezas. Pero, me parece que sólo anida en las breñas del cerro.

Canastero común.—*Siptornis humicola* (KITT). Residente, y bastante común. A pesar de lo que afirma Gay, nunca lo he hallado en los jardines, sino en las faldas de los cerros, en donde se alimenta de puros insectos.

Canastero.—*Synallaxis anthoides*. (KING.) En 1922 noté su presencia, tanto en las colinas como en el llano, en el mes de Mayo; y todo el invierno permanecieron en la región. Gay lo menciona como habitante de Magallanes. El hecho es que no había sospechado su llegada en años anteriores. Su alimentación parece ser mixta: pasto e insectos.

Rayadito.—*Synallaxis spinicauda*. (GMEL.) Lo creía propio de las faldas precordilleranas en donde había cazado varios, en el Departamento de Maipo. Y el año pasado quedé muy sorprendido al ver unos cuantos en un jardín del pueblo, hecho que se ha repetido este año. Hay una pequeña colonia de ellos, ocupada en comer los insectos y larvas que se ocultan en la corteza de los árboles. ¡Ojalá se multiplique!

Trabajador.—*Silvia melanops* (VIEILL.) En un pantano vecino los divisé el año pasado, poco numerosos. Logré matar uno; lleno estaba de insectos y zancudos que pululan en los totorales.

Agachadera.—*Geositta rufipennis* (BURMEISTER). A mediados de Mayo las descubrí en las pendientes de nuestros cerros, el año pasado. A pesar de mis incesantes correrías, nunca antes había reparado en su presencia, lo cual me hace creer que su emigración acá fué un hecho nuevo. Eran bastantes, comiendo las semillitas del pasto. Se fueron en Septiembre.

Bandurrilla.—*Upucerthia dumetoria*. (GEOFFROI Y D'ORB.) Llega al empezar el otoño. Vi individuos en la base de los cerros, en nuestra propiedad, pero sobretudo a orillas de las acequias y de los pantanos, donde buscaban en el fango lombrices e insectos acuáticos. Hacia fines del invierno suben a la cordillera.

Churrete.—*Cinclodes fuscus*. (VIEILL.) También viene a invernar, bajando de la cordillera, y frecuentan las orillas de las acequias buscando moscas y demás insectos.

Molinera.—*Cinclodes nigro-fumosus*. (GRAY). Este es

residente, y anida en los agujeros de los puentes o de las riberas. Son grandes cazadores de insectos acuáticos.

Caminante.—*Anthus correndera* (VIEILL.) Es ave de invierno, que he visto únicamente en los potreros, en especial en las partes regadas, donde busca los insectos que hace salir la humedad. También busca las semillas del pasto.

Caminero.—*Geositta cunicularia* (VIEILL.) Parece abundar más en los potreros en la estación lluviosa; sin embargo hallamos un nido con huevos a proximidad de una acequia, en la primavera. Su alimentación consiste con preferencia en pequeños coleópteros, cuyos élitros se encuentran en el estómago de estas aves.

Canastero cordillerano.—*Siptornis sordida sordida* (LESSON). Don Rafael Barros Barros V. emite. en su artículo sobre «Aves de Aconcagua», la sospecha de que este pajarillo es migratorio y abandona la cordillera. En efecto, si en el invierno no se le encuentra en las alturas, aquí lo divisé y cacé en Abril, en las colinas y los terrenos inmediatos. Su comida es la misma que la de sus congéneres.

Zorzal mero.—*Agriornis livida* (KITTLITZ). Llega en los meses invernales a los cerros cercanos, pero siempre en reducido número, y aisladamente.

Gaucha.—*Agriornis maritima* (D'ORBIG. Y LAFR.) Fué una gran novedad para mí que se matara uno, el año pasado, en una propiedad vecina. Fué en Septiembre. Nunca, antes, en mis cacerías constantes de coleccionista, había dado con ave tan montaraz.

Diucón.—*Toenioptera pyrope* (KITT). De otoño a la primavera es huésped del valle, y frecuenta los jardines para buscar los insectos y larvas.

Runrún.—*Lichenops perspicillata* (GMÉL.) Migratorio. En el verano, se le encuentra en las orillas de las acequias, pero siempre es escaso. No he podido dar con su nido. Parece ser únicamente insectívoro.

Dormilón chico.—*Muscisaxicola maculirostris* (D'ORBIG. Y LAFR.) Es probable que algunos quedan en el valle central sin emigrar al norte para el invierno; pues maté uno en Agosto y otro en Septiembre, en la parte baja de los cerros.

Dormilón común.—*Muscisaxicola maclovina* (GARNOT.) Anualmente llegan a mediados de Mayo, y viven tanto en las colinas como en los jardines. Los observé escudriñando las altas rocas, en busca de los insectos refugiados en las grietas.

Animita.—*Lessonia nigra* (BODDAERT.) Siempre la encontré en parajes húmedos, en la estación invernal, y escasa siempre.

Cachudito.—*Anoeretes parulus* (KITTL.) Es residente. Su estómago revela una alimentación mixta, en que dominan sin embargo los insectos.

Viuda.—*Colorhamphus parvirostris* (GOULD.) El año anterior 1923 maté la primera que haya descubierto, al pie de un cerro, el 28 de Julio. En catorce años que llevo de coleccionista nunca había tenido esta suerte. Estaba comiendo semillitas en el pasto.

Fio-fio.—*Eloenia albiceps* (LAFR. Y D'ORBIG.) Llegan como en Octubre y quedan hasta Abril. Son insectívoros y frugívoros, grandes consumidores de cerezas.

Sietecolor.—*Cyanotis rubrigastra*. (VIEILL.) Lo hallé en un totoral, con su elegante nido. Tenía en el estómago zancudos y mosquitos.

Chercán.—*Cisthotorus platensis* (LATHAM.) Es muy destructor de oruguitas y larvas en el huerto, pero dañado también por cuanto corta y come la puntilla tierna de los almácigos.

Rara.—*Phytotoma rara* (MOLINA). Reside todo el año, siendo más numerosas en los meses invernales. Se come toda clase de hortalizas, aficionando en especial los brotes tiernos, y desenterrando las arvejas en vía de germinación. Cerezas y uvas son postres que le gustan mucho.

Zorzal.—*Planesticus magellanicus* (KING.) Residente y comensal de todos en cuanto a fruta: cereza, damasco, nísperos, higos, uva forman su comida en las estaciones correspondientes. Caza larvas y orugas para sus polluelos. También come semillas y bayas, y legumbres. Parece omnívoro.

Tenca.—*Mimus thenca* (MOLINA). Es ante todo cerril, pero llega también a los jardines. Caza insectos; se

alimenta con bayas, frutas, y prefiere la uva en tiempo de vendimia.

Jilguero.—*Spinus barbatus* (MOL.) Es residente. Si en tiempo de Gay sólo en el invierno venía a los llanos, ahora se arraigó en ellos; siendo siempre verdad que en la mala estación llegan bandadas de la cordillera. Parece puro granívoro.

Jilguero cordillerano.—*Spinus uropygialis* (SCLATER.) Asombrado quedé, el 12 de Noviembre pasado, al ver en nuestro huerto un grupo de ellos. ¡Primera vez en mi vida! Maté dos, y vigilé los demás, echados de la cordillera sin duda por la sequía y el hambre. Uno ví llevando una pluma en el pico, tal vez con proyectos de nidificar. Pero, a las tres semanas, habían desaparecido. Supe también de otras bandadas que cazaron en jaulas.

Chirigüe.—*Sicalis arvensis* (KITT.) Misma anotación que para el jilguero común.

Gorrión.—*Passer domesticus* (LINNEO). Este importado atrevido y omnívoro alcanzó acá hace cosa de tres años, y ya es común. Pude hacer parangón entre gorriónes traídos de Holanda embalsamados y los nacidos en Chile, y está a la vista que en veinte años han sufrido un ligero cambio en el plumaje. La babera negra del macho es más larga y más ancha que en el europeo, y el color castaño de los lados y la cabeza es mucho más subido. Destruye bastantes insectes.

Chincol.—*Zonotrichia pileata* (BODD.) Otro voraz que hace presa en todo.

Pájaro plomo.—*Phrygilus unicolor* (D'ORB. LAFR.) Este año, en Mayo, por vez primera, bajó de la alta cordillera al valle central. Tres hembras revoloteaban en nuestro jardín. Maté una, dejando las otras dos para ver si el macho les vendría a hacer compañía, pero hasta hoy no he divisado uno solo.

Cometocino.—*Phrygilus Gay Aldunatei* (GAY). Varios años aparecieron por aquí entre Mayo y Septiembre, pero con intervalos de uno o más años. Cacé varios vivos con cebo de maíz molido y pan. Se hospeda en los jardines y en los cerros: ahí busca semillas en el suelo.

Rara negra.—*Phrygilus fruticetti*. (KITTL.) Invernan en los cerros, numerosos. Uno que otro quedan, pues-

to que hallamos nidos con huevos. Todos los muertos contenían puras semillas de gramíneas.

Platero.—*Phrygilus alaudinus* (KITT.) Lo mismo que el precedente; pero como encontramos varios nidos con huevos, es señal de que algunas parejas se hacen sedentarias. Viven de semillas.

Diuca.—*Fringilla diuca* (MOLINA). Baste decir que pululan y comen de todo. Oí hablar de dos casos de albinismo, vistos en los alrededores.

Tordo argentino.—*Molothrus bonariensis* (GMELIN). En 1912 maté una pareja, y después no ví más, hasta 1921. Desde entonces volvieron algunos individuos. Este año, un grupo de tres parejas tomó nuestra propiedad por domicilio, y hasta esta fecha de 27 de Diciembre encontré dos huevos de estas intrusas aves: uno en nido de chincol, y otro en nido de diuca. Los observé en la viña, ocupados en buscar larvas en el terreno recién labrado. Gay ya lo apunta como chileno.

Tordo.—*Curoeus curoeus* (MOLINA). Aunque perseguí bandadas en los cerros de «El Principal», al otro lado del Maipo, apenas si divisé uno que otro individuo aislado en los contornos de San Bernardo. Restos de insectos había en la bolsa estomacal.

Trile.—*Agelaius thilius* (MOL.) Habita un totoral cercano, en donde encuentra copiosa comida de insectos y gusanos. En el invierno, desde cuatro años, vienen regularmente a nuestra huerta, y comen verduras.

Loica.—*Trupialis militaris* (LINNEO). Es sedentaria, y no es raro dar con sus huevos, puestos en algún hueco del cerro. Es granívora, pero también come hierbas.

Orden: PALOMAS

Torcaza.—*Columba araucana* (LESSON.) Casi todos los inviernos nos traen a los cerros un vuelo más o menos numeroso, que pasta en las laderas de ellos. Ninguna nidifica.

Tórtola común.—*Zenaida auriculata* (DES MURS). Mucho han disminuido por las escopetas, hasta ser raras. En el invierno, llegan pequeños grupos, luego diezmados. Se nutre con toda semilla silvestre.

Tórtola cuyana. — *Columbina picui*. (TEMMINCK). Hasta 1910 sólo se veía en el cerro y en invierno. Ahora anida en pleno pueblo.

Cuyuca.—*Metriopelia melanoptera*. (MOLINA). Divisar algunos pares en las colinas de Chena, el año pasado, fué gran novedad para mí. Este año, la inmigración fué mucho mayor; eran colonias de veinte aves las que recorrían la falda de los cerros, hambrientas de semilla. No supe que ninguna haya hecho domicilio. Sin embargo, el 21 de Noviembre último, maté aún dos en una de nuestras higueras.

Orden: GALLINÁCEAS

Codorniz.—*Lophorthyx californica* (LATHAM). Sedenaria en los cerros de aquí. Más aún, varias veces penetraron en huertos del pueblo y en el nuestro. Es granívora y vegetariana. En ciertas partes montuosas es ya abundante.

Perdiz.—*Nothoprocta perdicaria*. (KITZ.) Hízose ya muy escasa en las colinas de las cercanías. El examen estomacal reveló una mezcla de insectos y granos.

Cojón.—*Thinocorus orbignianus*. (GEOFF.) En 1918, pasó una docena volando, y en la línea eléctrica de la calle una de ellas se estrelló, y lo recogimos. Fué el 9 de Agosto esta casualidad.

Perdicita.—*Thinocorus rumicivorus*. (ESCHS.) Otra novedad. El 22 de Julio 1923, en la cancha herbosa de la aviación, estuvo pastando una tribu nómada de estas ave-citas; cosa nunca vista en estos contornos.

Orden: ZANCUDAS

Huairavo. — *Nycticorax cyanocephalus*. (MOLINA). Muy raro. Ví uno en un pantano vecino, y dos en nuestro bosque de eucaliptus, todos ejemplares jóvenes. Habían comido puros gusanos y pecesitos. Me pregunto por qué le atribuyen vida nocturna. En todas partes los ví en pleno día pescando o digiriendo su primera comida.

Queltegüe.—*Belonopterus cayennensis* (GMEL.) En el invierno, se oye con frecuencia su chillido cuando pasan, en las alturas del aire, grupos viajantes. En los potreros de la vecindad, se quedan siempre unos pocos individuos

que buscan gusanos en las partes anegadas. Creo que jamás han anidado por aquí.

Pollo del campo.—*Oreophilus ruficollis* (WAGL.) En el invierno de 1923 maté dos: uno en el cerro adonde llegó una pareja, y otro en la cancha de aviación, en donde una bandada buscaba víveres, es decir gusanos que una lluvia reciente atraía a la superficie del suelo.

Porotera.—*Gallinago paraguayae* (VIEILL.) Varios años los hubo en un potrero que rodea un pantano vecino, en cuyo terreno anegado desenterraban gusanos e insectillos. No pude averiguar si anidaron.

Pitotoi.—*Totanus stagnatilis* (BECHST.) En los veinte años que estoy aquí, ví una sola bandada que, al sobrevo-
lar el llano, divisó un potrero regado y bajó a comer gusanos e insectos. Era un día de otoño 1917. Al atardecer prosiguieron su viaje.

Piden.—*Rallus rytirhynchus* (VIEILL.) Muy escaso. Lo ví en el pantano ya mencionado, verdadero lugar de cita de aves acuáticas, a pesar de medir un tercio de cuadra apenas.

Tagua.—*Fulica rufifrons* (PH. Y LANDL.) En el mismo totoral encontré un nido de ellas con siete huevos. Son migratorias, y una o dos parejas.

Tagüita.—*Gallinula crassirostris* (GRAY.) A dicha lagunita llegan anualmente unas pocas y anidan. Las observé con anteojos: su comida alternaba entre insectos y vegetales según los encontraban. En otoño se van.

Orden: PALMÍPEDAS

Pato jergón.—*Dafila spinicauda* (VIEILL.) Tres veces hubo uno que, en inviernos sucesivos, frecuentó las lagunas y charcos de la vecindad.

Pato tripoca.—*Erismatura ferruginea* (EYT.) Por excepción, llegó uno a una laguna de las cercanías, y su mala suerte lo puso al alcance de un tirador que lo mató.

Si estos apuntes pueden interesar a los aficionados del ramo zoológico, doy por bien empleado mi tiempo. En todo caso, habré cumplido con los deberes de la amistad que se merece el doctor Porter.

San Bernardo, 26 de Diciembre de 1924.