

Dos roedores nuevos de las montañas de Catamarca

POR

Angel CABRERA

Jefe del Departamento de Paleontología del Museo de La Plata (R. A.)

Durante los últimos años de su vida, el malogrado explorador y recolector arqueológico D. Vladislao Weiser, a quien tantos tesoros debe la valiosa colección de antigüedades americanas que en Buenos Aires posee el señor D. Benjamín Muniz Barreto, venía enviando al Museo de La Plata los ejemplares zoológicos que incidentalmente obtenía en sus viajes por el noroeste de la Argentina. Entre el material así reunido, he hallado dos especies de roedores de las grandes alturas del norte de Catamarca, que me parecen nuevas y cuya descripción ha autorizado a publicar en la «Revista Ch. de Hist. Natural» la Dirección del referido Museo.

Phyllotis oreigenus, sp. n.

Tipo: Macho adulto, de Laguna Blanca, Catamarca (3,100 m. de altura), obtenido por Weiser en 1924. N.º 5682 del Museo de La Plata.

Un *Phyllotis* de tamaño pequeño, como *amicus* o *tamborum*, de los que parece ser representante más meridional, con la cola algo más larga que el cuerpo y la cabeza, y el pelaje de color bastante claro. En las partes superiores, ofrece un matiz entre ante y pardo pálido, muy parecido al «avellaneus» de Saccardo y ligeramente ensombrecido por el pizarroso obscuro de la base de los pelos. Estos son hacia la punta de color ante deslucido, pasando en la puntita misma a ante canela pálido, y hay mezclados algunos pelillos enteramente negros. Las orejas, de color pardo madera. Las partes inferiores, de un blanco ligeramente lavado de ante, viéndose mucho la base de los pelos que es color pizarra. Pies blancos lavados

de ante. Cola de color gris paño por encima, blanca en los lados y por debajo.

•Cráneo con la región interorbitaria sensiblemente estrechada, y los bordes supraorbitarios bien marcados, formando arista o esquina cuadrada, pero no cresta saliente. M^1 con el segundo repliegue externo bifurcado, por decirlo así, presentando en el fondo una especie de pequeño divertículo que corresponde a la lámina posterior. El mismo detalle se observa en el repliegue externo del m^2 , el cual también en la lámina anterior presenta un pequeño repliegue anteroexterno. El m_1 tiene dos repliegues externos y tres internos.

Dimensiones del tipo: cabeza y cuerpo, 88 mm.; cola, 99; pie posterior, sin uñas, 24,8; oreja, 18. Cráneo (con la región occipital rota): Ancho cigomático, 13; estrechamiento interorbitario, 4; ancho de la caja cerebral, 13,2; nasales, 11,6; orificios palatinos, 5,5; diastema, 7; serie molar superior, 5,2.




Fig. 42.—Series molares superior e inferior, del lado derecho, de *Phyllotis oreigenus*, $\times 5$.




Fig. 43.—Series molares superior e inferior, del lado derecho, de *Akodon leucolimnaeus*, $\times 5$.

Akodon leucolimnaeus, sp. n.

Tipo: Macho adulto, con los molares no muy gastados, de Laguna Blanca, Catamarca (3,100 m. de altura), obtenido por Weiser en 1924. N.º 5684 del Museo de La Plata. Hay además otro ejemplar de la misma localidad, y otro del Salar de Antafalla, Territorio de los Andes (3,500 m.)

Esta especie se asemeja mucho a *A. lactens* y *A. orbis* en el tamaño, en el matiz ocre que tiñe sus partes infe-

riores y en sus incisivos estrechos y de color muy pálido, casi blanco en la punta; pero no tiene la región mentoniana blanca, como *lactens*, y difiere de ambas especies por ser sensiblemente menos proodonto, no pasando su ángulo incisivo de 80.º Su pelaje es de color tierra de sombra bastante obscuro, más o menos teñido de ocre, sobre todo a lo largo de los flancos. Las partes inferiores, muy lavadas de ocráceo, casi de un color ante ocráceo, dejando ver mucho el pizarroso de la base de los pelos. Pies blancos, lavados de ante. Cola gris por encima, blanca sucia por debajo.

El cráneo es bastante convexo encima, y tiene los bordes supraorbitarios bien señalados, aunque sin formar crestas; los agujeros palatinos alcanzan por detrás hasta la segunda lámina del m^1 . Este diente presenta una muesquecita o pequeño repliegue bien marcado en su cara anterior, y dos repliegues a cada lado; el m^2 tiene un solo repliegue interno y dos externos, y el m^3 dos externos solamente. Abajo, los repliegues son dos externos y tres internos, el primero muy poco profundo, en el m^1 , uno externo y dos internos en el m_2 , y solo uno interno, poco marcado, en el m_3 .

Dimensiones del tipo: Cabeza y cuerpo, 86 mm.; cola, 58; pie posterior, sin uñas, 20; oreja, 14. Cráneo: Longitud total, 23,7; longitud cóndilobasal, 22; ancho cigomático, 12,8; estrechamiento interorbitario, 4,7; ancho de la caja cerebral, 12; nasales, 83; agujeros palatinos, 4,7; diastema, 6; serie molar superior, 4,2.

