

Sobre una nueva forma argentina de Callicore, Huebn.

(LEPIDOPTERA, FAM. NYMPHALIDAE)

POR EL

Dr. Eugenio GIACOMELLI

(La Rioja, R. A.)

Al preparar y estudiar un ejemplar de Callicore, que he adquirido al Sr. Paul Kohler, y que me aseguró ser argentino y muy probablemente del mismo Buenos Aires, sospeché tratarse de una forma o quizá especie nueva, referible al grupo de Callicore Candrena Huebn. La circunstancia de tener la suerte de poseer el fasc. XI y las correspondientes planchas de la obra «*Etudes de Lepidopterologie comparée*» del Prof. Charles Oberthür, que contiene a mi modo de ver lo más completo que existe sobre Callicore, me autoriza a describir y señalar esta forma como nueva, dándole siquiera provisoriamente el nombre de su descubridor. Llámola, pues, *Callicore Kohleri* Giac., n. sp. o dado que fuere una forma de *C. Candrena*, *Callicore Candrena* Huebn, var. *Kohleri* Giac. Doy aquí una des-



Fig. 8.--*Callicore Köhleri* GIAC., n. sp.

Descripción sintética de las diferencias que presenta con *C. Candrena* típica, añadiendo algunas observaciones sobre el parecido que tiene con otras especies completamente distintas.

El ejemplar en cuestión que parece ser macho, es algo más pequeño que *Candrena*, más aun que *Candrenoides* Obth. En la pág. sup. es en dibujo y coloración tan parecido a *Candrena* que a juzgar de esto sólo, se la coloca-

ría inmediatamente en esta especie. Pero la página inferior es completamente distinta en las alas del 2.º par. En estas alas los dibujos en forma de 8 tan característicos de *Callicore* se tocan entre ellos en el centro del disco y además están absolutamente unidos a la más interna de las líneas negras circulares concéntricas; el aspecto de este dibujo de *Kohleri* recuerda a la pág. inf. de *Callicore marchali confluens* macho Oberth. (N.º 2933 PL. ccc4 IV obra citada) y también un poco a la de *Callicore euclides* Lat macho, var (N. 2942 id.) pero en esta los dibujos en 8 son algo más fuertes y provistos de punto central, que es poco visible en mi ejemplar. Pero como *Kohleri* es absolutamente distinta en la pág. sup. de estas dos especies solo queda la posibilidad de considerarla, pues, estrictamente allegada a *C. Candrena* macho Huebn (N.º 2957), aunque como expliqué muy diferente en la pág. inf. Como creo mi ejemplar seguramente un macho, tampoco puedo creer que se trate de otro sexo de *Candrena* típica que no encuentro descrita en la obra citada. La considero pues, provisoriamente como una nueva especie a la cual doy el nombre indicado, con la salvedad de pasar a var. de *Candrena* si así revelaran mayor cantidad de ejemplares y nuevos estudios. Como quiera que sea, aún como variedad es interesante y completamente nueva. Es lástima que su descubridor, aunque seguro de que el ejemplar es argentino, no pueda recordar exactamente la localidad donde fue cazado. No sabemos bien si es de B. Aires mismo o de Formosa (R. A.)

