

Un Bostrychide chilien peu connu, *Neoterius Fairmairei*, Lesne

PAR

Pierre LESNE

Assitant au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris

Les *Neoterius* proprement dits (1) sont des Bostrychides représentés seulement par trois espèces étroitement apparentées entre elles et localisées semble-t-il, sur le versant occidental des Andes, au Pérou et au Chili. De ces trois espèces, *N. pulvinatus* Em. Blanchard 1851, *N. mystax* Em. Blanchard 1851 et *N. Fairmairei* Lesne 1895, la dernière encore imparfaitement connue, avait été décrite (2) sur deux exemplaires femelles recueillis l'un à Tacna, par Schmidt (Coll. Fairmaire), l'autre au Pérou par Mme. Ida Pfeiffer (Coll. R. Oberthür). M. le Professeur Carlos E. Porter l'a retrouvé beaucoup plus au Sud, à Curacautin, vers le 39° de latitude (Février, 1917)

L'examen de ce nouveau spécimen, qui paraît être également une femelle, me permet de donner une caractéristique de l'espèce plus complète que les descriptions antérieures:

*Neoterius Fairmairei* LESNE ♀

Long. 10-11 millim.

Corps allongé, parallèle, le prothorax étant moins large que les élytres ceux-ci légèrement élargis en arrière. Coloration brune; pattes rouges ou d'un brun rouge. Pubescence double, composée 1.° de soies denses, courtes, arquées, à demi couchées sur le tégument, et, 2.° de longues soies éparses perpendiculairement dressées, plus nombreuses sur l'épistome, les bords du pronotum et la partie postérieure des élytres.

Face dorsale de la tête densément et finement granuleuse, sauf dans la région médio-antérieure du front, qui est occupée par une gibbosité finement et rugueusement ponctuée, gibbosité tronquée en avant par une face déclive lisse et brillante aboutissant à la suture frontoclypéale. La gibbosité frontale n'occupe guère que le tiers de l'es-

(1) cf. P. LESNE in *Ann. Soc. Ent. Fr.* (1898), p. 582.

(2) *Ann. Soc. Ent. Fr.* (1895), p. 171; *ibid* (1898), p. 582 et 584 fig. 201 et 202.

pace interoculaire. Articles de la massue antennaire revêtus d'une pubescence dense très courte et très fine.

Bord antérieur du pronotum inerme au milieu et n'ofrant qu'une ou deux dents à chacune de ses extrémités, ces dents moins saillantes que chez le *Neoterius mystax*. Aire postérieure du pronotum couverte en son milieu de grains squamiformes serrés.

Ecusson sans revêtement spécial de soies claires. Elytres un peu moins fortement ponctués que chez les espèces voisines, leur pubescence d'un roux doré, dense, mais ne masquant pas le tégument. Ponctuation des élytres forte et dense, les intervalles des gros points étant lisses et brillants, à part de très fins pores épars. Dans la région postérieure de leur région dorsale se dessinent, sur chaque élytre, les trois nervures qui donneront naissance aux dents de la déclivité postérieure. Celle-ci densément et fortement ponctuée et offrant, dans les intervalles de la ponctuation de nombreux grains circulaires finement perforés au sommet et marqués, en outre, d'une très fine ponctuation. Déclivité munie de chaque côté de trois dents peu saillantes, situées au voisinage des bords, mais sur le plan de la déclivité. La dent supéro-interne, la moins saillante des trois, affecte la forme d'une carène rectiligne parallèle à la suture et tronquée en arrière. La dent moyenne a également la forme d'une carène rectiligne tronquée, mais elle converge en arrière vers la suture. La dent inféro-externe, la plus saillante des trois, est tuberculiforme, mousse, nullement conformée en carène, à peu près aussi haute que large; elle est située en plein disque de la déclivité, à mi-distance de la suture et du bord externe, au niveau du milieu de la hauteur de la déclivité. Région suturale de la déclivité déprimée dans la partie supérieure de celle-ci, saillante et formant comme une large côte (qui est très finement ponctuée) sur plus de la moitié inférieure de la déclivité. Bord apical réfléchi.

La collection de M. Maurice Pic contient un spécimen ♂ de *Neoterius* que je crois être un mâle de *N. Fairmairi*. Il diffère des femelles ci-dessus décrites par sa carène frontale plus saillante, ses yeux moins gros, son

prothorax plus grand et armé d'un fort uncus à chacun de ses angles antérieurs; enfin par la déclivité apicale des élytres brillante, finement et éparsement ponctuée et nullement granuleuse de part et d'autre de la côte suturale. En outre, la dent supéro-interne de la déclivité es




Fig. 1.—*Neoterius Fairmairei* LESNE

aussi forte et aussi saillante que les dents des deux paires inférieures. La taille de ce mâle est de 10 mm.

D'après l'étiquette fixée à l'épingle, il proviendrait de Mexique. Mais l'authenticité de cette provenance ne paraissent pas absolument certaine, il convient d'en attendre la confirmation avant d'en faire état. Il serait possible, en effet, qu'il existât une forme mexicaine particulière, affine du *N. Fairmairei*.

