

## Une nouvelle espèce de *Coenypha*

PAR LE

Dr. MELLO-LEITAO

De l'Académie Brésilienne de Sciences et de la Société Entomologique de France

Le genre *Coenypha* E. SIM. est exclusive du Chili. En étudiant les Thomisides de la collection Eugène Simon, du Musée d'Histoire Naturelle de Paris, j'y ai rencontré une espèce nouvelle, qu'on peut facilement identifier par les caractères de la table ci-dessous:

*A*—Abdomen de bords entiers, non recoupés:

*B*—Abdomen pourvu d'une bande transverse noire; fémur I pourvu d'un tubercule dorsal—*Coen. fasciata* sp. n.

*BB*.—Abdomen sans bandes, concolore; fémur I pourvu de deux tubercules dorsaux.....  
.....*Coen. lucasi* (Nic.)

*AA*.—Abdomen de bords postérieurs festonnés:

*B*.—Dents du bord postérieur de l'abdomen bien nettes noires.....*Coen. fuliginosa* (Nic.)

*BB*.—Dents du bord postérieur plus blancs et plus larges, brunes.....*Coen. edwardsi* (Nic)

### *Coenypha fasciata*, sp. n. (Fig 43)

♀ —8,0 mm.

Céphalothorax granuleux, plus large que long, régulièrement arrondi dans ses deux tiers postérieurs, la région céphalique presque parallèle et plus de deux fois plus étroite que la portion moyenne de la région thoracique, sans apophyses ou tubercles.

Les yeux postérieurs grands, en ligne presque droite, légèrement recourbée, les médians séparés environ un diamètre et un peu plus proches des latéraux. Les yeux antérieurs en ligne bien recourbée, les médians beaucoup

plus petits et plus éloignés. L'aire des yeux médians beaucoup plus longue que large et plus étroite en avant. Le clypeus plus bas que l'aire des yeux médians.

Pattes I très robustes: les fémurs pourvus d'un tubercule médian et de deux apophyses apicales à la face supérieure; les tibias et les protarses armés de 2-2-2-2 cépiones inférieures.




Fig. 43.—Epigynum

Pattes II beaucoup plus petites et plus faibles: les fémurs pourvus de 2 apophyses apicales supérieures bien plus faibles, les tibias et les protarses comme ceux des pattes I. Pattes III e IV courtes et sans épines.

Abdomen de bord antérieur droit, très élargi en arrière, environ deux fois plus large que long, les angles latéraux saillants, le bord postérieur arrondi, sans festons; au milieu de la face dorsale il y a une carène transversale mousse.

Pièce labiale plus large que longue, échancrée, les lames maxillaires courtes, inclinées. Bord inférieur des chelicères pourvu de deux petites dents.

Céphalothorax fauve cervin, garni de granulations noires; les pattes fauves, vêtues de poils clairs. Sternum brun-fauve, pourvu de poils noirs; pièce labiale et lames maxillaires brunes.

Abdomen: dos jaune, marbré de brun foncé et pourvu d'une mince bande transverse noire, légèrement courbée en avant, qui unit les deux angles latéraux; face ventrale brun marbré, pourvue de quelques points noirs.

Hab. Valdivia (Chile).

Type: N.o 18242 de la collection E. Simon (Musée de Paris).

