

Notas sobre Satyridae chilenos

POR

Pablo KÖHLER

Teniendo en preparación una monografía de los *Satyridae* argentinos, tuve necesidad de revisar también la fauna chilena en lo que se refiere a esta familia, por la siguiente razón: la fauna argentina es bastante diferente de la chilena en las provincias del Norte y en las centrales, porque la alta Cordillera separa las dos regiones perfectamente. A medida que llegamos más hacia el sur, menos hermético se encuentra el cierre; siempre más anchos valles permiten la comunicación y, a medida que bajan los valles, más especies iguales se encuentran en ambos lados de la cordillera. Es por eso que los *Satyridae* chilenos en las regiones de los lagos son casi idénticos con los argentinos, lo mismo si se trata de especies que vuelan en los valles y en las alturas.

Este territorio de los lagos es inmensamente rico en especies de la familia en cuestión y a continuación citaré las que corresponden a Chile y probablemente también a la Argentina:

Argyrophorus argenteus BLANCH.

Cosmosatyrus leptoneuroides Fldr.

„ „ *ssp. plumbeola* Btlr.

„ „ *ssp. duseni* Stgr.

„ *chiliensis* Guer.

„ „ *ssp. monticolens* Btlr.

„ „ *ssp. williamsianus* Btlr.

„ „ *ssp. morania* Berg.

„ *quies* Berg.

„ *statia* Weym.

Tetraphlebia germainii Fldr.

Faunula leucoglène Fldr.

„ *stelligera* Btlr.

Neosatyrus ambiorix Wllgr.

„ *simplex* Btlr.

- Neomaenas servilia* Wllgr.
Epinephele edmondsi Btlr.
 „ *monachus* Blch.
 „ *coctei* Guér.
 „ *tristis* Guér.
Erebia patagonica Mab.
Elina leferrei Guer.
 „ *vanessoides* Blch.
 „ *calvertii* Elw.
 „ *nemyrioides* Blch.

Muchas otras especies chilenas no pasan la Cordillera y son típicas chilenas, y esto en el Norte de Chile. Al revisar esta reducida lista de *Satyridae* chileno-argentinos, sorprende en el primer momento la falta de los géneros *Taygetes* y *Euptychia*. Pero se explica fácilmente: El género *Taygetes* no pasa hasta la zona templada argentina y no puede pasar las montañas. El segundo género tampoco no llega tan hacia el Sur para permitir su paso a Chile. Una sola *Euptychia* de la Col. Alberto Breyer procede de cerca del Nahuelhuapi y parece ser una forma de *Eupt. phares* Godt. Dado que el estado de este ejemplar no es bastante bueno para permitir una clasificación fuera de duda, debemos esperar hasta que nos sea posible conseguir algún material de este género y de la localidad citada u otra para fijar el límite geográfico del género *Euptychia*, que probablemente también se podría encontrar en Chile.

L i t e r a t u r a

- P. P. Gazulla y Fl. Ruiz.* Los Insectos de la Hacienda de «Las Mercedes». Rev. Chil. de Hist. Nat., t. XXXII, p. 288 y sig.
F. Puga Borne.—Distribución geográfica de la mariposa plateada de Chile, Rev. Chil. de Hist. Nat., t. XXXI, pág. 277.

Las obras de Burmeister, Bery, Felder, Buttler, Edwards, Weymer y Thieme.

Köhler.—Las mariposas argentinas. *Satyridae* in litt.