

## Notas breves sobre Longicornios chilenos (\*)

POR EL

Prof. Dr. Carlos E. PORTER

10. Sobre los *Achryson* de Chile.—El primer Cerambycidae del género *Achryson* SERV. encontrado en Chile fué el recibido de Copiapó y determinado como *A. lineolatum* ER. por FAIRM. et GERM., quienes dan una descripción en latín en «Ann. Soc. Ent. Fr.». 1859, p. 506. Este ejemplar tenía 16 mm.—La especie fué descrita primeramente del Perú. Años después el señor FILIBERTO GERMAIN describió en los «Anales de la Univ. de Chile», tomo C (1898) otra especie, el *A. Philippii*, en vista de 1 ♂ y 1 ♀ procedentes también de Copiapó. De esta segunda especie encontré yo un ejemplar en *El Molle* en 1899 y el Sr. J. A. Wolffsohn me entregó en 1899 un ejemplar que me envió por su intermedio, desde Ovalle, el Sr. J. N. Thomas.

Ahora recibo del Prof. Luis Sierra, entre otras especies, tres ejemplares de un Longicornio que corresponde a *A. lineolatum* ER.

Proceden de Copiapó; son 2 ♂♂ y 1 ♀.

Como se puede ver por la escasísima literatura de estas especies, *A. lineolatum* ER. no alcanza a lo que hoy se sabe sino hasta el sur de la prov. de Coquimbo.

Las quince especies del género pertenecen sólo a la América, principalmente a la del Sur.

Las especies chilenas y sus localidades hasta hoy conocidas son estas:

### *Achryson lineolatum* ERICHSON

1847. *A. lineolatum* ER., Arch. f. Naturgesch., XIII, p. 142.

1859. *A. lineolatum*, FAIRM Y GERM. Ann. Ent. Fr. (3) VII, p. 506. Perú; Chile: Copiapó.

(\*) Estas notas fueron iniciadas en el tomo XXV (1921), pp. 497-501 de esta misma *Revista* y han continuado en otros tomos.

**Achryson Philippi GERMAIN.**

1898. *A. Philippii* Germ., An. Univ. Chile, C, p. 560.  
1923. *A. Philippi* PORTER, Rev. Ch. Hist. Nat. XXVII, p. 52.

Chile: Copiapó, Ovalle.

11. **Nuevas localidades para algunas especies.**—Una reciente excursión de pocas horas al cerro de Chena (cerca de San Bernardo, Prov. de Santiago) me permitió coger las siguientes especies de Cerambícidos:

*Callideriphus laetus* BLANCH.—Muy común en muchas partes de Chile.

*Astyochus obliquatus* F. & G.—Poseía desde hace años un ejemplar en mal estado de la especie obsequiado por un alumno y como tomado en Alhué (Prov. de Santiago).

*Emphytoecia suturella* BLANCH.—Especie común en el país.

*Emphytoecia alboliturata* BLANCH.—Tenía ya un ejemplar de Petorca.

*Blachychilus scutellaris* BLANCH.—En Quillota, tomé ejemplares en cópula en el mes de Nov. de 1908.

La tercera de las especies la he recibido no hace mucho de Los Perales (Marga-Marga) tomada por el P. Félix Jaffuel; El P. Anastasio Pirion me ha obsequiado ejemplares de la última tomada en Apoquindo el 12 de Octubre del presente año.

Instituto de Zoología General y Sistemática.

Santiago, 9 de Novbre. de 1929.

