

Coquilles recueillies au Pérou, par M. le Dr. Vergne

PAR

E d o u a r d L A M Y

Sous-Directeur du Laboratoire de Malacologie au Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris

M. le Dr. Vergne a fait, en 1923, sur les côtes du Pérou, une petite collection de Coquilles (9 Pélécy-podes, 17 Gastéropodes) parmi lesquelles deux, trouvée dans des sépultures, fournissent une nouvelle preuve des voyages que savaient effectuer les anciens pêcheurs Péruviens.

PELECYPODES

Pectunculus ovatus Broderip (1832, P. Z. S. L., p. 126).—Une valve: Callao.

Spondilus pictorum Chemnitz (1784, *Conch. Gab.*, VII, p. 94, pl. 69, fig. E-F).—Sept valves trouvées dans des tombes à Tucuma Yenca.—Ce *Sp. pictorum* se rencontre sur la côte Pacifique Américaine depuis le Golfe de Californie jusqu'à l'Écuador (île de la Plata et Guayaquil): la présence de ces valves dans des sépultures démontre que, pour se les procurer, les anciens pêcheurs Péruviens devaient entreprendre d'assez longs voyages (1883, de Rochebrune, *De l'emploi des Mullusques chez les pueples anciens et modernes*, p. 18).—Sowerby (1848, *Thes. Conch.*, I, p. 422, pl. LXXXV, fig. 17, pl. LXXXVIII, fig. 45) identifie le *Sp. pictourum* Chemn. au *Sp. crassisquama* Lk. qui a été signalé par Lamarck (1819, *Anim. s. vert.*, VI, 1^{re} p., p. 191) comme se trouvant fossile à Carthagène (Colombie): M. J. Favre (1916, *Catal. ill. Coll. Lamarck Mus. Genève*, pl. XII, fig. 39) a proposé de restreindre le nom de *crassisquama* à ce type éteint, dont le *Sp. pictorum* semble être une mutation plus ornementée.

Mytilus chorus Molina (1782, *Stor. Nat. Chile*, p. 202).—Trois valves: Punta.

Mytilus decussatus Lamarck (1819, *Anim. s. vert.*, VI, 1^{re} p., q. 120).—Deux valves: Callao, La Madelaine.—Cette forme, très voisine du *M. magellanicus* Chemn. n'en est, pour Deshayes (1836, *Anim. s. vert.*, 2^e éd. VII, p. 38), qu'une variété.

Modiola dactyliformis Hupé [*Mitylus*] (1848-54, in Gay, *Hist. Chile, Zool.*, VIII, p. 310, pl. V, fig. 6).—Deux valves: Punta.—Hupé a reconnu lui-même que cette espèce se rattache aux *Modiola*.

Donax radiatus Valenciennes (1833, in Humboldt et Bonpland, *Rec. observ. Zool.*, II, p. 221, pl. IV, fig. 3 4).—Quatre valves: sables de San José.

Mesodesma donancium Lamarck [*Maetra*] (1818, *Anim. s. vert.*, V, p. 479).—Nombreuses valves: Pachacamac.

Semele corrugata Sowerby [*Amphidesma*] 1832, *P. Z. S. L.*, p. 200).—Deux valves: Punta.

Petricola denticulata Sowerby (1834, *P. Z. S. L.*, p. 46).—Deux individus: Punta.

GASTÉROPODES

Conus fergusonii Sowerby (1873, *P. Z. S. L.*, p. 145, pl. XV, fig. 1).—Deux individus trouvés dans des tombes à Tucuma Yenca.—La présence de ce Cône, qui vit sur la côte Pacifique seulement depuis le golfe de Californie jusqu'aux îles Galapagos, s'explique probablement de la même manière que celle du *Sp. pictorum*.

Oliva peruviana Lamarck (1810, *Ann. Mus.*, XVI, p. 317).—Un individu: Pachacamac.

Mitra orientalis Gray (1834, *Griffith's Anim. Kingd.*, pl. 40, fig. 5).—Trois individus: sables de San José.

Solenosteira fusiformis Blainville [*Purpura*] (1832, *Nouv. Ann. Mus.*, I, p. 229, pl. XI, fig. 7).—Trois individus: sables de San José.—Cette espèce, classée successivement dans les genres *Purpura*, *Fusus*, *Buccinum*, *Neptunea*, *Polia*, *Melongena*, *Tritonidea*, a été prise par Wm. Dall (1909, *Proc. U. S. Nat. Mus.*, XXXVIII, p. 167 et 213) comme type d'un genre *Solenosteira*.

Nassa (Hima) dentifera Powys (1835, *P. Z. S. L.*, p. 95).—Un individu: Punta.

Columbella (Nitidella) buccinoides Sowerby (1832, *P. Z. S. L.*, p. 114).—Trois individus: Punta et sables de San José.

Purpura chocolatum Duclos (1832, *Ann. Sc. Nat., Zool.*, XXVI, p. 108, pl. 2, fig. 7).—Nombreux individus: Callao, La Madeleine, Punta.

Purpura (Stramonita) Delessertiana d'Orbigny (1835-46, *Voy. Amér. mérid., Moll.*, p. 439, pl. LXXVII, fig. 7).—Cinq individus: Punta, sables de San José, Pachacamac.

Concholepas concholepas Bruguière [*Buccinum*] (1789, *Encycl. Méthd., Vers*, I, p. 252).—Nombreux individus. Callao, La Madeleine.

Ranella (Lampas) ventricosa Broderip (1832, *P. Z. S. L.*, p. 178).—Un individu: sables de San José.

Calyptraea (Infundibulum) trochiformis Gmelin [*Patella*] (1790, *Syst. Nat.*, ed. XIII, p. 3093).—Trois individus: Punta.

Crepidula onyx Sowerby (1824 *Gen. Shells. Crepidula*, fig. 2).—Nombreux individus: Callao, La Madeleine, Pachacamac.

Natica unifasciata Lamarck (1822, *Anim. s. vert.*, VI, 2^e p., p. 201).—Trois individus jeunes: sables de San José.

Natica (Polynices) cora d'Orbigny (1835-46, *Voy. Amér. mérid., Moll.*, p. 401, pl. 76, fig. 10-11).—Nombreux individus: sables de San José, Pachacamac.

Sigaretus concavus Lamarck (1822, *Anim. s. vert.*, VI, 2^e p., p. 208).—Deux individus: sables de San José.

Turbo (Prisogaster) niger Gray (1828, Wood, *Ind. Testac., Suppl.*, n^o I).—Deux individus: Punta.

Trochus (Clorostoma) ater Lesson (1830, *Voy. "Coquille"*, *Zool.*, II, p. 144, pl. XVI, fig. 2).—Sept individus: Punta.

PARIS, Février 1930.

