

ALGUNOS CÓCCIDOS DE MENDOZA

Por el

Prof. Dr. Carlos E. PORTER

Director del Instituto de Zoología General y Sistemática

Probablemente interesará a algunos de nuestros lectores la determinación y *habitat* de algunos Cóccidos que debo a la amabilidad de mi distinguido amigo, el Ingeniero-Agrónomo señor Julio Mácola, y cuya lista había quedado entre mis artículos sobrantes del año ppdo.

Su publicación retardada no importa mucho, ya que no se trata de especies nuevas.

Como se verá por los nombres de los descriptores que siguen a los de las especies, ellas fueron creadas por los Drs. HEMPEL (1900), LEONARDI (1911) y BRÈTHES (1918).

Pseudococcus mendocinus LEON.—Sobre *Hyalis argentea*.
Precordillera cerca de la ciudad de Mendoza.

Tachardia lycii LEON.—Sobre *Lycium chilensium*. Precordillera de Mendoza, cerca de la ciudad.

Pulvinaria minuta BRÈTHES.—Sobre *Schinus dependens*.
Mendoza, Las Heras, 2300 metros

Luzulaspis spinulosa LEON. — Sobre *Atriplex lampa*.
Mendoza, Departamento General Alvear.

Chrysomphalus paulistus (HEMP.) CKLL.—En gran cantidad sobre hojas de olivos, en la ciudad de Mendoza.

Este Diaspino fué descrito primeramente del Brasil sobre una especie de *Laurus*, y sobre otros arbustos espontáneos y cultivados. El señor C. Lizer (Physis II, 1916, p. 432), dió cuenta de haberlo observado en el Delta paranense sobre *Laurus nobilis* y *Olea europea*, y agrega: «Es probable que en otras localidades del país también se encuentre en las mismas condiciones o diferentes plantas, y sobre todo en las regiones del Norte.» Después este mismo autor lo ha encontrado en la prov. de Buenos Aires, y casi siempre sobre *laurel*.

Doy una figura de una ramita de olivo procedente de Mendoza, que deja ver gran cantidad de escudos sobre la cara superior de las hojas; en la cara inferior son rarísimos (Fig. 65).




Fig. 65

Dinaspis lahillei LEON —Sobre *Bulvesia retama*. Cordillera cerca de Mendoza.

Instituto de Zoología General y Sistemática,

SANTIAGO, 20 de Enero de 1930.