

## CONTRIBUCIONES AL ESTUDIO DE LOS CICINDELIDAE

### VII. Notas zoogeográficas sobre algunos Cicindelidae americanos

Por

E d u a r d o V A R A S A R A N G U A

Mehr «Entomologie» und  
weniger «Entomophilie».  
(W. Horn, 1908).

**Megacephala (Tetracha) fulgida** KLUG.

Colón, Depto. de Montevideo, Uruguay. Febrero 8,  
1929. Debajo de una piedra. (J. TREMOLERAS).

La especie había sido encontrada anteriormente en el Departamento de Montevideo por el Sr. Arechavaleta, según me informa mi amigo D. Juan Tremoleras, pero él, en más de treinta años de colectas en esa región, no la había encontrado todavía. El ejemplar único hallado me fué comunicado por su colector, y actualmente está otra vez en poder de él.

**Megacephala fulgida s. sp. cyanea** W. HORN.

Aprovecho esta oportunidad para rectificar una información mía por la cual daba esta sub-especie como existente en el Paraguay. Esa indicación es falsa, pues está basada en un error de identificación; recientemente el Dr. Walther Horn examinó el ejemplar constatando que se trata de la *M. distinguenda* Dejean. El Dr. Horn, en el Catálogo de los Cicindelinoe (Junk Schenkling) en 1926, indica esta raza como existiendo en el Paraguay fundándose en la nota mía motivo de estas líneas.

**Megacephala Thomsoniana** W. HORN.

Salta, Rep. Argentina.

Poseo en mi colección un ejemplar ♂ de esta especie, que ha sido identificado por el Dr. W. Horn como *Meg. (Tetracha) Thomsoniana*, que él describió originalmente sobre un ejemplar procedente de Bolivia, y hasta la fecha no había sido denunciada su existencia en la Rep. Argentina

**Megacephala (Tetracha) femoralis PERTY.**

Santo Tomé, Prov. Corrientes, Rep. Argentina. Enero 1928 (G. PELLERANO).

Esta especie la indica el Dr. Bruch en su Catálogo de los Coleópteros de la Rep. Argentina como existente en Alto Paraná; el Dr. Walther Horn en su reciente Catálogo (l. c.) la indica de Misiones. Aunque Santo Tomé no dista mucho del Territorio de Misiones, precisa una localidad y determina su límite Sur en lo conocido hasta ahora.

El Sr. G. Pellerano me ha proporcionado una hermosa serie de ejemplares de esta interesante especie y con ellos me ha proporcionado algunas notas tan interesantes que las transcribo íntegras a continuación:

«Durante mi estada en Santo Tomé, que fué de varios años, no había tenido la suerte de encontrar esta especie, hasta que por fin, en el mes de Enero de 1928, fuí por tercera vez a la estancia de mi amigo el Sr. Velar, situada 7 leguas al Norte de Sto. Tomé, en el Departamento de este nombre; allí pasé un mes; durante los primeros veinte días no había encontrado aún esta especie, que era para mí desconocida (y es muy rara en las colecciones argentinas); esos días pasaron sin lluvias hasta que por fin la sequía, tan molesta para los agricultores y ganaderos como para los entomólogos, desapareció gracias a las oportunas lluvias caídas con intervalos durante dos días. Después de cada chaparrón salía a recorrer los alrededores y fué en esas circunstancias que encontré la *T. femoralis* sobre los tacurúes o nidos de Termitas o en sus contornos y de cuyos habitantes se alimentaba; los encontraba en promiscuidad, tanto verdes como azules, consiguiendo así unos treinta ejemplares; esto duró dos días hasta que desaparecieron casi, encontrando en los tres días siguientes y últimos

» de mi estada en la región sólo uno que otro ejemplar  
 » aislado, ya sea verde o azul.

» A estas Tetrachás, tan rápidas en sus movimientos,  
 » no las he visto levantar el vuelo y me demuestra el po-  
 » co uso que hacen de las alas, el hecho de que nunca ha-  
 » ya conseguido atraer ejemplares por medio de las lin-  
 » ternas que colocaba durante las noches en esos lugares.  
 » En los campos que rodean Sto. Tomé nunca encontré  
 » ejemplares y tampoco los recibí entre los envíos que de  
 » otras zonas del Departamento me hacían con frecuencia.  
 » Como Ud. ve, el área donde encontré la especie fué muy  
 » reducida.»

***Cicindela suturalis*, s. sp. hebræa KLUG.**

Ecuador (BUCKLEY, 1880) (Ex dupl. Coll. Ed. Fleutiaux).

***Cicindela sinuosa* BRULLÉ.**

Carrasco, Depto. de Montevideo, Uruguay. III. 13. 1929. A orillas del mar, corriendo sobre la playa. (J. TREMOLLERAS).

Esta especie no había sido todavía encontrada en el Uruguay, y la localidad donde la ha encontrado por primera vez mi amigo don Juan Tremoleras dista considerablemente de la región en donde se encuentra habitualmente, que es en Paraguay y en las provincias argentinas de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Su presencia a orillas del mar es también notable.

El Sr. Tremoleras tuvo la gentileza de facilitarme para su observación el único ejemplar ♂, el que él ya había atribuído a esta especie, y que efectivamente estaba correctamente determinado, correspondiendo perfectamente a una ♀ del Paraguay, en mi colección, determinada por el Dr Walther Horn.

***Cicindela trifasciata* FABRICIUS.**

Maroni, Guayana (Ex dupl. Coll. Ed. Fleutiaux).

La existencia de esta especie sobre la costa continental de la América del Sur ha sido considerada como inexacta. El hecho de que mi ejemplar proceda de la Co-

lección de M. Ed. Fleutiaux me induce a dejar constancia de la procedencia que indica la etiqueta que lleva en el alfiler.

**Cicindela ramosa BRULLÉ.**

Río Cuarto, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina.

**Cicindela mixtula W. HORN.**

Río Cuarto, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina.

El Sr. G. Pellerano me ha proporcionado una lista de los Cicindelidæ en su Colección, y entre ellas encuentro referencias a las dos especies últimas mencionadas, como procedentes de Río Cuarto. Esta localidad parece precisar el extremo N.O. de dispersión de la *C. ramosa* y el extremo S.E. de la *C. mixtula*.

Santiago, 18 de Junio de 1930.

