

SOBRE ALGUNAS AVES DE ATACAMA

Por

E n r i q u e E r n e s t o G I G O U X

Jefe de la Sección Zoológica del Museo Nacional

Fam. Hirundinidae.

Todas las especies de golondrinas que hay en el país, son comunes a la provincia de Atacama, viéndose siempre algunas casi en todo tiempo.

Por falta de una mejor observación no ha sido posible establecer cuales son las que predominan como más o menos residentes o permanecen más tiempo y cuáles las que al ausentarse vuelven primero, si la *Tachycineta albiventris* Bodd., *T. Leucopyga* Meyen. *Atticora cuanoleuca* Vieill... *Hirundo rustica* L. o *Progne Furcata* Baird, que llega a Chile, y que se vé allá confundida en la apariencia con las otras especies.

Fam. Turdidae.

El Zorzal, *Turdus Felklandicus* King. Es escaso. En los valles se vé ocasionalmente de a uno dos durante el verano, pero en algunos años durante el invierno se ven hasta cerca de la costa en igual número y nunca en más cantidad.

Fam. Mimidae.

La Tenca, *Mimus thenca* Mol.

Es escasa. En algunas partes suelen verse en ocasiones de a dos o cuatro.

En Agosto de 1892 vi en el mineral de Chañarillo algunas que vivian familiarmente en un pimiento (*Schinus molle*) del pequeño jardín de una casa, bajando a comer con las aves domesticas, para volver a su árbol y cantar todo el tiempo.

Es interesante notar que esas tencas tuvieron que abandonar el conveniente valle distante para ir a residir a un lugar desventajoso para ellas.

Fam. Troglodytidae

El Chercan o Chircan. *Cisthotorus platensis* Lath.

Esta avecita útil que con mucha razón ha sido considerada la mejor cantora de nuestras aves, por la melodía de sus trinos y la variedad de tonos de su voz, es allá común y residente.

Fam. Icteridae

La Loica. *Trupialis militaris* Lin.

Es residente aunque escasa. No se ve, sino aislada o por parejas.

El Trile o Til. *Agelaeus thilius* Mol.

Común y residente. Vuela en pequeñas bandadas en las vegas y maizales.

El Tordo. *Curaeus aterrimus* Kittl.

Puede decirse que esta ave casi no vive en Atacama. En el sur de la provincia es escasa y las que se ven en el norte se podría asegurar que se han escapado de una jaula.

Fam. Fringillidae

El Jilguero común. *Chrysomitris barbata* Mol.

A pesar de su nombre nunca ha sido muy común para poderse ver en bandadas apreciables por su número. Lo frecuente es verlo aislado, por parejas o grupos reducidos, y especialmente en invierno.

El Jilguero de la cordillera. *Chrysomitris atrata* D'Orb. y Lafr.

No se vé nunca en verano y aparece en los valles sólo cuando el invierno ha sido muy frío, y en pequeños grupos. Los he visto llegar hasta muy cerca de la costa y comer las semillas aún verdes del ñilgüe, (*Sonchus oleraceus*).

El Chirigüe. *Sycalis arvensis* Kittl. Escaso en verano, pero en invierno llega en grandes bandadas y permanece en los campos y valles hasta que pasan los frios.

El Chirigüe de la cordillera. Llamado vulgarmente *Chipipe*. *Pseudochloris aureiventris* Ph.

Esta avecita que tiene un olor característico desagradable y que anuncia su llegada con su canto continuo, no se vé en verano. Por bandadas aparece en invierno y van de preferencia a posarse sobre las higueras ya sin hojas, para comer los higos secos que han quedado sin caer.

En los minerales o faenas mineras donde el agua es escasa, se les vé bebiendo las gotas que salen de alguna cañería o las que se filtran de algún barril, no importa que esté sobre el lomo de algún animal de carga.

Desaparecen en primavera.

El Yal. Conocido en el centro del país con el nombre de *Rara negra*. *Phrygillus fructiceti* Kittl.

Es ave residente en los campos y relativamente abundante. Prefiere para vivir las llanuras con vegetación y la falda de los cerros, donde se vén a los machos repitiendo, al parecer muy afanosos, las notas breves de su canto agradable.

El Yal chico. Pico amarillo y Pico de *mei* de los campesinos. *Phrygilus alaudinus* Kittl.

Lo normal es verlo por parejas en los campos, potreros talados y hasta en las cercanías del mar. Entre los mineros suelen llamarlo *Juicio*, porque creen oír esta palabra en su grito.

El Cometocino. Llamado Chanchito en el centro y sur del país. *Phrygilus gayi* Eyd. Esta linda avecita es rara en verano, pero se vé con frecuencia en invierno, lo mismo que la especie *P. aldunatei* Gay, siempre aisladas o en pequeños grupos.

La Diuca. *Diuca grisea* Less.

Residente y abundante, común en las casas, jardines y huertos. Esta avecita tan popular y apreciada por su celebrado canto matinal y vespertino también, vá siendo desalojada en todas partes por los gorriones, que comen sus huevos, matan sus hijuelos y ocupan sus nidos.

El Chincol o Chingol. *Zonotrichia pileata* Bodd.

Tan común y residente como la diuca, es otra avecita combatida por los gorriones, que se han multiplicado en más abundancia que la conveniente.

Fam. Columbidae.

La Torcaza. *Columba araucana* Less.

Es especie bastante rara, que sólo se vé algunas veces durante los inviernos muy frios, y en muy poco número.

Fam. Peristeridae.

La tórtola común. Llamada también *Cuyuca*. *Zenaida maculata* Vieill.

En los años con inviernos muy rigurosos, llegan en grandes bandadas a los valles, volando en la mañana en un sentido y en la tarde en el invierno. Unas pocas quedan como residentes y anidan hasta en los árboles de las quintas.

La Tórtola cuyana. *Columbala picui* Temm.

Sólo se vé en los valles y campos vecinos a la cordillera. Hacia el centro y cercanías de la costa no se encuentra sino como una rareza.

La Tórtola cuyana. *Metriopelia aymara* Knip. y Prev. Suele verse algunos años durante el invierno.

La Tórtola de la cordillera. *Metriopelia melanoptera* Mol.

Lo mismo que la anterior sólo se vé algunas veces.

Fam. Thinocoridae.

La Perdiz de la cordillera. *Attagis gayi* Geoffr.

Residente en la parte alta de los cerros de algunos lugares, ya sea del interior o de la costa. Debe tener muchos enemigos o vivir en muy malas condiciones, porque no se multiplica en forma apreciable y de acuerdo con el tiempo transcurrido desde que se vieron las primeras familias en algunas localidades. Siempre se las encuentra en poco número y en los sitios más altos.

La Perdicitita. Llamada también *Palco* o *Palquito*. *Thinocorus rumicivorus* Eschs.

Se halla en todos los campos durante la primavera, ya sea por parejas o pequeñas bandadas, lo mismo cerca de la cordillera que a inmediaciones de la costa.