


## NUEVAS FORMAS DE COLEOPTEROS CHILENOS

POR EL

DR. E. D. DALLAS

1. *Ceroglossus gloriosus* Gerst. ab. **debilicostis** nov. ab.  
 Los *Ceroglossus* son sumamente variables en su ornamentación elitral y ya hemos descrito en esta misma Revista la var. *diversiestriata* y la ab. *Porteri*; ahora señalaremos otra



**Fig. 17.**—*Chia sognathus granti* Steph: 1. ejemplar bien desarrollado.—2. var. *pygmaea*, nov. var.

(Foto del laboratorio MARA del Prof. Dr. Yepes)

forma que proviene de un gran lote de estos carábidos que recibimos en 1920 del señor B. Herrmann.

Es un *Ceroglossus gloriosus* Gertst. macho, de 28 milímetros de longitud y de aspecto y coloración normal que presenta

como característica una atenuación muy acentuada de la totalidad de la escultura elitral, en ambos lados, siendo las costillas o estrías poco marcadas, algo adelgazadas y casi borradas, asemejándose su color al del fondo con el que aparecen fundirse; los intervalos son menos profundos.

Proponemos para esta forma la denominación de ab. *debilicostis* nov. ab.

Patria: Victoria (Chile)

Un ejemplar en nuestra colección.

2. *Chiasognathus Granti* Steph. var. **pygamea**, n. var.

Es una forma que se distingue de la típica por sus dimensiones y menor desarrollo de las mandíbulas.

En los ejemplares bien desarrollados las mandíbulas alcanzan un tamaño superior al del cuerpo; en nuestro ejemplar apenas llega a la mitad.

La coloración es típica; las mandíbulas son poco encorvadas y los dientes pequeños.

Se trata de una forma microsómica tal vez por insuficiente alimentación de la larva; las variaciones de la talla de los lucidos han sido bien estudiadas por el Dr. Houlbert, quién estableció, en un estudio publicado en «Insecta» las leyes del desarrollo y variación.

Dimensiones:

LARGO TOTAL	ANTENAS	CUERPO	ANCHO DEL CUERPO
Ejemplar normal... 66 mm.	35 mm.	31 mm.	18 mm.
VAR. <i>pygmaea</i> ... 32 mm.	10 mm.	22 mm.	9 mm.

Habitat.: Chile; A. Faz. Legit 3. XII, 1927.

Tipo ♂ en nuestra col.

3. *Ceroglossus chilensis* nov. var. **victoriensis** B. V. Bodemeyer et Roeschke *in litt.*

El señor Bodo von Bodemeyer de Berlín nos comunicó en 1924 esta nueva raza geográfica de la que nos envió tres cotipos. La muerte de B. von Bodemeyer nos privó de recibir la descripción que posiblemente publicó después el célebre carabólogo Dr. Roeschke en alguna revista europea, por lo cual depositamos un cotipo en la colección del INSTITUTO DE ZOOLOGÍA GENERAL Y SISTEMÁTICA que dirige el Doctor Carlos E. Porter.

