

# AVES DE RIBERA DE LA PROVINCIA DE ATACAMA

POR

ENRIQUE ERNESTO GIGOUX

Jefe de la Sección Zoológica del Museo Nacional

El mayor número de especies de este orden se vé con más frecuencia, y a veces en más cantidad en las orillas del mar, que en la inmediata vecindad de los ríos o lagunas.

## FAMILIA CHARADIIDAE

EL PILPILÉN NEGRO. *Haematopus niger*, VAR. *atra* LESS

En las playas se le vé más comúnmente sobre las piedras que están fuera o dentro del agua, buscando su alimento que consiste en pequeñas moluscos, crustáceos y gusanos. Anda solo o por parejas, y por lo general casi nunca más de cuatro. Y cuando levanta el vuelo, que siempre lo dirige hacia el mar, porque vé la proximidad de algún peligro, lanza una serie de gritos agudos y vá a posarse a un sitio distinto.

EL PILPILÉN OVERO O BLANCO. *Haematopus palliatus* VAR. *frazari* BREWT.

Aunque en su plumaje predomina el color negro sobre el blanco, los pescadores lo llaman así para distinguirlo del anterior. A uno y a otro se les llama «Ostreros», por más que no comen ostras, porque generalmente no están a su alcance, y no las hay en muchas partes. En cambio, pueden desprender de las rocas los moluscos univalvos, gracias a la forma apropiada del pico.

EL POLLO DEL CAMPO. *Oreophilus ruficollis* WAGL.

No he visto nunca esta avecita en las mismas playas, ni orillas de lagunas o arroyos, pero sí en los campos y arenales marítimos, durante la primavera, corriendo por entre las yerbas, solo o por parejas, cazando insectos.



EL QUELTEGÜE. **Belonopterus cayennensis** VAR. **chilensis**  
MOL.

No es común en la provincia y nunca lo he visto libre. Con mucha extrañeza recibí una vez en Caldera un ejemplar cazado en la Hacienda de Toledo, cerca de Copiapó, en cuyo valle se me ha dicho suele verse alguno.

**Squatarola helvetica** L.

Casi siempre aislada se vé en las playas solitarias,

**Charadrius dominicus** MÜLLER.

Como la anterior.

EL POLLO NEGRO. **Eudromias modestus** LICHT.

Solo o en pequeñas bandadas se vé entre las piedras de las playas.

EL POLLO, llamado tambien «Angelito». **Aegialitis falklandica** LATH.

Es más frecuente verlo en las playas en numerosas bandadas, que aislado, corriendo delante o detrás de la ola, según su avance o su retirada.

FAMILIA *SCOLOPACIDAE*

LA PERDICILLA. PERDIZ DE MAR. **Numenius hudsonicus**  
LATH.

Siempre en poco número o sola, esta ave vigilante y cosmopolita casi, se le vé todo el año en las playas. Y con su grito penetrante pone en alarma a todas las demás aves del contorno, que levantan el vuelo junto con ella ante la señal de peligro que dan oportunamente.

LA AVECASINA DE MAR. **Limosa hudsonica** LATH.

Esta ave que se parece a la perdicilla en tamaño, plumaje y costumbres, se diferencia sólo en el pico, que en los *Numenius* es curvo y en las *Limosas* es recto.

No es común como aquella y puede decirse que es rara en esas playas.



EL REVUELVE PIEDRAS O VUELVE PIEDRAS. **Calidris arenaria** L.

Esta especie cosmopolita se le vé lo mismo aislada o reunida en pequeños grupos.

EL POLLO DE MAR. **Arenaria interpres** L.

Casi tan extendida como la especie anterior es siempre común en todo tiempo, pero en poco número.

EL POROTERO. **Gallinago paraguayae** VIEILL.

Esta ave conocida también con el nombre de Avecasina, es escasa, y se encuentra igualmente en los sitios húmedos de los campos que en las playas.

EL PITOTOI CHICO. **Totanus flavipes**, GM.

Es escaso.

EL POLLITO NEGRO. **Tringa maculata** VIEILL.

No es muy común.

**Tringa bairdi**.—Muy escaso.

**Euremetes pusillus** L.—No es frecuente verlo.

**Phalaropus tricolor**. VIEILL.

Es bastante escaso, viéndosele casi en invierno únicamente.

#### FAMILIA RALLIDAE

EL PIDÉN. **Rallus rytirhynchus**, VAR. **sanguinolenta** Sw.

Común en las vegas, sin ser muy abundante.

LA TAGÜITA. **Porphyrops melanops** VIEILL.

Como la especie anterior.

LA TAGUA. **Fulica ardesiaca** TSCH.

LA TAGUA. **Fulica armillata** VIEILL.

Estas dos especies, lo mismo que la Tagüita y el Pidén, se



encuentran en todas las vegas de la provincia, viviendo entre los totorales, de donde se les vé salir solas o por parejas.

SANTIAGO, Enero de 1933.

