

## AVIFAUNA DE CHILOE (\*)

POR EL

R. P. RAFAEL HOUSSE

Habiendo recorrido, en Diciembre de 1931 y Enero de 1932, las costas e islas chilotas, desde Puerto Montt hasta más abajo del grado 42 de latitud, pude comprobar la existencia de las aves siguientes:

### TREPADORAS

1. *Choroy*: *Henicognathus leptorhynchus* (King.). Bastante común en el continente, cerros y selvas.
2. *Pitigüe*: *Colaptes pitius* (Molina). Común, hasta cerca del mar.
3. *Carpintero grande*: Gallo del monte. *Campophilus magellanicus* (King.). Común en las selvas.

### SINDACTILAS

4. *Martín-pescador*: *Ceryle torquata* (Linneo). He divisado dos sobre volando a la orilla del mar.

### TENUIRROSTRAS

5. *Picaflor común*: pinga: *Eustephanus galeritus* (Molina). Común.

### FISIRROSTRAS

6. *Golondrina*, *Tachycineta meyeri* (Bp.). No abunda en el litoral del continente.

### CONIRROSTRAS

7. *Chercán negro*: *Scytalopus magellanicus*. (Gmelin). No es raro en los matorrales.
8. *Chucao*: *Pteroptochus rubecula* (Kittl.). Sumamente

---

(\*) Leído en sesión general de fecha 21 de Junio de 1933, de la *Sociedad Chilena de Historia Natural*.

común, hasta entre los matorrales cercanos al mar. Ave agorera.

9. *Huez-huez*: *huid-huid*: *Hylactes tarnii* (King). Menos abundante.

10. *Rara*: *Phytotoma rara* (Molina). Común en las islas y litorales del continente.

11. *Lloica*: *Leistes superciliaris* (Bp.). Es más bien escasa.

12. *Trile*: *Ageloeus thilius* (Molina). Algo común en los pajonales.

13. *Cometocino, quechani*: *Phrygilus Gayi Aldunatei* (Gay). Abunda en islas y continente.

14. *Tordo*: *Curaeus aterrimus* (Kittl.). No es abundante; sólo lo ví en el continente.

15. *Jilguero*: *Chrysomitris anthracina* (Philippi). Común en el continente e islas.

16. *Diuca*: *Diuca grisea* (Lesson). No abunda en ninguna parte, y en algunas es muy escasa.

17. *Chincol, Copete*: *Zonotrichia pileata* (Bodd.). Común, sin ser numeroso.

#### COLUMBINAS

18. *Torcaza*: *Columba araucana* (Lesson). Abunda en el continente más que en las islas.

#### DENTIRROSTRAS

19. *Tijerita, Choque* = *Leptasthenura aegithaloides* (Kittl.) No es rara.

20. *Colilarga del sur*: *Silviorthorhynchus desmursi* (Vieillot). No abunda entre los matorrales, en la orilla de las selvas del continente.

21. *Rayadito*: *Oxyurus spinicauda* (Gmelin). Se halla en las faldas de las montañas.

22. *Molinero grande*: *Cinclodes nigrofumosus* (D'Orbigny). Abunda en todas partes; anida y pernocta en ermitas y capillas.

23. *Camíneros*: *Raiquén*. *Geositta cunicularia*. (Vieillot). Común.

24. *Zorzal*: *Huilqui-Turdus falklandicus* (Gmelin). No abunda.

25. *Diucón*: *Hulco-Taenioptera pyrope* (Kittl.). Escaso.

26. *Dormilona*: *Muscisaxicola maclovina* (Garnier). Sólo en el continente.

27. *Animita*: *Lessonia nigra* (Bodd.). Escasa.

28. *Fío-fío*: *Elainea albiceps*. (D'Orbigny). Común.

29. *Chercán*: Lliquilliqui, raspatorillas. *Troglodytes magellanicus* (Gould). Común.

30. *Caminante*: *Anthus correndera* (Vieillot). Se vé en el continente.

### RAPACES

31. *Gallinazo*: *Cathartes atratus* (Bartram). Escaso en las costas e islas.

32. *Jote*: *Cathartes aura* (Linneo). Escaso, por la falta de presas.

33. *Traro*: Huarro-Polyborus thrarus (Molina). Abunda.

34. *Tiuque*: *Milvago chimango* (Vieillot). Común, sin ser abundante.

25. *Aguilucho*: Ñanco, pihuel: *Buteo erythronotus* (King). Común.

36. *Peuco*: *Buteo ventralis* (Gould). Bastante escaso.

37. *Cernícalo*: Quechiquechi: *Tinnunculus sparverius* (Gmelin). No muy común.

38. *Tucuqueré*: *Bubo magellanicus* (Gmelin). No parece ser muy común.

39. *Chuncho*: Deñi: *Glaucidium nanum* (King). Común.

40. *Lechuza*: coo: *Strix flammea* (Linneo). Común.

### ZANCUDAS LONGIRROSTRAS

41. *Bandurria*: truthraque: *Theristicus melanopis* (Gmelin). Común.

42. *Zarapito*: *Numenius borealis* (Torst). Común en islas y continente.

43. *Avecasina de mar*: *Limosa hudsonica* (Lath). Más rara.

44. *Pollo de mar*: coiquito: *Arenaria interpres* (Lessius). Algunas bandadas.

45. *Angelito*: *Aegialitis falklandicus* (Latham). Algunos grupos.

46. *Gallereta*: *Plegadis falcinellus* (Linneo). En los esteros continentales, según referencias de los habitantes.

47. *Porotera*: *Gallinago paraguayae* (Vieillot). Bastante común.

### PRESIRROSTRAS

48. *Queltegüe*: threl: *Belonopterus cayennensis* (Molina). Común.

49. *Pilpilén*: *Haematopus leucopus* (Gaim). Común en todas las playas.

50. *Pilpilén negro*: *Haematopus niger* (Pall). Más raro.  
 51. *Pollo negro*: *Eudromias modestus* (Licht.). Escaso.

## CULTRIRROSTRAS

52. *Huairavo*: vanda: *Nycticorax cynocephalus* (Molina). Común.  
 53. *Garza*: *Ardea cocoi* (Linneo). No es muy común, y sólo se ve en las cercanías de los esteros del continente.  
 54. *Garceta*: *Ardea candidissima* (Gmelin). Lo mismo que la garza.

## MACRODÁCTILAS

55. *Pidén*: cotuta: *Rallus rhytirynchus* (Vieillot). Común en el continente.  
 56. *Tagüita*: *Porphyriops melanops* (Vieillot). Algo escasa, y en el continente.  
 57. *Tagua*: *Fulica armillata* (Vieillot). Lo mismo.

## PALMÍPEDAS LAMELIRROSTRAS

58. *Cisne de cuello negro*: bonete: *Cignus nigricollis* (Gmelin). Bastante común en lagunas y esteros.  
 59. *Coscoroba*: *Coscoroba candida* (Vieillot). Más escaso.  
 60. *Cagüe*: *Chloëphaga hybrida* (Molina). He visto uno que otro.  
 61. *Canquén*: *Chloëphaga poliocephala* (Sc!.). No he divisado ninguno, pero los habitantes me afirmaron en varias partes su existencia abundante.  
 62. *Piuquén*: *Chloëphaga melanoptera* (Eyt). Lo mismo.  
 63. *Pato real*: *Mareca sibilatrix* (Poepp.). Suele verse en las lagunas y esteros.  
 64. *Pato cuchara*: *Spatula platalea* (Vieillot). Lo mismo.  
 65. *Quetru*: *Tachyeres cinereus* (Gmelin). He visto sólo nueve.  
 66. *Flamenco*: *Phoenicopterus chilensis* (Molina). Aparece viajando

## TOTIPALMAS

67. *Alcatraz*: thage: *Pelecanus thagus* (Molina). Pocos se ven y aislados.  
 68. *Lile negro*: *Phalacrocorax atriceps* (King). Escaso.  
 69. *Lile imperial*: *Phalacrocorax magellanicus* (Gmelin). Común, sin abundar.

70. *Lile común*: Phalacrocorax Gaimardi (Garnot). Más bien escaso.
71. *Yeco vulgar*: Phalacrocorax vigus (Vieillot). Común.
72. *Piquero*: Sula variegata (Tsch). Raro.

#### LONGIPENNES

73. *Cagüil*: Larus belcheri (Vigors). Encontré dos bandadas de unos treinta individuos.
74. *Gaviota*: Larus dominicanus (Licht). A lo largo del continente es escasa.
75. *Gaviotín del sur*: Leucophoens scoresbyi (Trail). Abunda en ciertas playas.
76. *Fardela*: Puffinus creatopus (Cones). Hallé una bandada enorme en viaje.
77. *Yegua*: Puffinus griseus (Gmelin). En Calbuco divisé muchas.
78. *Fardelón*: Ossifraga gigantea (Gmelin). Hallé uno que otro.

#### BRAQUIPTERAS

79. *Blanquillo-coico*: Podiceps calipareus (Lessius). Común en los estuarios.
80. *Huala*: Oecmophorus major (Bodd.). Lo mismo, pero es mas escaso.
81. *Potranca*: Spheniscus magellanicus (Forst). Comun sin ser numerosa.

LOS ANGELES, 14 de Diciembre de 1932.

