

## EL GÉNERO NECTOCADER DRAKE, EN CHILE

POR EL

Prof. Dr. CARLOS E. PORTER

Director del Instituto de Zoología General y Sistemática

Los Tingididae de Chile son muy pocos y muy imperfectamente conocidos.

GAY menciona una sola especie del género de Tingídido que encabeza estas líneas con el nombre de *Piesma tingitoides*, la que fué descripta por Spinola (1852).

Once años después aparece descripta la segunda especie chilena, que Signoret denominó *Cantacader germaini*.

En la Sinopsis de los Hemip. de Chile que el finado sabio entomólogo Prof. E. C. Reed publicó en la *Revista Chilena de Historia Natural* (1898-1901), incluye ambas especies en *Cantacader* Amiot et Serville y agrega la descripción de una 3.<sup>a</sup> especie, mayor (de 5 mm.), que denomina *C. chilensis*, pero advierte que sólo provisoriamente la incluye en *Cantacader*; fué encontrada en Cauquenes.

Yo no he visto todavía esta última especie ni tampoco la *Piesma tingitoides* de Spinola, y sólo poseo *Cantacader Germaini* SIGN.

En 1928 el señor C. J. DRAKE publicó una interesante nota sobre unos pocos Tingídidos neotrópicos, después de examinar algún material de México, Brasil, Chile y Cuba. Ahí crea un género nuevo (**Nectocader**), que difiere de *Cantacader*, principalmente por su «cabeza más prominente, por el borde posterior del pronoto subtruncado (ya débilmente excavado o ligeramente redondeado) y por tener el escutelo a la vista».

Atenido a los caracteres que dá el Dr. Drake y de acuerdo con lo dicho por el Prof. Reed sobre su especie *C. chilensis*, pienso que dentro del género *Nectocader* Drake sólo pueden incluirse por hoy seguramente, además de una especie del Brasil (*Nectocader gounelli* Drake, 1923), las dos siguientes chilenas, cuya sinonimia y distribución viene en seguida:

1.—**Nectocader tingitoides** (SPINOLA) DRAKE

1852.—*Piesma tingitoides* SPIN., Gay, Hist. Fis. y Polit. Chile, Zool. VII, p. 200.

1863.—*Cantacader tingitoides* SIGN., Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, p. 575.

1900.—*Cantacader tingitoides* REED, Rev. Ch. Hist. Nat., año IV, p. 179.

1928.—*Nectocader tingitoides* (SPIN.), DRAKE, Iowa State Coll. Journ. Sc., III, N.º 1, p. 42.

Gay dice que «se halla en las provincias centrales».

2.—**Nectocader Germaini** (SIGN.) DRAKE

1863.—*Cantacader Germaini* SIGN., Ann. Soc. Ent. Fr. (4), III, p. 586.

1900.—*Cantacader Germaini* REED, Rev. Ch. Hist. Nat., año IV, p. 179.

1928.—*Nectocader Germaini* (SIGN), DRAKE, Iowa St. Coll. Journ. Sc., III, N.º 1, p. 41.

El señor Reed dice que ha encontrado la especie en las provincias centrales.

Por mi parte los dos ejemplares de mi colección provienen de una rápida excursión mía a La Ligua (II, 1909) y de un obsequio del Sr. Raf. Barros, quién además de otros insectos lo encontró en Los Andes (I-1921).

Interesante sería dar con la otra especie descrita por el Prof. E. C. Reed y fijar así el género en que hoy le correspondería quedar después de la creación de nuevos géneros.

Instituto de Zoología General y Sistemática,

SANTIAGO, 4 de Abril de 1933.

