NUEVA VARIEDAD DE VALDIVIA GAYANA

POR

HUGO GUNKEL L.

Académico de Número de la Chilena de Ciencias Naturales

Decíamos en un estudio anterior (*), que el Dr. C. Reiche, en su obra *Estudios Críticos sobre la Flora Chilena*, se concretaba a indicar que la saxifragácea, cuyo nombre científico encabeza estas líneas, crece *en el litoral de la provincia de Valdivia*, sin indicar localidad. Nosotros la habíamos encontrado sólo a orillas de la bahía de Corral, al sur de este pueblo.

Hace algún tiempo atrás, nuestro activo colaborador científico, Rev. Padre Atanasio Hollermayer, nos comunicó por carta que había encontrado esta misma planta cerca de la Barra del Río Bueno y, en efecto, al poco tiempo, recibimos algunas muestras de esta especie, confirmando así el hallazgo hecho por el Rev. P. Hollermayer.

Crecían en el Fundo Venecia, lado norte de la Barra del Río Bueno, provincia de Valdivia, a 10 metros de altura sobre el nivel del mar, sobre una pared húmeda, cerca de una caída de agua, entre varias plantas menores. Formaban varias colonias (en número de tres), de 12 a 15 ejemplares cada una.

Los ejemplares más grandes alcanzaban una altura de 40 y aún más centímetros y corresponden perfectamente a nuestra variedad *robusta*.

En nuestro Herbario se encuentran depositados los siguientes especímenes de la región de la Barra del Río Bueno, de la Valdivia Gayana Remy:

Hollermayer N.° 658: Barra, 18-XII-1930. (Herb. Gunckel N.° 4687); Hollermayer N.° 658 *a*): La Barra, 14-X-1931. (Herb. Gunckel N.° 3161); Hollermayer N.° 600: La Barra, 14-X-1931 (Herb. Gunckel N.° 3162) y Hollermayer N.° 658 *b*): Barra, 2-IX-1932. (Herb. Gunckel, N.° 3751).

El ejemplar Herb. Gunckel N.° 3162 es especialmente interesante, porque representa, hasta cierto punto, una variedad intermedia entre las dos que conocemos para la región corralense.

(*) GUNCKEL L., Hugo —*Contribución al conocimiento de la Flora Valdiviana* (Quinta Comunicación): Valdivia Gayana Remy, en Rev. Universitaria (Universidad Católica de Santiago de Chile), año XVI, N.° 5 y 6 (Agosto y Septiembre de 1931), pág. 510-517.

Denominamos a esta nueva variedad con el nombre de **Hollermayeri,** *n. variedad,* en honor de su descubridor, a quien las ciencias naturales deben ya tantos hallazgos de especies nuevas, tanto de plantas, como de insectos.

Fig. 6.—*Valdivia Gayana* Rémy, var. *Hollermayeri* Gunckel. n. var.

Fotografía de este ejemplar queda depositado en el Gray Herbarium de la Universidad de Harvard, Cambridge, Mass. U. S. A., y en el Herbario particular de don Gualterio Looser, en Santiago de Chile.

Posee una roseta típica formada de 8 a 10 hojas, que alcanzan un largo de 16 cm. por 6.3 cm. de ancho (tamaño de la hoja más grande) y tienen un tallo leñoso de 6,6 cm. de largo y de un grueso de 3-4 milímetros, un ejemplar; el otro, de esta misma cosecha posee un tallo más pequeño que alcanza sólo a un largo de 14 milímetros.

A continuación daremos una clave analítica de las variedades hasta ahora conocidas de la Valdivia Gayana Reny:

A). Sin tallo propiamente tal, sólo roseta foliar: especie *típica.*

B). Con tallo leñoso:

a) tallo hasta 7 cm. de largo, con roseta de hojas en su extremo sin ramificación ..... var. *Hollermayeri*

b) tallo largo, más de 7 cm., ramificado, con varias rosetas ..... var. *robusta.*

CORRAL, 5 de Abril de 1934.