EL CHORLO CALIDRIS (*) CANUTUS RUFUS, WILSON

DEBE SER INCLUÍDO EN LA LISTA DE AVES CHILENAS

POR EL

DR. R. A. PHILIPPI B.

Jefe de la Sección Aves Chilenas del Museo Nacional de Chile.

De las numerosas especies de chorlos de Norte-América que vienen a pasar el invierno al continente sudamericano, 20 han sido señaladas en Chile y son las siguientes: Phalaropus fu-

---

(*) El género *Calidris* debe reemplazar a los géneros Tringa, L. y Canutus, Brehm. Oberholver. The Auk. 1920. p. 452. (Dabbene. «El Hornero». Vol. IX. p. 120.

icarius, Steganopus tricolor, Pisobia melanotus, Pisobia fuscicollis, Pisobia bairdi, Eurenetes pusillus, Crocethia alba, Limosa haemastica, Totanus melanoleucos, Totanus flavipes, Bartramia longicauda, Numenius hudsonicus, Numenius borealis, Pluvialis dominica dominica, Aphriza virgata, Charadrius alexandrinus occidentalis, Charadrius semipalmatus, Arenaria interpres morinella, Squatarola squatarola, cynosurae y Oxyechus vociferus peruvianus.

De las especies mencionadas hay algunas que nos visitan todos los años en regular número y otras que pueden calificarse de visitantes casuales. A la lista de estas últimas debemos agregar el chorlo Calidris canutus rufus, que nos ocupa en este artículo



Fig. 7.—*Calidris canutus rufus*, Wilson

Al revisar las aves de la colección Frobeen en el Museo Nacional, descubrí un ejemplar de chorlo embalsamado y clasificado como «vuelvepiedras», Calidris arenaria, L. Inmediatamente de observarlo con más atención pensamos en un error pues el ejemplar a que nos referimos es tres veces mayor que nuestro vulgar pollito de mar (Crocethia alba o Calidris arenaria). Después de cierto trabajo logramos identificarlo como perteneciente a la especie *Calidris Canutus Rufus*, Wilson. La labor se facilitó al descubrir en la colección de aves extranjeras otro ejemplar, cazado en Alemania, pero en plumaje de

verano. El ejemplar de la colección Frobeen es un macho adulto en pleno plumaje de invierno y fué cazado en Arica en Noviembre de 1851.

Poco tiempo después, revisando la colección ornitológica del Prof. Carlos S. Reed, encontramos otro chorlo signado bajo el N.° 2759. y sin clasificar. Este reveló ser perteneciente también a la especie *Calidris Canutus Rufus*, Wilson. Se trata de una hembra adulta, en plumaje de invierno, y cazada en la desembocadura del río Maipo (Llolleo, Prov. Santiago), el 15 de Noviembre de 1930. Ignoramos los detalles de su captura. Este cuero me fué obsequiado por el Prof. C. S. Reed y figura en mi colección particular con el N.° 521.

Damos enseguida algunos datos referente a esta interesante ave:

Calidris canutus rufus, Wilson. Chorlo en Argentina, Knot en Norte América.

Canutus canutus, Linnaeus. 1758.
Calidris grisea, Brisson. 1760.
Tringa grisea, Gmelin. 1789.
Tringa canutus, Leach. 1816.
Tringa cinerea, Wilson. 1813.
Tringa rufa, Wilson. 1813.
Tringa islandica, Leach. 1816.
Canutus cinereus, Brehm. 1831.
Calidris canutus, Cuvier. 1817.
Canutus rufus rodgersi, Matthews. 1913.

Este chorlo acostumbra andar reunido en bandadas, a veces muy numerosas, Prefiere las playas marinas a los ríos o lagunas. El plumaje que presentan en invierno es totalmente diferente al plumaje nupcial de verano. En verano tienen toda la parte anterior e inferior, hasta la parte alta del abdomen, de un color ladrillo vinoso. Este último color desaparece totalmente en invierno y es reemplazado por blanco puro en pecho y abdomen.

Las medidas principales son, según Ridgway, las siguientes: Macho adulto: Ala, 162,7; cola, 62,2; culmen descubierto, 39,9; tarso, 31; dedo medio, 21,7.

Hembra adulta: Ala, 166,3; cola, 62,3; culmen descubierto, 36,3; tarso, 31,5; dedo medio, 21,6.

Calidris canutus es un chorlo cosmopolita, que nidifica en las tundras de la región circumpolar ártica para emigrar en invierno al hemisferio sur.

Está dividido en dos subespecies, una que habita América y la otra que habita el viejo mundo. La subespecie americana es Calidris canutus rufus. Matthews describe la subespecie

odgersi, que debe considerarse dudosa. Habita el Asia Oriental y emigra en invierno a Australia.

Sus sitios de nidificación más conocidos son los siguientes: Ellesmere Land; Crinnell Land, cerca de Fort Conger, lat. 81° 44′ N.; isla Melville; península de Melville; Smith Sound; Groenlandia; Islandia; península de Taymir en Siberia; y probablemente en las islas de Nueva Siberia.

En invierno emigra al sur, siguiendo generalmente las costas.

En esta época se encuentra en Africa del Sur, India, Australia, Nueva Zelanda y Sud-América.

En Sud-América ha sido señalado en Ecuador (Chapman); Perú (Santa Lucía); en Brasil (Iguapé, estado de Sao Paulo). En la república Argentina es un visitante escaso según el Prof. R. Dabbene. Ha sido observado allí en la parte oriental, especialmente en la costa atlántica desde Buenos Aires a Tierra del Fuego.

Con esta publicación creemos contribuir en algo al estudio de las migraciones de los chorlos, que constituyen uno de los problemas biológicos de mayor interés. Precisamente la especie Calidris canutus rufus ha sido muy poco estudiada en su distribución austral. Parece que hasta la fecha no había sido señalada en Chile.

BIBLIOGRAFIA

Cat. of Birds. Brit. Museum. Vol. XXIV. p. 593 y 768.

Ridgway.—The Birds of North and Middle América. Part VIII. 1919, p. 231.

Wetmore.—Our Migrant Shorebirds in Southern South América. Oct. 1927. U. S. Dept. of Agriculture. Techn. Bull. N.° 26.

R. Dabbene.—Notas sobre los Chorlos de Norte América. 1921. El Hornero. Vol. II. p. 120.

Bent.—Life Histories of North American Shore Birds. Part I. Bull. U. S. Nat. Mus. N.° 142. p. 131. 1927.

Cory.—Birds of Illinois ad Wisconsin. Field Museum, Chicago. Zoolog. Series. Vol. IX. 1909.