SOBRE BRACÓNIDOS CHILENOS DEL GENERO PERILITUS, NEES (1834)

POR EL

PROF. DR. CARLOS E. PORTER

Director del Instituto de Zoología General y Sistemática

Mis excursiones en Papudo y Constitución, aprovechando las vacaciones (Enero y Febrero), que me han permitido colectar en 1935 y el presente año muchos artrópodos, me ha proporcionado la ocasión de estudiar los grupos de mis aficiones y distribuir entre especialistas amigos lo que forma parte de sus especialidades respectivas. Así, he tenido el gusto de recibir ya buenas noticias acerca del resultado del estudio de los *Arácnidos* que confié al reputado aracnólogo brasilero Dr. C. de Mello-Leitao y el año entrante creo poder publicar otras determinaciones con novedades que se me comunica están en trabajo.

En esta pequeña nota voy a concretarme, por ahora, a indicar el hallazgo en latitudes muy distantes a las asignadas por SPINOLA, en Gay (1851), para dos de nuestros Bracónidos y para otra especie descrita por el que esto escribe, en 1926:

Perilitus maculicollis SPIN.—Gay da para esta especie como habitat Valdivia. Encontré una ♀ en los alrededores de Constitución, II-1935.

Perilitus Stuardoi PORTER.—Esta especie que describí en 1926, como habitando Santiago, según su descubridor (el Prof. Carlos Stuardo), la he cogido yo ahora en Papudo, I-1935.

Ilustraré esta breve nota con un dibujo a la cámara clara del ala anterior de la especie.

El ejemplar de Papudo (una ♀) presenta exactamente el colorido de los que sirvieron para su descripción en 1926.

Perilitus uncinatus SPIN.—Encontré una ♀ muerta al pie de una mata de Sinantérea en los alrededores de Constitución (II-1935). Había ahí ejemplares muertos y vivos del Coccinélido *Adalia deficiens* Muls., que abarca gran extensión de nuestro territorio.

No sería raro que esta especie ataque a nuestra *Adalia deficiens*, ya que otra de nuestras «chinitas» lo es por *Perilitus Stuardoi* PORTER, según lo observó el Prof. Carlos Stuardo en 1926.

En Estados Unidos el *P. americanus* ataca a Megilla maculata; y en Francia, según Bouvier, *P. brevicollis* a varios otros Coccinélidos.

Aprovecho esta notita para dar la lista y distribución en el país del género *Perilitus* Nees:

Perilitus trigonalis SPIN., Gay, Zool. 6, p. 524.

Esta especie habita, según Gay, el «norte de la República».

P. uncinatus SPIN.—Gay, Zool. 6, p. 525.

Gay cree haberlo encontrado en Longotoma, y dice que es escaso.



Fig. 20.—*Perilitus Stuardoi, Porter* Ala anterior, aumentada 23 mm. diám.

Yo lo he tomado en Apoquindo (I, 1926) y ahora en Constitución (alrededores). También lo he obtenido del Tomé, II, 1926 (Honorato, coll.)

P. maculicollis SPIN.—Gay, Zool. 6, p. 525.

Según Gay, se encuentra en Valdivia. — En Constitución (Porter).

P. glucinus SPIN.—Gay, Zool. 6, p. 526.

Gay dice: De San Carlos.

P. Stuardoi PORTER, Rev. Ch. Hist. Nat., XXX (1926), p. 259.

Cogido la primera vez en Santiago por el Prof. C. Stuardo (II, 1925).

Las cinco especies mencionadas han sido descriptas sobre hembras y hasta hoy no hemos visto los machos.

SANTIAGO DE CHILE, 10 de Abril de 1936.