

AVES OBSERVADAS EN MAULLÍN

POR

RAFAEL BARROS V.

Ingeniero Agrónomo U. C. - Biólogo a cargo del Bosque Santiago.

A fines de Mayo último tuve oportunidad de ir hasta Maullín, acompañando al Jefe del Departamento de Bienes Nacionales, don Carlos Silva Salinas y al Jefe de Bosques, don José Herrero. Iba comisionado para dirigir la iniciación de las plantaciones en las dunas, que, desde el mar llegan hasta cerca de la entrada del pueblo. El 22 llegamos a Puerto Montt ya entrada la noche, y el 23 a la 1.30 P. M. desembarcábamos en Maullín, después de haber navegado hora y media por el río de este nombre, en un vaporcito desde Puerto Toledo, un embarcadero sobre el río Gómez, afluente del Maullín, llamado pomposamente *puerto*, que dista dos horas en automóvil de Puerto Montt.

Todo me era nuevo desde Talca al sur; así los hermosos panoramas que a cada momento se sucedían, me llenaban de admiración y gozo; no dejé de lamentar, sin embargo, que la torpeza o la ambición del hombre haya destruído, a menudo sin necesidad, muchas de esas imponderables bellezas, que han requerido de la acción de siglos para formarse, como ciertos bosques de los cuales ni las valiosas maderas de roble, laurel, etc., se han utilizado, y donde el fuego ha sembrado la destrucción y la ruina.

Aproveché el viaje y mi estadía en Maullín, para observar ávidamente todas las aves que se presentaban ante mí. Doy una lista que comprende principalmente las que pude encontrar allá, desde el 23 de Mayo al 3 de Junio. Así cuando no indico sitio especial, me refiero a ese punto o al río Maullín.

ZORZAL, *Turdus falcklandii magellanicus* King. Era común, aunque en este tiempo no abundaba; sin embargo ví una bandada de más de cuarenta, el 31 de Mayo. Las bandadas de zozales, que raramente se presentan aquí en el centro del país, son frecuentes en el Sur; pero vuelan muy dispersas.

TENCA, TRENCA, *Mimus thenca* (Molina). No vive en la provincia de Llanquihue. De regreso, observé la primera tenca entre Gorbea y Pitrufquén.

CHERCÁN, *Troglodytes musculus chilensis* Lesson. Se mostraban algunos ejemplares. Obtuve una hembra.

CAMINANTE, *Anthus correndera chilensis* (Lesson). En di-

versas ocasiones ví ejemplares que pasaban volando cerca de mí, lanzando sus trinos inconfundibles, y que atribuí a esta especie.

COMETOCINO CHICO, o de la Patagonia, *Phrygilus patagonicus* Lowe. No era abundante; pero varias veces observé cometocinos en los árboles de los huertos del pueblo. Colecté una hembra.

DIUCA, *Diuca diuca* (Molina). Es residente; pero no abunda. Obtuve una hembra.

CHINCOL, *Zonotrichia capensis chilensis* (Meyen). Abundante en todas partes; ave residente. Colecté un ejemplar.

CHIRIHUE, *Sicalis luteola luteiventris* (Meyen). Varias veces se presentó esta especie en pequeñas bandadas.

TORDO, *Notiopsar curaeus* (Molina). Casi todos los días se veían grupos o pequeñas bandadas. Más al norte era más abundante; así, en Los Lagos volaba una numerosa bandada el 4 de Junio

LOICA *Pezites militaris militaris* (Lineo). La juzgué bastante escasa en Maullín; sólo descubrí una pareja el día 29. En los alrededores de Puerto Montt era más frecuente.

DIUCÓN, TURCO, *Xolmis pyrope* (Kittlitz). Algunos quedaban, habiendo emigrado la mayoría a las provincias de más al norte (al centro y centro - norte del país), para pasar la mala estación.

DORMILONA COMÚN, arriero, tontito, *Muscisaxicola macloviana mentalis* Lafresnaye y D'Orbigny. Un grupito de seis o siete ví el día 24, en los arenales de las dunas. No volvieron a presentarse.

CACHUDITO, TORITO, *Spi. iornis parulus parulus* (Kittlitz). Observé varios en los matorrales.

RARA, *Phytotoma rara* Molina. Un macho se presentó el 31.

CAMINERA, *Geositta* sp. En los arenales, cerca del Vivero de Maullín, ví un ejemplar de caminera, de color, tamaño y aspecto iguales a los de la caminera del centro del país, *Geositta cunicularia fissirostris* (Kittlitz); pero no pude cazarla para determinar la especie.

REMOLINERA COMÚN, MOLINERA, CHURRETE, *Cinclodes patagonicus chilensis* (Lesson). A la orilla del río y de las lagunitas y pantanos formados por las lluvias, diariamente llegaban algunos ejemplares; también divisé en galpones y establos de casas de campo. Cacé un macho el 31. A esta ave la llaman piloto, en la región.

REMOLINERA CHICA, *Cinclodes Oustaleti Oustaleti* Scott. Pude observar dos en Puerto Montt, que volaban persiguiéndose jugueteando, el 3 de Junio; una de ellas estuvo posada duran-

te un rato a dos metros de distancia de mí, en el tajamar, en Anjelmó, donde las encontré.

COLILARGA DEL SUR, *Sylviorthorhynchus Desmuri* Gay. Hallé de a uno en los días 30 y 31 de Mayo, entre los tupidos grupos de chupones (Bromeliáceas) y los matorrales.

RAYADITO, *Aphrastura spinicauda spinicauda* (Gmelin). A menudo se oía gritar este pajarillo entre los árboles, en Puerto Toledo y en Maullín. En este último punto descubrí un grupo de diez o doce, el 27 de Mayo, que andaban juntos buscando su comida bulliciosamente.

SIETE COLAS, TIJERITA, COLILARGA COMUN, *Leptasthenura aegithaloides aegithaloides* (Kittlitz). Sólo ví un ejemplar el 31.

CHUCAO, *Scelorchilus rubecula* (Kittlitz). El ave es muy común en los bosques y matorrales de todo el sur; pero en Maullín era difícil de observar en esta época porque no se mostraba, y por las muchas lagunas que las lluvias habían formado. Uno de sus gritos, *trututu*, fuerte, rápido y algo silbante, se sentía con frecuencia al pie de los árboles y en medio de las espesuras, desde Puerto Montt a Maullín y en los alrededores de este pueblo.

PICAFLORES COMÚN O DEL SUR, *Sephanoides galeritus* (Molina). Abundaba a pesar de los muchos que debían haber emigrado hacia el Norte; visitaba las flores de zarzamora (murra, de los sureños), de quintral, etc. Obtuve un macho.

PITIU, *Colaptes pitius pitius* (Molina). Algunos se mostraron en los alrededores del pueblo el 30 de Mayo y el 1.º de Junio, anunciando su presencia con sus estridentes voces.

CHOROY, *Enicognathus choraesus* (Molina). Todos los días pasaban en bandadas, que alojaban no lejos. Muchos vecinos lo tenían como ave de jaula; en la región se le llama loro. En las provincias de más al norte, Valdivia, Cautín, etc., era muy abundante; volaba en grandes bandadas.

TIUQUE, CHIUQUE, *Milvago chimango temucoensis* W. L. Sclater. Era común por doquiera, sobre todo en los campos de cultivo, a cuyo cuidado contribuye eficazmente, destruyendo multitud de larvas dañinas.

JOTE, *Cathartes aura jota* (Molina). Sólo divisé dos o tres a la orilla del río.

GALLINAZO, *Coragyps atratus foetens* (Lichtenstein). Muy común y hasta abundante; tanto en Puerto Montt como en Maullín y en otros pueblos del Sur, ocupa apaciblemente los techos de las casas, y es un buen colaborador de la policía de aseo.

ALCATRAZ, *Pelecanus thagus* (Molina). El día 23, dos volaban sobre el río a unos tres kilómetros antes de llegar a Maullín; otro ví el 29 desde el pueblo, en la confluencia del río

Cariquilda con el Maullín. Estas observaciones amplían considerablemente su área de dispersión, en sus viajes invernales hacia el Sur.

LILE, PATO LILE, *Phalacrocorax Gaimardi* (Lesson y Garnot). En relativa abundancia lo observé en el río, el 23 de Mayo, desde más o menos la mitad de la distancia que hay entre Puerto Toledo y Maullín. En esta zona lo llaman guanay, y, al revés, denominan lile al *Ph. Bougainvillii*, que parece suele llegar en ocasiones hasta Chiloé.

CUERVO, PATO YECO, *Phalacrocorax olivaceus olivaceus* (Humboldt). Era, común; desde Puerto Toledo se le hallaba aisladamente o en pequeños grupos.

GARZA, GARZA BLANCA GRANDE, *Casmerodius albus egretta* (Gmelin). Una, posada a la orilla del río el 23.

BANDURRIA, *Theristicus caudatus melanopsis* (Gmelin). Varios ejemplares tenían su residencia entre Maullín y el mar; a menudo revoloteaban dejando oír sus característicos gritos.

FLAMENCO (de Molina), *Phoenicopterus ruber chilensis* Molina. Frecuentaba las corrientes y lagunas entre Maullín y Carelmapu, según se me informó; pero no pude alcanzar hasta esos puntos.

CISNE *Cygnus melancoryphus* (Molina). El 23, uno destacaba su hermosa estampa en el río tranquilo como una laguna, y cuyas aguas en todo el trayecto son resaltantemente oscuras. (Se me ha informado que esto se debe al caudal del Río Negro, que es su tributario).

PATO REAL, *Mareca sibilatrix* (Poeppig). Era el pato más común; con frecuencia pasaba en pequeñas bandadas.

PATO JERGÓN GRANDE, *Paecilonitta spinicauda* (Vieillot). También era frecuente esta especie, que con la anterior, fueron las dos que pude identificar.

TORCAZA, *Columba araucana* Lesson. En el trayecto de ferrocarril ví torcazas en distintos puntos. No se presentaron entre Puerto Montt y Maullín. El punto más austral donde las observé, fué entre Río Negro y Purranque. De regreso, el 4 de Julio, noté grandes bandadas al norte de La Unión, cerca de las estaciones de Rapaco y Los Conales. El escasear más al sur se debía, indudablemente, a que ya habían emprendido su viaje invernal hacia las provincias centrales.

PIDEN, *Rallus sanguinolentus Landbecki* Hellmayr. Es muy común; diariamente se oían sus alegres notas. En la región lo llaman cotuta.

TAGUA, *Fulica armillata* Vieillot. Se la encontraba en una laguna al S. O. de Maullín. Un ejemplar ví en poder de un cazador.

QUELTEHUE, TREILE, *Belonopterus cayennensis chilensis* (Mo-

lina). Era frecuente entre Puerto Montt y Puerto Toledo; en otros puntos era muy abundante; así, en Purén, ví más de cincuenta reunidos; entre Gorbea y Pitrufquén, otra bandada superior a ochenta ejemplares, etc. En Maullín habitaba en los campos del S. O.

POLLITO. Una especie de chorlito que no pude identificar, frecuentaba la vega de la orilla del río, frente al Vivero de Maullín.

PERDICILLA, *Numenius hudsonicus* (Latham). Una acudía todos los días a la orilla del río, en el mismo punto señalado para la especie anterior. En esta época la perdicilla ha emigrado hacia el Norte; la mayor parte va al hemisferio boreal, donde tiene sus lugares de reproducción. Pero no todas las perdicillas abandonan el país: mientras permanecí a cargo de las Dunas de Llico, pude observar que todos los años quedaban en esa costa algunos ejemplares de esta especie, durante todo el invierno.

GAVIOTA, GAVIOTA GRANDE, *Larus dominicanus dominicanus* (Lichtenstein). Escasos ejemplares se presentaban en el río, cerca del pueblo.

CAHUIL *Larus maculipennis* (Lichtenstein). Era frecuente, aunque no abundaba; una bandada de 18 comía el 28 de Mayo, en un campo con aguas estancadas, cerca del Vivero.

HUALA, *Aechmophorus major* (Boddaert). En el río era muy común; desde Puerto Toledo se presentaba aislada, en parejas o en grupos hasta de 9 ejemplares.

POLLOLLO, PIMPOLLO, *Colymbus Rolland chilensis* (Lesson). Junto a los totorales que festonan las orillas del río Maullín, ví tres o cuatro, el 23 de Mayo.

CABEZÓN, PICURIO, *Podilymbus podiceps antarcticus* (Lesson). Uno sólo se presentó a la vista en el río, el mismo día.

PATRANCA, PAJARO NIÑO DEL SUR, *Spheniscus magellanicus* (Forster). Dos, observé en el Maullín, a unos dos kilómetros del pueblo, el 23.

BOSQUE SANTIAGO, 16 de Julio de 1937.

