



## COSSONIDES NOUVEAUX DE L'AMERIQUE MÉRIDIIONALE

PAR

A. HUSTACHE

### **Rhinanisus punctifrons, n. sp.**

Très allongé, les élytres pas plus larges que le prothorax, déprimé, d'un brun marron, les pattes et les antennes d'un roux ferrugineux, pourvu sur le dessus d'une courte pubescence sétiforme dressés, plus longue vers le sommet des élytres.

Rostre roux, moins long que le prothorax, peu arqué, en avant ponctué en lignes (♀) ou densément ponctué, plus court et plus épais (♂), au sommet très peu élargé. Front à ponctuation forte, très serrée, ruguleuse. Yeux plats. Vertex éparément pointillé, sans pubescence.

Prothorax de moitié plus long que large, subconique, fortement étranglé derrière le bord antérieur, les angles postérieurs arrondis, la ponctuation forte et serrée, la ligne médiane lisse. Écusson sublisse.

Elytres presque trois fois aussi longs que larges, avec des séries de points arrondis, très serrés, assez profonds, moins très vers le sommet, les interstries moins larges que les points, plans, lisses ou très finement chagrinés, la suture avec une ligne de petits points.

Troisième article des tarsi large et échancré.

Long. 3,2 - 3 mm.

Argentine: Alta Gracia, La Granja, Sierra de Córdoba, I - 1912, types ma collection (C. Bruch, N.° 31).

### **Pentarthrum curvum, n. sp.**

Marron, le prothorax et le rostre souvent plus foncés. Funicule avec le 2e. article plus long que le 3e. ♀ Rostre pointillé jusqu'au sommet. Yeux peu convexes, Prothorax ovale, triangulaire, légèrement étranglé en avant; convexe. à ponctuation profonde, assez grosse mais peu serrée. Élytres ponctués striés, les points arrondis, profonds, séparés par des intervalles moitié de la largeur des points, la 3e. strie, sur la déclivité postérieure, distinctement arquée en dehors, les interstries plans, lisses, unisérialement ponctués, non transversalement rugueux. Dessous à ponctuation forte, profonde, peu serrée.

♂ Rostre beaucoup plus large, fortement, rugueusement ponctué jusqu'au sommet. Yeux plus convexes. Etranglement antérieur du prothorax plus profond. Base de l'abdomen avec une profonde mais peu grande impression ponctuée.

Long. 3 - 3,2 mm.

Argentine: Río Negro, 15 - XII - 1937 (ex J. Bosq.).

Cette espèce est très voisine de *P. nitidum* Woll., du Chili; elle s'en distingue par sa sculpture élytrale, et tout particulièrement par la courbure de la 3e. strie sur la déclivité apicale; les yeux sont moins convexes, le prothorax moins long, plus conique, ses côtés en arrière plus largement arrondis; les élytres tout un peu moins longs et un peu plus larges.

### **Pentarthrum argentinense, n. sp**

Brun marron, avec le prothorax plus foncé, noirâtre; assez luisant.

Rostre en arrière convexe (♀) ou longitudinalement et profondément impressionné (♂). Funicule antennaire avec son 2e. article plus long que le 3e.

Prothorax ovale triangulaire, plus long que large, assez fortement étranglé derrière le bord antérieur, les côtés assez régulièrement arqués, un peu plus fortement en arrière; convexe, les points assez gros, profonds, sur le milieu séparés par des intervalles aussi grands que les points, lisses et luisants, de chaque côté avec une aire moins densément ponctuée, les points devenant confluent sur les bords latéraux.

Élytres avec les deux premières stries sulciformes, profondes, leurs points très serrés, les autres stries avec leurs points

séparés par des intervalles linéaires, la 3e. arquée à son sommet, les interstries luisants, transversalement rugueux, pourvus chacun d'une série de petits points.

Long. 2,8 - 3 mm.

Argentine: Gob. Mauquén, IV - 1902 (C. Bruch, N.º 295), une paire, ma coll.

Cette espèce diffère de *P. curvum* par sa forme plus étroite, le prothorax moins conique son étranglement apical plus fort, les élytres transversalement rugueux, les interstries élevés et moins larges que les points des stries.

### **Microminus brevirostris, n. sp. (♂)**

Ferrugineux, les élytres assombris au sommet, le prothorax noir de paix.

Tête lisse en arrière, le front assez densément pointillé et beaucoup moins large que le rostre, en avant déprimé mais sans ligne transversale.

Yeux grands assez fortement convexes. Rostre court, peu plus du double aussi long que large, brièvement dilaté au sommet. Antennes avec la massue étroite, oblongue, aussi longue que les cinq articles précédents réunis.

Prothorax de un quart plus long que large, en arrière du milieu aussi large que les élytres, en avant brièvement mais distinctement resserré; sur le milieu légèrement impressionné; pourvu de points peu gros, profonds, espacés, plus petits sur les bords latéraux que sur le milieu. Écusson transversal, avec quelques petits points.

Élytres peu plus du double aussi longs que larges, parallèles jusqu'au tiers postérieur, au sommet le bord apical explané; assez fortement striés ponctués, les stries en avant plus profondes et leurs points moins distincts, plus serrés, les interstries légèrement convexes, plus fortement au sommet, distinctement et unisérialement pointillés.

Tibias antérieurs triangulaires peu plus du double aussi longs que larges au sommet, leur denticule apical interne fort.

Long. 2,2 mm.

Brésil: Matto Grosso, Corumba. 1 ♂ (ex Bang - Haas), ma collection.

Espèce voisine de *M. boliviensis* m. dont elle diffère par les caractères ci-dessus.

**Cossonus longinasus, n. sp.**

Peu convexe, noir, les antennes (massue cendrée exceptée), les tibias et les tarses ferruginaux, la dilatation rostrale remarquablement longue.

Rostre aussi long que le prothorax, grêle, peu arqué, assez densément pointillé, dilaté sensiblement vers l'insertion antennaire, sa dilatation apicale rétrécie du sommet à l'insertion antennaire, chez la ♀ du double environ aussi longue que large, peu forte et à peine moins longue que le reste du rostre, chez le ♂ beaucoup plus forte, de moitié seulement plus longue que large et beaucoup plus courte que le reste. Tête courte, conique, éparsément ponctuée, le front avec une petite foveole, les yeux à peine convexes.

Prothorax aussi long que large, les côtés peu arqués, légèrement resserrés derrière le bord antérieur, la base faiblement bisinuée; convexe, avec une impression basale médiane, triangulaire, atteignant seulement le milieu, grossièrement ponctuée et finement carénée, le reste du disque avec des points petits et espacés sur vers l'impression, plus gros et serrés sur les côtés. Ecusson petit et lisse.

Elytres beaucoup plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au tiers postérieur; peu convexes, grossièrement striés ponctués, les points très serrés, devenant plus petits vers le sommet, les interstries très étroits, élevés et pourvus d'une série de quelques microscopiques points espacés.

Tibias antérieurs légèrement bisinués en dedans. Abdomen densément ponctué, les impressions lisses (♀) ou fortes et densément ponctuées (♂).

Long. 4 - 5 mm.

Argentine: Chaco de Santiago, Río Salado, Río Paraná, types (ma collection); Salta (J. Bosq.); Catamarca: Caspinchago, ex-Heiser, N.º 116 coll. C. Bruch.

Bolivie allemande, 1 ♂ (coll. Kraat).

Les élytres sont parfois bruns ou ferrugineux.

La forme du rostre rappelle celle de *C. Silbermanni* Boh. (l. c. t. 2, f. 22 a), du Mexique.

**Cossonus mimicus, n. sp.**

Subcylindrique, peu luisant, marron, le prothorax, la tête et le rostre plus foncés, noirâtres.

Tête courte, conique, les tempes non renflées, les yeux un peu convexes, la ponctuation fine et éparsée sur le vertex plus forte et plus serrée sur le front, la foveole frontale petite. Rostre large très court, peu plus long que sa plus grande largeur,

sa dilatation apicale peu brusque, fortement transversale, aussi longue que la partie postérieure, densément pointillée, sur la partie postérieure la ponctuation plus forte, longitudinalement confluyente sur le long du milieu légèrement impressionné. Antennes robustes et courtes.

Prothorax oblong, plus long que large, en avant modérément rétréci et légèrement resserré, les côtés faiblement et presque régulièrement arqués, la base bisinuée; convexe, avec une courte et légère impression basale grossièrement ponctuée et brièvement carénée, le resserrément apical avec des points petits le reste du disque avec de gros points peu serrés. Écusson très petit.

Elytres non plus larges et seulement de un quart plus longs que le prothorax, parallèles jusqu'au tiers postérieur; convexes, peu fortement ponctués striés les points serrés, graduellement plus fins en arrière, très petits vers le sommet, les interstries aussi larges que les points, peu convexes, avec une série de points microscopiques.

♂ Tibias antérieurs fortement dilatés dans leur moitié apicale interne.

Long. 4 - 4,2 m.

Guyane française: St. Laurent du Maroni, une paire, types (ma coll.); Guyana, sans localité précise, 1 ♂ (coll. Pape).

Cette espèce est voisine de *C. corticola* Say; elle en diffère par la prothorax plus long, impressionné en arrière, le rostre autrement conformé.

### ***Cossonus subreticulatus*, n. sp.**

Déprimé, d'un noir brun, mat, la ponctuation des élytres en partie réticulée.

Rostre aussi long que la tête, sa dilatation apicale rectangulaire, forte, transversale, moins longue que la partie postérieure; mat, sa ponctuation très serrée, allongée, moins forte que celle de la tête. Tête un peu plus large que longue, conique jusqu'aux yeux, ces derniers assez fortement convexes. Antennes d'un ferrugineux foncé ou brunes foncés, robustes, les derniers articles du funicule moniliformes, la massue cendrée.

Prothorax un peu plus large que long, en avant brièvement mais fortement resserré et moitié aussi large que la base, la base fortement bisinuée, les côtés peu arqués dans le milieu, en arrière sinués devant les angles postérieurs aigus; plan, entièrement, densément et fortement ponctué; avec une impression médiane triangulaire, peu profonde, large, atteignant presque le sommet, traversée par une carène médiane

fine et un peu luisante, l'impression un peu au delà de son milieu brusquement rétrécie et en avant moins profonde qu'en arrière. Écusson lisse.

Elytres deux fois aussi longs que larges, parallèles, rétrécis dans leur quart postérieur; plans, mats, les rugosités un peu luisantes; largement mais peu profondément sillonnés ponctués, les points très grands, entamant fortement les interstries, séparés par des cloisons irrégulières, excessivement étroites pour la plupart, quelques unes plus larges, aussi élevées que les interstries, traversant plusieurs interstries, les interstries très étroits, peu élevés, assez densément mais irrégulièrement ponctués, la suture régulière et très densément ponctuée.

Dessous à ponctuation profonde, assez serrée. Impression abdominale du male profonde.

Long. 5,7 - 6 mm.

Cette espèce se rapproche de *C. semirufus* Boh. dont elle diffère par le rostre plus court, l'impression du prothorax moins profonde, carénée, parfois divisée nettement en deux parties par une étroite carène transversale vers son rétrécissement antérieur, la sculpture des elytres nullement régulière et les interstries beaucoup plus étroits. Les élytres étant variables de coloration, voici les principales.

*Forme typique:*

Elytres entièrement noirs.

Colombie: S. Antonio, Cauca, Villa Elvira, types, ma collection; Cauca Thal (coll. Kraatz) Carmen, 1400 m. (coll. Pape).

*Var. rubricatus*, n. var.

Elytres en entier d'un rouge brique.

S. Antonio, types; Ibagué (F. Claver), ma coll.; Carmen (coll. Pape).

Un spécimen de S. Antonio a les élytres en entier d'un brun rouge.

*Var. bifasciatus*, n. var.

Elytres noirs, ornés d'une large tache apicale et d'un bande basale interrompu par la suture, rouges.

Villa Elvira, S. Antonio, types; S. Antonio Carmen (coll. Pape).

