EL «PICAFLOR DE LA CORDILLERA», OREOTROCHILUS LEUCOPLEURUS GOULD, EN MAGALLANES(*)

POR

ANGEL R. ZOTTA

De la Sección Ornitología del Museo Argentino
de Ciencias Naturales, de Buenos Aires (R. A.)

Como el nombre lo indica, este picaflor habita en las zonas montañosas a lo largo de la Cordillera de los Andes, por sobre los 1,500 metros, hasta el límite de las nieves perpetuas. Sobre su área de distribución geográfica en Chile, observo en la literatura ornitológica, su dispersión desde Hueso Parado (Antofagasta) que marca el record septentrional, señalado por R. A. Philippi (1), hasta Baños de Cauquenes (Colchagua) citado por E. Reed (2); esta cita es la más meridional conocida hasta ahora.

Esta última localidad no puede ser conservada como el límite de su distribución austral, pues recientemente han sido ingresados en las colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires, tres ejemplares de ese picaflor, procedentes del Lago San Martín, Brazo Pascua (Magallanes), colectados por S. Radboone a principio de 1936; esta localidad se encuentra a 14° más al sur de Baños de Cauquenes.

No creo que la presencia de estos picaflores en esa latitud sea casual, pues son jóvenes, y por lo tanto con poca capacidad de vuelo y resistencia, por lo tanto no dudo que se encuentre también en las provincias intermedias a estas dos citas australes. Al este de los Andes, sólo se le conoce hasta Mendoza, pero es muy probable que se extienda más al sur. El señor G. Casares, nos ha comunicado que ha observado un picaflor en el Lago Nahuel Huapí, Cerro Bagual (Neuquén), que según los datos por él recogidos, sería esta misma especie.

BUENOS AIRES, 20 de Abril de 1937.

(*) Solicitada su inserción por el Dr. R. A. Phillipi B. que la recibió en una carta del Sr. Zotta. — (NOTA DE LA RED.)

(1) *Philippi R. A.* — Ornis, Vol. 4-1888, p. 158.
(2) *Reed E.* — An. Univer. Chile. Vol. 49-1877, p. 553.