

NOTAS SOBRE ORNITOLOGIA CHILENA

POR

WILLIAM R. MILLIE

Agradeciendo una nueva invitación del distinguido Director de la «Revista Chilena de Historia Natural» para colaborar en el tomo 43, aprovecharé para contribuir con algunos datos adicionales acerca de las Aves del Valle del Huasco (Atacama).

Podemos abregar, por ahora, tres especies y hacer algunas modificaciones a nuestra primera lista de Aves del Huasco (1).

1. RECURVIROSTRA ANDINA Philippi y Landbeck.

Hemos visto un ejemplar de esta bella ave en el río cerca de Vallénar (350 metros). En su obra «The Birds of Chile», el señor C. E. Hellmayr menciona dos nombres que se podían confundir con lugares de este valle: es decir, «Huasco» e «Incahuasi», siendo el último una estación del longitudinal como a 90 kilómetros al sur de Vallenar. Sin embargo, se refiere, sin duda alguna, a localidades dentro de la provincia de Tarapacá la primera, y de Antofagasta la segunda. Más adelante dice que Reymer da como límite sur de esta especie a Maricunga, en la cordillera de Copiapó. De modo que

(1) *Revista Chilena de Historia Natural*, vol. XLII (1938), pp. 181-205.

ahora hay que extender la distribución geográfica de *recurvirostra andina* hasta la provincia de Atacama (parte sur).

2. PELECANOIDES GARNOTII (Lesson).

En mi primera lista dije que no había encontrado nidos de esta especie. Efectivamente, era cierto, pero el 7 de Diciembre de 1938 fueron colectados 24 huevos de esta especie en la Isla Chañaral, como a 90 kilómetros al sur de Huasco. Los nidos eran hoyos hondos en terreno blando, en la parte superior de la isla. En la noche se sentía un ruido enorme dentro de las cuevas cuando llegaban los otros Patoyuncos del mar. Las nidadas son de un huevo por regla general. Los huevos son blancos y de tamaño variable. Miden, como término medio, $46,49 \times 33,78$ mm. y un ejemplar tenía un volumen de 27,04 cc.

3. HAEMATOPUS OSTRALEGUS PITANY Murphy.

En la Isla Chañaral, como a 90 kilómetros al sur de Huasco fué encontrado el 7 de Diciembre de 1938 un nido de esta especie en una playa de piedra. Contenía dos huevos que estaban muy poco incubados. Miden $62,2 \times 41,1$; y $57,9 \times 40,5$ mm. y tienen un volumen de 45,20 y 44,60 c.c. respectivamente.

4. HAEMATOPUS ATER Vieillot y Oudart.

En la misma Isla Chañaral, fué encontrado un nido de esta especie que contenía un solo huevo fresco el día 7 de Diciembre de 1938. Es más largo y más angosto que los de la especie anterior y, además, más oscuro. Mide $64 \times 39,7$ mm. y tiene un volumen de 45,40 c.c.

5. HIRUNDO RUSTICA ERYTHROGASTER Boddaert.

Dos ejemplares de esta especie fueron cazados en el fundo Centinela, Huasco, y enviados a nuestro amigo, Dr. Rodolfo A. Philippi, Jefe de la Sección Ornitología Chilena del Museo Nacional de Chile. Esta especie llegó el 30 de Diciembre y se fué a fines de Marzo en su migración.

6. PHYTOTONIA RARA, Molina.

El 12 de Mayo de 1939 el señor J. M. Wodehouse cazó un ejemplar macho de esta especie en su fundo como a 400 metros. El ejemplar, que no estaba en condiciones de conservarlo fué enviado a nuestro amigo Dr. Rodolfo A. Philippi B. con el fin de que quede constancia del hallazgo ya que no se pudo conservar la piel. El límite norte de esta especie era Coquimbo, pero ahora hay necesidad de extender su límite norte hasta este valle, o sea a la parte sur de Atacama,

7. MUSCISAXICOLA RUFIVERTEX RUFIVERTEX, Lafr. y d'Orb.
El 4 de Junio de 1939 fueron cazados dos ejemplares de esta especie que, aunque la había observado anteriormente, me había sido imposible clasificarla por no haber obtenido pieles.

Debo mis más sinceros agradecimientos a nuestro distinguido amigo Dr. Rodolfo A. Philippi B. quien me clasificó estos ejemplares.

Con estas anotaciones se aumenta, por el momento, a 117 las aves encontradas en el valle del Huasco y sus alrededores.

VALLENAR, Junio 16 de 1939.—Fundo Centinela.

