

i solo se pueden obtener de los pescadores, que suelen sacarlas en las redes, o tendremos que salir en bote i trabajar con rastra.

El mejor modo de perservalas, si es que queremos estudiar el paladar, es ponerlas dentro de un frasco de boca ancha, i cubrirlas con un buen aguardiente puro con unas cuantas gotas de creosota o ácido fénico; i como los animales arrojan una cierta cantidad de agua, hai que cambiar el aguardiente cuando el frasco se encuentra lleno, de otra manera, podemos perder nuestro trabajo, pues con seguridad entraran en descomposicion i se descompondrian todos.



CATÁLOGO DE LOS PECES DE CHILE

POR EL

Doctor **FED. T. DELFIN**

Naturalista adjunto del Museo de Historia Natural de Valparaiso.

(Continuacion).

J. PSAMMOBAITIS.

Gthr.; Cat. Fisch. VIII, p. 460 (1870).

248 **P. RUDIS.**

Raja scobina, *Phil. Wiegna. Archiv. Naturg.* XXIII, 1, S. 270 (1857); *Au. Mus. Nac. de Chile, Zool.*, p. 2. tab. I, fig. 1 (1892).

Psammobatis rudis, *Gthr. Cat. Fish. Coll. Brit. Mus.* VIII, p. 470 (1870) i *Voy. Chall. Schokre Fishes.*, p. 20, pl. X, (1880) i *Prac. Zool. Soc.* p. 19 (1881); *L. Vaillant, Miss. Scient. Cap. Horn. Poiss* p. 15, (1888); *Berg., An. Mus. Nac. de Buenos-Aires* t. IV, p. 14 (1895).

El ejemplar del M. S. procede de Quinteros, al norte de Valparaiso. En el viaje de la *Challenger* se le obtuvo en el cabo Vírjenes, Estrecho de Magallanes.

FAM. TRYCONIDAE

Bp., Faun. ital. Pesci. (1838); *Gthr. Cat. Fish.* VIII, p. 471 (1870).

J. UROLOPHUS.

Urolophus et Tryggonoptera, Müll. & Henle Syst. Besch. Plag. (1840); Gthr. Cat. Fish. VIII, p. 485 (1870); Phil. An. Mus. Nac. de Chile, p. 5, (1892).

249. U. MARMORATUS.

Phil. An. Mus. Nac. de Chile, p. 6, tab. II, fig. 2-3 (1892).
Esta especie fué encontrada en Quinteros.

FAM. MYLIOBATIDAE

Bp., Faun. ital. Pesci. (1838); Gthr., Cat. Fish. VIII, p. 488 (1870).

J. MYLIOBATES.

Dum., Descr. genr. Poiss. (1877), Cuv. Règne Anim. (1817); Gthr. Cat. Fish VIII, p. 488 (180), Martinez i Saez, Distr. met. Vertebr. p. 361 (1879).

250. M. CHILENSIS.

Phil. An. Mus. Nac. de Chile, p. 6. Tab. III, fig. 1, (1892).
Designan a este pez los pescadores con el nombre de *águila de mar*. El M. S. posee dos ejemplares (♂ ♀) provenientes de Quinteros.

J. CEPHALOPTERA (*)

Duméril, Eleesmobr. (1865).

251 C. TARAPACANA.

Phil. An. Mus. Nac. p. 8, Tab. III, fig. 2 (1892).
Fué pescado a doce millas al oeste de Iquique.

(Concluirá.)

(*) Antiguo jénero que comprende hoi al *Dicerobatis* de Blainville i al *Ceratoptera* de Müll & Henle i como el Dr. Philippi lo dice, tuviera dudas a cual de los dos puede pertenecer la especie por no contar sino con un dibujo i carecer de datos sobre los dientes, empleó aquel jénero por comprender a ambas.