

DOS NUEVAS PLANTAS ADVENTICIAS DE LA
FLORA VALDIVIANA

Por

H u g o GUNCKEL L.

1.—VINCA MAJOR L.

Esta apocinácea, originaria de Europa central y austral, crece espontáneamente en varios lugares de la provincia de Valdivia.

Desde años la observábamos en los alrededores de la ciudad de Valdivia, donde se escapó de varias quintas, como también de los cementerios, donde se usa para adornar tumbas.

En Corral la volvimos a encontrar y es aquí relativamente común, principalmente en el recinto del fuerte colonial de este puerto, a orillas del camino, entre el Cementerio Comunal y la gruta de "La Aguada", y en otros lugares, pero siempre de preferencia en lugares algo húmedos.

Crece formando pequeñas colonias de matitas arrastrantes, entre algunas gramíneas, floreciendo desde Agosto hasta fines de Marzo, presentando sus flores azules y grandes, de una forma especial.

Esta planta adventicia había sido ya indicada para Chile por don V. M. Baeza, (*Contribución al Conocimiento de la Flora Advena de Chile*); Santiago de Chile, 1928, pág. 18—19), que dice que la observó "en numerosas localidades de la región central, v. g., en Conchalí, Peñaflores, Zapallar, Constitución, etc., etc.". El Dr. Reiche, en sus "*Estudios Críticos sobre la Flora de Chile*", véase pág. 107, la cita para Renca, cerca de Santiago.

Según el Dr. C. M. Hicken, (en *Chloris Platensis Argentina*, pág. 184), crece esta planta también en los alrededores de Buenos Aires", escapado de los jardines y suele hallarse en terreno húmedo y algo sombreados".

Nuestros ejemplares de Corral (Herbarium Gunckel, Núm. 1848), fueron determinados por el Dr. I. M. Johnston, del Gray Herbarium.

2.—DUCHESNEA INDICA (Andr.), Focke

En algunos lugares húmedos y sombreados de Valdivia y de este puerto (Corral), habíamos observado una rosácea de flores amarillas, que nos fué determinadas por el Dr. I. M. Johnston (según ejemplares del Herbarium Gunckel, Núm. 2032), como *Duchesnea indica* (Andr.) Focke.

Es originaria de la parte austral de Asia y se aprovecha en jardinería.

Parece que su presencia en Chile aun no ha sido señalada; pero es abundante en algunas partes del Parque Harker, en Valdivia, y en los alrededores de Corral, principalmente debajo del escalón de madera, que une Corral Alto con el Camino público a San Juan, al lado de la Casa de Socorros.

Florece casi todo el año y sus "frutillas" maduran en Diciembre hasta Enero-Febrero.

No es citada en los "Estudios Críticos sobre la Flora Chilena", del Dr. C. Reiche, ni en las obras del Dr. R. A. Philippi, ni en la de don C. Gay.

Posée tallo rastrero, que de trecho en trecho emite matitas de hojas, con flores y raíces.

El Dr. C. M. Hicken la cita para los alrededores de la capital argentina, (*Chloris Plat. Arg.* pág. 121), como "muy abundante en el bosque riberano de Quilmes, donde florece a principios de Septiembre y fructifica a mediados de Noviembre. Los frutos son levemente azucarados, pero de ningún modo repugnantes o nó comestibles". El Dr. L. Hauman M., la señala también como adventicia para la República Argentina.

El Dr. C. Reiche la indica como aclimatada en Contreras, en México, y dice que sus "frutos son inservibles para comer" (*Flora Excursoria en el Valle Central de México*), México, 1926, pág. 65).

Corral, Agosto 26 de 1931.

