

LOCALIDADES Y HABITAT ARGENTINAS DE UN
COCCINELLIDAE DE CHILE

POR

JUAN M. BOSQ

División de Zoología Agrícola del Ministerio de Agric. (R. A.)

Se trata de *Stictospilus Darwini* Brèthes, descrito en «An. Mus. Nac. Hist. Nat.», Buenos Aires, t. XXXIII (1924), pp. 153 - 155, figs. 3 - 4; género y especie nuevos que, el autor estableció con ejemplares procedentes de Chile, Isla Chiloé (Darwin, Germain, leg.) y de Valle del Lago Blanco, en Patagonia.

Las características de este pequeño coccinélido obscuro, se basan en que el 4.º artículo de los palpos es cónico y que la maza de las antenas es solamente de dos artículos.

El mes de Diciembre de 1935, en el patio de un hotel de la ciudad de Santiago del Estero, me llamó la atención gran cantidad de larvas, ninfas y adultos de este insecto, notando que era predator de ácaros que atacan las hojas de una convolvulacea (*Ipomoea digitata*), enredadera frecuente en muchos cercos y patios de casas de campo, donde se cultiva no tanto por la elegancia del follaje, sino por la rusticidad de dicha planta y la sombra que proporciona.

Más tarde, Octubre de 1938, lo volví a encontrar en las mismas condiciones de habitat en la localidad de Fernández, F. C. C. A. (Prov. de Santiago del Estero), pudiendo apreciar nuevamente su utilidad como destructor de ácaros en zonas secas donde éstos se multiplican fácilmente llegando a ser verdadera plaga.

Debo agradecer al Dr. Alejandro A. Ogloblin, quien ha tenido la bondad de comunicarme el nombre del insecto.

BUENOS AIRES, Nov. 1.º de 1938.

